ФОРКАРД

Раствор транексамовой кислоты
10 ампул по 5 мл | 100 мг

Механизм действия
Транексамовая кислота — ингибитор фибринолиза:

- Блокирует превращение **плазминогена в плазмин**
- Предотвращает **растворение фибриновых сгустков**
- Обеспечивает **стабилизацию гемостаза** в условиях активного кровотечения

Преимущества Форкард

Быстрое и мощное торможение фибринолиза	Готовый к применению раствор — 100 мг/5 мл
Эффективен при острых и хронических кровотечениях	Подходит для хирургии, гинекологии, стоматологии
Хорошая переносимость, низкий риск побочных эффектов	Эффективнее и безопаснее аминокапроновой кислоты

Дозировка и путь введения

- **В/в медленно или капельно**, в зависимости от показаний
- Обычно от **500 мг до 1 г 2–3 раза/сутки**
- Возможно **в/м введение** при невозможности в/в доступа

Клинические рекомендации

- Рекомендована в **гайдлайнах ACOG, ESMO и WFH**
- Активно применяется в **акушерстве** (при послеродовых кровотечениях)
- Эффективна в **лечении гиперфибринолиза** после травм и операций

Безопасность и переносимость

Побочные эффекты встречаются редко:

- Тошнота, головокружение
- Аллергические реакции
- Визуальные нарушения (при длительном применении)

С осторожностью при:

- Тромбоэмболических заболеваниях в анамнезе
- Почечной недостаточности
- Приеме с другими антикоагулянтами

Производитель: ООО «BAYAN MEDICAL»

Показания к применению

- **Стоматология**
  Остановка кровотечений после удаления зубов, особенно у пациентов с нарушением свертываемости крови.
- **Акушерство и гинекология**
  Меноррагия, маточные кровотечения, кровотечения при родах и в послеродовом периоде, угроза прерывания беременности.
- **Гемофилия и коагулопатии**
  Профилактика и лечение кровотечений, в т.ч. при стоматологических вмешательствах.
- **Хирургия и травматология**
  Профилактика и лечение кровотечений при операциях на сердце, сосудах, органах ЖКТ, ЛОР-зоне, урогенитальной и опорно-двигательной системах. Послеоперационные и травматические геморрагии.
- **Офтальмология**
  Кровоизлияния в переднюю камеру глаза, сетчатку и стекловидное тело (в составе комплексной терапии).
- **Прочие состояния**
  Гиперфибринолиз различной этиологии, ДВС-синдром (ранняя фаза), гематурия, кровотечения на фоне опухолевых и воспалительных процессов.