ЭВОТРОН

ЭВОТРОН

Левофлоксацин 5 мг/ мл - 100 мл

Наиболее широкий спектр антимикробного действия (Грам +, Грам -, атипичные возбудители, анаэробы)
Высокая бактерицидная активность
Хорошее проникновение в легочную ткань
Высокая биодоступность
Длительный период полувыведения (прием 1 раз в сутки)

ЭВОТРОН (левофлоксацин) -
ОПТИМАЛЬНЫЙ АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ
При однократном применении левофлоксацина
(500 мг внутрь или внутривенно)
сывороточная концентрация препарата на протяжении
24 ч превосходит МПК всех потенциальных возбудителей

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- эпилепсия;
- поражения сухожилий, связанные с приемом хинолонов в анамнезе;
- детский и подростковый возраст до 18 лет;
- беременность;
- лактация (грудное вскармливание);
- повышенная чувствительность к левофлоксацину или к другим хинолонам.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ



Нежелательные явления при использовании левофлоксацина (по результатам клинических исследований)

С осторожностью:

- у пациентов пожилого возраста в связи с высокой вероятностью наличия сопутствующего снижения функции почек, при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.



Левофлоксацин
$МПК_{90}$ (мкг/мл)

S pneumoniae 1.0
M pneumoniae 0.5
C pneumoniae 0.5
S aureus 0.25
K pneumoniae 0.25
E coli 0.12
M catarrhalis 0.06
H influenzae 0.03

Fish D. N., Chow A. W. 1997

ЭВОТРОН

ФАРМАКОДИНАМИКА

Синтетический антибактериальный препарат широкого спектра действия из группы фторхинолонов, содержащий в качестве активного вещества левофлоксацин - левовращающий изомер офлоксацина.
Левофлоксацин блокирует ДНК- гиразу (топоизомеразу II) и топоизомеразу IV, нарушает суперспирализацию и сшивку разрывов ДНК, ингибирует синтез ДНК, вызывает глубокие морфологические изменения в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах.

Высокоактивен		Умеренно активен	Малоактивен
• *S. pneumoniae* • Стрептококки • Стафилококки • Хламидии • Микоплазма • Легионелла • *H. parainfluenzae* • *M. catarrhalis* • *K. pneumonia* • *B. pertussis*	• Иерсинии • Сальмонеллы • *Citrobacter spp.* • *E. coli* • *Enterobacter spp.* • *Acinetobacter spp.* • *P. mirabilis, vulgaris* • *Neisseria spp.* • *C. perfringens* • *B. urealyticus*	• Энтерококки • Листерии • *Peptococcus* • *Peptostreptococcus* • *S. spp.* • *S. marcescens* • *K influenza* • *P. aeruginosa*	• *C. difficile* • *Pseudomonas spp.* • Фузобактерии • Грибы • Вирусы • *M. morgani*

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Инфекции ЛОР - органов	Острый синусит
	Средний отит
Инфекции нижних дыхательных путей	Обострение хронического бронхита
	Пневмонии
Инфекции половых органов	Сальпингоофорит
	Эндометрит
Профилактика после аборта	
Инфекции органов брюшной полости	Холецистит, Энтероколит
Инфекции костей и суставов	
Инфекции кожи и мягких тканей	
Комплексная терапия лекарственно устойчивых форм туберкулеза	
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит);	
Неосложненные инфекции мочевыводящих путей; простатит	

ЭВОТРОН

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ

- В/в капельно медленно. Продолжительность введения препарата в дозе 500 мг (100 мл инфузионного раствора/500 мг левофлоксацина) – не менее 60 мин.

- Препарат вводят в/в по 250-500 мг левофлоксацина 1-2 раза в сутки. Дозы определяются характером и тяжестью инфекции, а также чувствительностью предполагаемого возбудителя.

Инфекции кожи и мягких тканей	**500 мг левофлоксацина 1-2 раза/сутки. Курс лечения - 7-14 дней.**
Осложненные инфекции мочевыводящих путей (включая пиелонефрит)	**500 мг левофлоксацина 1 раз/сутки. Курс лечения - 7-10 дней.**
Септицемия/ бактериемия	**по 500 мг левофлоксацина 1-2 раза/сутки. Курс лечения - 10-14 дней.**
Интраабдоминальная инфекция	**по 500 мг левофлоксацина 1 раз/сутки. Курс лечения - 7-14 дней в комбинации с антибактериальными препаратами, действующими на анаэробную флору.**