Показания

- Рвота беременных (лат. hyperemesis gravidarum)
- Травматический шок
- Ожоговый шок
- Затяжные гнойные процессы
- Операционный шок
- Хронические токсические гепатиты
- Гемолитический шок
- Сахарный диабет
- Острая кровопотеря



Способ применения и дозирование

- Взрослым вводят в/в капельно, со скоростью 50–70 капель/мин, то есть 2,1–3,0 мл/кг/ч или 150–210 мл/ч.
- Максимальная доза: взрослым — 2100 мл/сут или 1,5 г ксилитола/кг массы тела в сутки.
- Максимальная скорость инфузии — 210 мл/ч (70 капель в минуту) = 0,15 г ксилитола/кг массы тела в час

При хронических и токсических гепатитах	Взрослым по 400 мл , капельно, однократно или дважды в сутки (суточная доза может быть разделена на 2 введения). Необходим контроль показателей функции печени
Для парентерального питания больных, в том числе больных сахарным диабетом	Взрослым по 600-1000 мл (10-15 мл/кг массы тела больного), однократно и повторно в течение суток
При травматическом, ожоговом, послеоперационном и гемолитическом шоке	Взрослым по 600-1000 мл (10-15 мл/кг массы тела больного), однократно и повторно в течение суток
В предоперационный период и после различных хирургических вмешательств	Взрослым в дозе 400-600 мл капельно (6-10 мл/кг), в/в капельно, однократно или повторно, ежедневно, на протяжении 3-5 дней
При острой кровопотере	Взрослым по 1000 - 1400 мл (до 20 мл/кг). В этом случае инфузии препарата рекомендуется также проводить на догоспитальном этапе, в специализированной машине скорой помощи

Применение при кетозе

- Взрослые (субкомпенсированный кетоз):5-6 мг/кг/сут со скоростью 50-70 кап/мин
- Взрослые(декомпенсированный кетоз):7-8 мг/кг/сут со скоростью 50-70 кап/мин

Побочные действия

- Аллергические реакции, включая сыпь, зуд, редко - тахикардия, повышение температуры тела, раздражение периферических вен в месте введения.

Противопоказания

- Гиперосмолярная кома, анурия. Элоксилит не показан в случаях, когда противопоказано вливание жидкости (отеки, кровоизлияние в мозг, тромбоэмболия, сердечно-сосудистая декомпенсация, артериальная гипертензия III ст.)

Производитель: «СП ООО Samarkand England Eco-Medical» SEEM Innovation. Health of the nation.

Элоксилит



Элоксилит

Лекарственная форма:
раствор для инфузий **250 мл**
Состав:
1 мл раствора содержит:
Активные вещества:
Ксилит - 50 мг
Натрия ацетата 2,6 мг
Натрия хлорида - 6 мг
Кальция хлорида - 0,1 мг
Калия хлорида - 0,3 мг
Магния хлорида - 0,1 мг

Ионный и мольный состав:

- Na+ – 134,4 ммоль/л,
- K+ – 4 ммоль/л,
- Ca ++ – 0,9 ммоль/л,
- Mg++ – 1,1 ммоль/л,
- Cl- – 110,6 ммоль/л,
- CH3COO- – 31,7 ммоль/л.
- Энергетическая ценность – 200 ккал\л
- Теоретическая осмолярность – 610 мОсмоль\л



Преимущества

- Уменьшает количество жирных кислот
- Стимулирует секрецию инсулина
- Оказывает выраженное антикетогенное действие
- Является источником энергии
- Имеет низкую токсичность и хорошую переносимость



ЭЛОКСИЛИТ

Полифункциональный гиперосмолярный раствор

Антикетогенное действие

Осмодиуретическое действие

Ощелачивающее действие

Энергетическое действие

Дезинтоксикационное действие