Уникальные фармакологические свойства

Кофермент митохондриальных ферментов:

Эндогенный антиоксидант нового поколения — Восстанавливает уровень глутатиона и активность супероксиддисмутазы

Многоуровневое метаболическое действие: — Снижает инсулинорезистентность. Способствует утилизации глюкозы и накоплению гликогена в печени.

Опыт применения

- **Более 20 лет клинического применения тиоктовой кислоты в терапии нейропатий.**
- **Эффективность подтверждена международными исследованиями.**

Способ применения и дозирование:

- **Оптимальная доза — 600 мг/сут в/в курсом 2–4 недели.**
- **Флакон с препаратом вынимают из коробки и немедленно накрывают прилагаемым светозащитным футляром, т.к. тиоктовая кислота чувствительна к свету.**
- **Инфузию производят непосредственно из флакона. Вводят медленно, около 1,7мл/мин, в течение 30 мин.**

Особые указания

- **Не сочетать с препаратами железа, магния, растворами глюкозы и Рингера.**
- **При диабете контролировать уровень глюкозы (возможна гипогликемия).**
- **Исключить употребление алкоголя на время**

Преимущества препарата ЭПСОЛ

Готовый раствор для инфузий (600 мг/50 мл) — удобство и точность дозирования.
Оптимальный pH 7,0–8,5 — комфортное введение.
Меглуминовая соль повышает стабильность и биодоступность.
Высокий профиль безопасности и хорошая переносимость.

Форма выпуска и производитель

Флакон 50 мл, 600 мг тиоктовой кислоты (в виде меглуминовой соли).
Раствор для внутривенного введения

Эпсол

Эпсол

Тиоктовая кислота 600 мг/50 мл
Раствор для инфузий

Эндогенный антиоксидант с выраженным нейрометаболическим и метаболическим действием. Тиоктовая кислота — ключ к восстановлению клеточного метаболизма и нейропротекции.

Показания и клиническая эффективность

Диабетическая и алкогольная полинейропатия:

Снижение выраженности боли, жжения, онемения.

Повышение чувствительности конечностей и улучшение качества жизни.

Метаболические нарушения:

Улучшение углеводно-липидного обмена.

Снижение оксидативного стресса и повышение антиоксидантной активности.