

國立中興大學附屬高級中學 112 學年度第 1 學期 高一期末考數學試題 命題：楊志偉 審題：張峻國  
班級：一年\_\_\_\_\_班 座號：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 試題共 4 頁+答案卡 1 張

備註：請於答案卡(卷)上劃(寫)上正確身分資料，若因未劃記書寫身分資料，或因劃記書寫錯誤，統一扣該科總成績 5 分。  
滿分 110 分，超過 100 分以 100 分計算。

第壹部分：選擇題（占 28 分）

一、單選題（占 12 分）

說明：第 1 題至第 2 題，每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項，請劃記在答案卡之「選擇（填）題答案區」。各題答對者，得 6 分；答錯、未作答或劃記多於一個選項者，該題以零分計算。

1. 設二次函數  $f(x) = kx^2 + 8x + (k + 6)$ ，不論  $x$  是任何實數， $f(x)$  的值恆正，則實數  $k$  的範圍為

- (1)  $k < -6$
- (2)  $k > 2$
- (3)  $-6 < k < 2$
- (4)  $k < -6$  或  $k > 2$
- (5) 任意實數

2. 當  $-2 \leq x \leq 1$  時，二次函數  $y = -(x - m)^2 + m^2 + 1$  有最大值 4，則實數  $m$  的值為


- (1)  $-\frac{7}{4}$
- (2)  $\sqrt{3}$  或  $-\sqrt{3}$
- (3) 2 或  $\sqrt{3}$  或  $-\sqrt{3}$
- (4) 2 或  $-\sqrt{3}$
- (5) 2 或  $-\sqrt{3}$  或  $-\frac{7}{4}$

二、多選題（占 16 分）


說明：第 3 題至第 4 題，每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項，請將正確選項劃記在答案卡之「選擇（填）題答案區」。各題之選項獨立判定，所有選項均答對者，得 8 分；答錯 1 個選項者，得 4.8 分；答錯 2 個選項者，得 1.6 分；答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答者，該題以零分計算。

3. 二次函數  $y = ax^2 + bx + c$  的部分圖形如右，且通過  $(-1, 0)$ ，對稱軸為  $x = 2$ ，請選出正確的選項。


- (1)  $a + c = b$
- (2)  $3a + b = 0$
- (3)  $25a + 5b + c > 0$
- (4)  $8a + b + c > 0$
- (5) 若圖形與  $y$  軸交點、頂點及  $(2, 0)$  形成直角三角形，則  $a = -\frac{1}{\sqrt{5}}$



4. 已知三次函數的圖形可以區分為圖一、圖二、圖三、圖四、圖五、圖六這六類，請問下列哪些選項中的三次函數圖形為圖六這一類？



圖一




圖二




圖三



圖四



圖五



圖六

- (1)  $y = x^3 - x$
- (2)  $y = -x^3 + 3x^2 - 4x + 3$
- (3)  $y = -x^3 - 3x^2 + 2x - 1$
- (4)  $y = -x^3 - 3x^2 - 3x + 2$
- (5)  $y = -(x-1)(x^2 + 4x + 5)$

## 第貳部分：選填題（占 72 分）

說明：1.第 A 至 L 題，將答案劃記在答案卡之「選擇（填）題答案區」所標示的列號（5-41）。

2.第 A 至 H 題，每題完全答對給 7 分，第 I 至 L 題，每題完全答對給 4 分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

- A. 多項式  $x^3 + mx^2 + 5x + 2$  能被  $x^2 + nx + 1$  整除，則數對  $(m, n) = \underline{(5, 6)}$ 。
- B. 多項式  $(x^2 + 2x - 1)^6$  除以  $x + 3$  的餘式為 ⑦⑧。
- C. 若多項式  $f(x)$  除以  $x - 1$  的餘式為 1，除以  $x - 2$  的餘式為 1，除以  $x - 3$  的餘式為 3，則  $f(x)$  除以  $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$  的餘式為 ⑨ $x^2$  - ⑩ $x$  + ⑪。
- D. 設  $f(x) = 2x^4 - 8x^3 + 5x^2 + 2x + 6$ ，則  $f(x)$  除以  $(x - 3)^3$  的餘式為 ⑫⑬ $(x - 3)^2$  + ⑭⑮ $(x - 3)$  + ⑯。
- E. 承上題， $f(3.001) = \underline{⑰.⑱⑲⑳}$ 。（四捨五入到小數點以下第三位）
- F. 滿足不等式  $x^2(x + 5)(x - 7)(x^2 + x - 12)(x^2 + x + 1) \leq 0$  的整數  $x$  有 ⑳ 個。

G. 若二次函數  $f(x)$  有最大值，且  $|f(1)| = |f(3)| = |f(5)| = |f(7)| = 16$ ，則  $f(x)$  之最大值為 ②②②③。


H. 多項式  $x^{113} + x^{112}$  除以  $x^2 - 3x + 2$  的餘式為  $(②④ \cdot ②⑤^{112} - ②⑥)x - ②⑦ \cdot ②⑧^{112} + ②⑨$ 。

I. 設  $x, y$  為實數，且  $x^2 + 2y^2 = 1$ ，若  $3x + 4y^2$  的最大值為  $M$ ，最小值為  $m$ ，則數對  $(M, m) = \left( \frac{③①③②}{③②}, ③③③④ \right)$ 。  
(化為最簡分數)

J. 已知三次函數  $f(x) = ax^3 + bx^2 + x + d$  圖形的對稱中心為  $(\frac{1}{2}, 0)$ ，且  $ax^3 + bx^2 + x + d = 0$  的三根  $\frac{1}{2}, \alpha, \beta$  滿足  $|\alpha| + |\beta| = 2$ ，則  $a = \underline{③⑤③⑥}$ 。

K. 若三次函數  $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$  圖形的對稱中心為  $(0, 3)$ ，且在  $x = 2$  附近的一次近似為  $y = 3x - 11$ ，  
則  $a = \frac{③⑦}{③⑧}$ 。(化為最簡分數)

- L. 如下圖，在平面直角坐標系中，拋物線  $y = ax^2 + bx - 4$  與  $x$  軸交於點  $A(-2, 0)$  和點  $B$ ，與  $y$  軸交於點  $C$ ，拋物線的對稱軸為直線  $x = 1$ 。若兩動點  $M$ 、 $H$  分別從點  $A$ 、 $B$  以每秒 1 個單位長度的速度沿  $x$  軸同時出發相向而行，當點  $M$  到達原點時，點  $H$  立刻掉頭並以每秒  $\frac{3}{2}$  個單位長度的速度向點  $B$  方向移動，當點  $M$  到達拋物線的對稱軸時，兩點停止移動，經過點  $M$  的直線  $l$  與  $x$  軸垂直，交  $\overline{AC}$  或  $\overline{BC}$  於點  $P$ 。設點  $M$  的運動時間為  $t$  秒 ( $0 \leq t \leq 3$ )，點  $M$  的運動時間  $t$  與  $\triangle APH$  的面積  $S$  之函數關係式為  $S(t) = \begin{cases} -t^2 + 6t, & 0 \leq t \leq 2 \\ g(t), & 2 < t \leq 3 \end{cases}$ ，則面積  $S(t)$  的最大值為  $\frac{\textcircled{39} \textcircled{40}}{\textcircled{41}}$ 。  
(化為最簡分數)



第參部分：加分題（占 10 分）

說明：第 M 至 O 題，配分標於題末，將答案劃記在答案卡之「選擇（填）題答案區」所標示的列號（42-45）。每題完全答對才給分，答錯不倒扣，未完全答對不給分。

M-O 題為題組

$f(x)$  為一多項式，已知對於任意實數  $x$ ，皆使  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100 \geq 0$  恆成立。

M.  $f(x)$  的次數為 ④②：(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 0 (5) 無次數。(單選題，2 分)

N.  $f(2)$  的最大可能值為 ④③。(選填題，4 分)

O.  $f(2)$  的最小可能值為 ④④ ④⑤。(選填題，4 分)

附註：形如  $f(g(x))$  稱為合成函數，例如  $f(x) = x^2 + x + 1$ ， $g(x) = 2x - 1$ ，

$$\text{則 } f(g(x)) = (g(x))^2 + (g(x)) + 1 = (2x-1)^2 + (2x-1) + 1$$

$$g(f(x)) = 2(f(x)) - 1 = 2(x^2 + x + 1) - 1$$

$$f(f(x)) = (f(x))^2 + (f(x)) + 1 = (x^2 + x + 1)^2 + (x^2 + x + 1) + 1$$

$$g(g(x)) = 2(g(x)) - 1 = 2(2x-1) - 1$$

參考答案：

1. (2)
2. (4)
3. (1)(4)(5)
4. (3)(5)
- A. (4, 2)
- B. 64
- C.  $x^2 - 3x + 3$
- D.  $41(x-3)^2 + 32(x-3) + 3$
- E. 3.032
- F. 8
- G. 20
- H.  $(3 \cdot 2^{112} - 2)x - 3 \cdot 2^{112} + 4$
- I.  $(\frac{25}{8}, -3)$
- J.  $-4$  ( $f(x) = -4(x + \frac{1}{2})(x - \frac{1}{2})(x - \frac{3}{2}) = -4x^3 + 6x^2 + x - \frac{3}{2}$ )
- K.  $\frac{7}{8}$  ( $f(x) = \frac{7}{8}x^3 + \frac{-15}{2}x + 3$ )
- L.  $\frac{25}{3}$  ( $S(t) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot (6-t) \cdot 2t, & 0 < t \leq 2 \\ \frac{1}{2} \cdot (\frac{3}{2}t + 1) \cdot (6-t), & 2 < t \leq 3 \end{cases}$ ,  $t = \frac{8}{3}$  時, 有最大值  $\frac{25}{3}$ )
- M. (1)
- N. 6
- O. -6

<Sol>

L. ①  $0 \leq t \leq 2$  時,  $\Delta PAH = \frac{1}{2} \cdot \overline{AH} \cdot \overline{MP} = \frac{1}{2} \cdot (\overline{AB} - \overline{BH}) \cdot (2\overline{AM}) = \frac{1}{2} \cdot (6-t) \cdot 2t = -t^2 + 6t = -(t-3)^2 + 9$   
 $\therefore t = 2$  時,  $\triangle APH$  有最大值 8

②  $2 < t \leq 3$  時,  $\Delta PAH = \frac{1}{2} \cdot \overline{AH} \cdot \overline{MP} = \frac{1}{2} \cdot (\overline{AB} - \overline{BH}) \cdot (\overline{MB}) = \frac{1}{2} \cdot (\overline{AB} - \overline{BH}) \cdot (\overline{AB} - \overline{AM})$   
 $= \frac{1}{2} \cdot (6 - (5 - \frac{3}{2}t)) \cdot (6-t) = \frac{1}{2} (\frac{3}{2}t + 1)(6-t) = -\frac{3}{4}t^2 + 4t + 3 = -\frac{3}{4}(t - \frac{8}{3})^2 + \frac{25}{3}$

其中  $\overline{BH} = 2 - \frac{3}{2}(t-2) = 5 - \frac{3}{2}t$

$\therefore t = \frac{8}{3}$  時,  $\triangle APH$  有最大值  $\frac{25}{3}$

M. 設  $f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots \Rightarrow f(1-x) = a(1-x)^n + b(1-x)^{n-1} + \dots$

故  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x)$  的次數  $1+n+n = 2n+1$  必為奇數

若  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100$  為奇函數, 則  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100$  的值有正有負

因此次數  $2n+1 = 3$ , 使得  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100$  為二次函數(偶函數)

$\therefore f(x) = ax + b$  為一次函數

N.  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100 = x(ax+b)(a(1-x)+b) + x^3 + 100 = (-a^2x^3 + a^2x^2 + b(a+b)x) + x^3 + 100$   
 $= (1-a^2)x^3 + a^2x^2 + b(a+b)x + 100$  為二次函數

$\Rightarrow 1-a^2 = 0 \Rightarrow a = \pm 1$

①  $a = 1$  時,  $f(x) = x + b$

則  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100 = x^2 + b(b+1)x + 100 \geq 0$  恆成立

$\Rightarrow (b(b+1))^2 - 4 \cdot 1 \cdot 100 \leq 0 \Rightarrow -20 \leq b(b+1) \leq 20 \Rightarrow -5 \leq b \leq 4$

$\therefore f(2) = 2+b$  的最大值 6, 最小值 -3

②  $a = -1$  時,  $f(x) = -x + b$

則  $x \cdot f(x) \cdot f(1-x) + x^3 + 100 = x^2 + b(b-1)x + 100 \geq 0$  恆成立

$\Rightarrow (b(b-1))^2 - 4 \cdot 1 \cdot 100 \leq 0 \Rightarrow -20 \leq b(b-1) \leq 20 \Rightarrow -4 \leq b \leq 5$

$\therefore f(2) = -2+b$  的最大值 3, 最小值 -6