

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (“МАЛЫЕ”) ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Теория типов, ИТМО, М3235-М3239, весна 2020 года

## Домашнее задание №1: «вводная лекция для ТТ и ФП»

1. Напомним определения с лекций:

Обозначение	лямбда-терм	название
$T$	$\lambda a. \lambda b. a$	истина
$F$	$\lambda a. \lambda b. b$	ложь
$Not$	$\lambda x. x \ F \ T$	отрицание
$And$	$\lambda x. \lambda y. x \ y \ F$	конъюнкция

Проредуцируйте следующие выражения и найдите нормальную форму:

- (a)  $T \ F$
  - (b)  $(T \ Not \ (\lambda t. t)) \ F$
  - (c)  $And \ F \ T$
  - (d)  $And \ T \ T$
2. Постройте лямбда-выражения для следующих булевских выражений:
- (a) Дизъюнкция
  - (b) Штрих Шеффера («и-не»)
  - (c) Исключающее или
3. Напомним определения с лекций:

$$f^{(n)} \ X ::= \begin{cases} X, & n = 0 \\ f^{(n-1)} \ (f \ X), & n > 0 \end{cases}$$

Обозначение	лямбда-терм	название
$\bar{n}$	$\lambda f. \lambda x. f^{(n)} \ x$	чёрчевский нумерал
$(+1)$	$\lambda n. \lambda f. \lambda x. n \ f \ (f \ x)$	прибавление 1
$IsZero$	$\lambda n. n \ (\lambda x. F) \ T$	проверка на 0

Используя данные определения, постройте выражения для следующих операций над числами:

- (a) Сложение
  - (b) Умножение на 2 ( $Mul2$ )
  - (c) Умножение
  - (d) Возведение в степень
  - (e) Проверка на чётность
  - (f) Деление на 3 (могут потребоваться пары и/или вычитания)
  - (g) Сравнение двух чисел ( $IsLess$ ) — истина, если первый аргумент меньше второго (могут потребоваться пары и/или вычитания)
4. Проредуцируйте выражение и найдите его нормальную форму:
- (a)  $\bar{2} \ \bar{2}$
  - (b)  $\bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2}$
  - (c)  $\bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2} \ \bar{2}$
5. Напомним определения с лекций:

Обозначение	лямбда-терм	название
$MkPair$	$\lambda a. \lambda b. (\lambda x. x \ a \ b)$	создание пары
$PrL$	$\lambda p. p \ T$	левая проекция
$PrR$	$\lambda p. p \ F$	правая проекция
$Case$	$\lambda l. \lambda r. \lambda c. c \ l \ r$	case для алгебраического типа
$InL$	$\lambda l. (\lambda x. \lambda y. x \ l)$	левая инъекция
$InR$	$\lambda r. (\lambda x. \lambda y. y \ r)$	правая инъекция

- (a) Убедитесь, что  $PrL (MkPair a b) \rightarrow_{\beta} a$ .
  - (b) Убедитесь, что  $Case (\lambda x.T) (\lambda y.y) (InR p) \rightarrow_{\beta} p$ .
  - (c) Постройте операцию вычитания 1 из числа
  - (d) Постройте операцию вычитания чисел
  - (e) Постройте операцию деления чисел
6. Напомним определение Y-комбинатора:  $\lambda f.(\lambda x.f (x x)) (\lambda x.f (x x))$ .
- (a) Покажите, что выражение  $Y f$  не имеет нормальной формы;
  - (b) Покажите, что выражение  $Y (\lambda f.\bar{0})$  имеет нормальную форму.
  - (c) Покажите, что выражение  $Y (\lambda f.\lambda x.(IsZero x) \bar{0} (f Minus1 x)) 2$  имеет нормальную форму.
  - (d) Какова нормальная форма выражения  $Y (\lambda f.\lambda x.(IsZero x) \bar{0} ((+1) (f Minus1 x))) \bar{n}$ ?
  - (e) Какова нормальная форма выражения  $Y (\lambda f.\lambda x.(IsZero x) \bar{1} (Mul2 (f Minus1 x))) \bar{n}$ ?
  - (f) Определите с помощью Y-комбинатора функцию для вычисления  $n$ -го числа Фибоначчи.
7. Пусть  $\eta = (\alpha \rightarrow \alpha) \rightarrow (\alpha \rightarrow \alpha)$ . Покажите (т.е. постройте соответствующее доказательство в исчислении по Карри), что:
- (a)  $\vdash \bar{2} : \eta$ .
  - (b)  $\vdash (+1) : \eta \rightarrow \eta$ .
  - (c)  $\vdash Plus : \eta \rightarrow \eta$ .
  - (d)  $\vdash Mul : \eta \rightarrow \eta$  (не каждая реализация умножения будет удовлетворять этому свойству; вам требуется найти нужную)
8. Определим на языке Хаскель следующую функцию: `show_church n = show (n (+1) 0)` Убедитесь, что `show_church (\f -> \x -> f (f x))` вернёт 2. Пользуясь данным определением и его идеей, реализуйте следующие функции:
- (a) `int_to_church` — возвращает чёрчевский нумерал (т.е. функцию от двух аргументов) по целому числу. Каков точный тип результата этой функции?
  - (b) сложение двух чёрчевских нумералов.
  - (c) умножение двух чёрчевских нумералов.
  - (d) можно ли определить вычитание 1 и вычитание? Что получается, а что — нет?
9. Типы для конъюнкции и дизъюнкции на Хаскеле. Списки.
- Заметим, что список (например, целых чисел) — это алгебраический тип:
- ```
List = Nil | Cons Integer List.
```
- Можно сконструировать значение данного типа: `Cons 3 (Cons 5 Nil)`. Можно, например, вычислить его длину:
- ```
length Nil = 0
length (Cons _ tail) = length tail + 1
```
- Определим  $Nil = InL 0$ , а  $Cons a b = InR (MkPair a b)$ . Заметим, что теперь списки могут быть напрямую перенесены в лямбда выражения. Тогда, используя данную идею, реализуйте в Хаскеле:
- (a) определите конструкции `mkipair`, `prl`, `prg` на Хаскеле — какой тип у данных конструкций? Сравните его с типом конъюнкции с лекции.
  - (b) определите конструкции `case`, `inl`, `inr` — какой тип у данных конструкций? Сравните его с типом дизъюнкции с лекции.
  - (c) постройте список целых чисел из данных конструкций.
  - (d) определите функцию вычисления длины списка целых чисел с помощью данных конструкций (к сожалению, скомпилировать это выражение на Хаскеле не получится — поэтому достаточно написать исходный код).

## Домашнее задание №2: «формализация лямбда-исчисления»

1. На лекции было использовано понятие свободы для подстановки.
  - (a) Найдите лямбда-выражение, которое при однократной редукции требует переименования связанных переменных (редукция невозможна без переименования).
  - (b) Заметим, что даже если мы запретим использовать одни и те же переменные в разных лямбда-абстракциях, это не будет решением проблемы переименований. Предложите лямбда-выражение, в котором (a) все лямбда-абстракции указаны по разным переменным; но (б) через некоторое количество редукций потребуется переименование связанных переменных.
2. Дадим определение: комбинатор — лямбда-выражение без свободных переменных.  
Также напомним определение:

Также напомним определение:

$$\begin{aligned} S &:= \lambda x. \lambda y. \lambda z. x \ z \ (y \ z) \\ K &:= \lambda x. \lambda y. x \\ I &:= \lambda x. x \end{aligned}$$

Известна теорема о том, что для любого комбинатора  $X$  можно найти выражение  $P$  (состоящее только из скобок, пробелов и комбинаторов  $S$  и  $K$ ), что  $X =_{\beta} P$ . Будем говорить, что комбинатор  $P$  *выражает* комбинатор  $X$  в базисе  $SK$ .

Выразите в базисе  $SK$ :

- (a)  $F = \lambda x. \lambda y. y$
- (b)  $\bar{1}$
- (c)  $Not$
- (d)  $Xor$
- (e)  $InL$
- (f)  $\bar{n}$

3. Бесконечное количество комбинаторов неподвижной точки. Дадим следующие определения

$$\begin{aligned} L &:= \lambda abcdefghijklmnopqrstuvwxyzr.r(\text{this is a fixed point combinator}) \\ R &:= LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL \end{aligned}$$

В данном определении терм  $R$  является комбинатором неподвижной точки: каков бы ни был терм  $F$ , выполнено  $R F =_{\beta} F (R F)$ .

- (a) Докажите, что данный комбинатор — действительно комбинатор неподвижной точки.
- (b) Пусть в качестве имён переменных разрешены русские буквы. Постройте аналогичное выражение по-русски: с 33 параметрами и осмысленной русской фразой в терме  $L$ ; покажите, что оно является комбинатором неподвижной точки.
4. Пусть задано  $n \in \mathbb{N}$ . Постройте лямбда-выражение, которое преобразуется в нормальную форму в  $n$  раз медленнее с помощью нормального порядка редукции, чем с помощью какого-то другого (самого быстрого) порядка редукции.
5. Чёрчевские нумералы соответствуют натуральным числам в аксиоматике Пеано.
  - (a) Предложите «двоичные нумералы» — способ кодирования чисел, аналогичный двоичной системе (такой, при котором длина записи числа соответствует логарифму числового значения).
  - (b) Предложите реализацию функции  $(+1)$  в данном представлении.
  - (c) Предложите реализацию лямбда-выражения преобразования числа из двоичного нумерала в чёрчевский.
  - (d) Предложите реализацию функции сложения в данном представлении.
  - (e) Предложите реализацию функции вычитания в данном представлении.
  - (f) Какова вычислительная сложность арифметопераций с двоичными нумералами?
6. Предложим альтернативные аксиомы для конъюнкции:

$$\frac{\Gamma \vdash \alpha \quad \Gamma \vdash \beta}{\Gamma \vdash \alpha \& \beta} \text{Введ. \&} \quad \frac{\Gamma \vdash \alpha \& \beta \quad \Gamma, \alpha, \beta \vdash \gamma}{\Gamma \vdash \gamma} \text{Удал. \&}$$

- (а) Предложите лямбда-выражения, соответствующие данным аксиомам; поясните, как данные выражения абстрагируют понятие «упорядоченной пары».
- (б) Выразите изложенные в лекции аксиомы конъюнкции через приведённые в условии.
- (с) Выразите приведённые в условии аксиомы конъюнкции через изложенные в лекции.
7. Как мы уже разбирали,  $\not\vdash x : \tau$  в силу дополнительных ограничений аксиомы

$$\frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} x \notin FV(\Gamma)$$

Найдите лямбда-выражение  $N$ , что  $\not\vdash N : \tau$  в силу ограничения аксиомы

$$\frac{\Gamma, x : \sigma \vdash N : \tau}{\Gamma \vdash \lambda x. N : \sigma \rightarrow \tau} x \notin FV(\Gamma)$$

### Домашнее задание №3: «вывод типов; алгоритм унификации»

- Вполне упорядоченным множеством назовём такое линейно-упорядоченное отношение ( $<$ ) множество  $S$  (и такой порядок назовём *полным*), что какое бы ни было множество  $U \subseteq S$ , в  $U$  найдётся наименьший элемент.
  - Покажите, что неотрицательные вещественные числа  $[0, +\infty)$  — не вполне упорядоченное множество. Существуют ли конечные и счётные не вполне упорядоченные множества?
  - Определим лексикографический порядок на  $\mathbb{N}^n$ : положим, что  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle < \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$ , если найдётся такой  $k$ , что  $a_1 = b_1, \dots, a_{k-1} = b_{k-1}$ , но  $a_k < b_k$ . Покажите, что такой порядок — полный.
  - Пусть  $S$  вполне упорядочено отношением ( $<$ ), определим  $a > b := b < a$ . Пусть  $a_1 > a_2 > a_3 > \dots$  — строго монотонно убывающая последовательность значений из  $S$ . Покажите, что данная последовательность всегда имеет конечную длину.
- Рассмотрим полное интуиционистское исчисление высказываний. Дополните алгоритм вывода типов дополнительными функциональными символами для связок  $\&$ ,  $\vee$  и  $\perp$  (а также сделайте дополнительные необходимые исправления в нём) и продемонстрируйте вывод типов для выражения, использующего хотя бы две из данных трёх конструкций.
- Поясним название «алгебраические типы» — это семейство составных типов, позволяющих строить «алгебраические» выражения на типах:

название	обозначение	алгебраический смысл
тип-сумма, «алгебраический»	$\alpha \vee \beta$	$\alpha + \beta$
тип-произведение, пара	$\alpha \& \beta$	$\alpha \times \beta$
тип-степень, функция	$\alpha \rightarrow \beta$	$\beta^\alpha$

Название «алгебраический» закрепилось в первую очередь за типом-суммой (видимо потому, что остальные типы имеют устоявшиеся названия), однако, может быть отнесено и к другим типам.

Поясните «типовый» (программистский) смысл следующих алгебраических тождеств — и постройте программы, их доказывающие:

- $\gamma \times (\alpha + \beta) = \gamma \times \alpha + \gamma \times \beta$ .
  - $\gamma^{\alpha \times \beta} = (\gamma^\alpha)^\beta$ . Как называется данное тождество?
  - $\gamma^{\alpha + \beta} = \gamma^\alpha \times \gamma^\beta$ .
4. Найдите лямбда-выражения, доказывающие:
- Формулу де-Моргана  $\neg(\alpha \vee \beta) \rightarrow \neg\alpha \& \neg\beta$ .
  - Контрапозицию  $(\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg\beta \rightarrow \neg\alpha)$ .
  - Закон исключённого третьего после применения теоремы Гливленко  $\neg\neg(\alpha \vee \neg\alpha)$ .

## Домашнее задание №4: «логика второго порядка; система F»

- Докажите в исчислении предикатов второго порядка теоремы–аналоги правил вывода для следующих связок:

- конъюнкция;
- дизъюнкция;
- отрицание и ложь;
- квантор существования.

Напомним: в задании требуется по заданным аксиоме и аргументам связки найти такое дерево применений правил И.П. 2 порядка, которым можно было бы заменить применение исходной аксиомы.

- Напомним, что в системе F естественно предложить выражение  $\Lambda\alpha.\lambda f^{\alpha \rightarrow \alpha}.\lambda x^\alpha.f^n x$  как аналог для чёртевого нумерала. Постройте в F выражения для следующих функций и выведите их тип:

- сложение;
- умножение;
- возведение в степень
- вычитание 1

- Перенесите в систему F выражения для булевских значений и операции And и выведите их тип.

- Выразите в языке Хаскель конструкции системы F через импликацию и квантор всеобщности.

Точнее: запишите выражение, напишите программы, доказывающие соответствующие аксиомы, укажите, как преобразовать данное выражение в нативный хаскелевский тип и наоборот. При реализации вам потребуется использовать квантор всеобщности в типах (`type T = forall x. ...`) и включить опцию RankNTypes.

Список конструкций:

- конъюнкция;
- дизъюнкция;
- отрицание и ложь (соответствует `undefined`).

- Экзистенциальные типы.* Укажем правила вывода для квантора существования в системе F:

$$\frac{\Gamma \vdash M : \sigma[\alpha := \tau]}{\Gamma \vdash \mathbf{pack} \ \tau, M \ \mathbf{to} \ \exists\alpha.\sigma : \exists\alpha.\sigma} \text{ Введ. } \exists$$

$$\frac{\Gamma \vdash M : \exists\alpha.\sigma \quad \Gamma, x : \sigma \vdash N : \rho}{\Gamma \vdash \mathbf{abstype} \ \alpha \ \mathbf{with} \ x : \sigma \ \mathbf{is} \ M \ \mathbf{in} \ N : \rho} \text{ Удал. } \exists; \alpha \notin FV(\Gamma, \rho)$$

Постараемся прояснить смысл данных конструкций. В объектно-ориентированных языках программирования обычно хранение данных объединено с библиотечной структурой: структура данных всегда неявно присутствует как параметр методов класса. Аналогия с квантором существования подсказывает, что эта связь необязательна: библиотека характеризуется сигнатурой её методов ( $\sigma$ ) и типом, хранящим значения ( $\alpha$ ).

Если мы хотим задать некоторый абстрактный тип данных, мы используем `pack`. Например, давайте построим АТД «список» в некотором обобщении лямбда-исчисления:

```
let intstack = pack list, ⟨Nil, ⟨(λllist.λxint.Cons x l), (λllist.⟨Head l, Tail l⟩)⟩⟩
to ∃α.α & ((α → int → α) & (α → int & α))
```

Если же мы желаем использовать такой АТД, мы используем `abstype`; вот такой код вернёт число 12:

```
abstype α with x : α & ((α → int → α) & (α → int & α)) is intstack in
let stα = PrL x in
let stα = (PrL (PrR x)) st 12 in
PrL ((PrR (PrR x)) st)
```

В завершение определим правило бета-редукции для данных конструкций.

$$\mathbf{abstype} \ \alpha \ \mathbf{with} \ x : \sigma \ \mathbf{is} \ \mathbf{pack} \ M, \tau \ \mathbf{to} \ \exists\alpha.\sigma \ \mathbf{in} \ N \rightarrow_\beta N[\alpha := \tau][x := M]$$

- (a) Предъявите лямбда-выражение, соответствующее `pack` в системе F (без использования сокращений записи — в частности, без  $(\exists)$ ). Покажите, что оно действительно имеет приписываемый ему тип.
- (b) Предъявите лямбда-выражение, соответствующее `abstype` в системе F (без  $(\exists)$ ). Покажите, что оно действительно имеет приписываемый ему тип.
- (c) Рассмотрим вариант системы F, типизированный по Карри (отсутствуют типовые абстракции и применения, а также указания типов в аргументах). Предложите реализацию `pack` и `abstype` в этом варианте исчисления.
- (d) Предложите реализацию на Хаскеле и пример использования для массива фиксированного размера (размер указывается при инициализации), соответствующего интерфейсу, заданному следующим экзистенциальным типом (для компиляции требуется включить опцию `RankNTypes`):
 

```
data AbstractArray x = AA (forall b . (forall a .
      (Integer -> a, a -> (Integer, x) -> a, a -> Integer -> (a, x)) -> b) -> b)
```
- (e) Предположим, что в Джаве мы не используем наследования, а только разрешаем реализовывать интерфейсы. Предложите формализацию для классов и интерфейсов с использованием экзистенциальных типов. Как реализовать публичные и приватные поля?

## Домашнее задание №5: «Типовая система Хиндли-Милнера»

1. Покажите, что если  $\phi$  — тип в системе Хиндли-Милнера, то существует  $n \in \mathbb{N}_0$ , что  $\phi \in R(n)$ .
2. Покажите, что если  $\phi \in R(n)$  и  $n < m$ , то  $\phi \in R(m)$ .
3. Пусть  $\phi$  — формула И.П. ранга 1. Покажите, что существует такое выражение  $\sigma$  с поверхностными кванторами, что  $\vdash \phi \rightarrow \sigma$  и  $\vdash \sigma \rightarrow \phi$ . Для этого:
  - (a) Покажите, что если  $\phi$  — формула ранга 1, то она имеет вид либо  $\xi$ , либо  $\forall x.\psi$ , либо  $\xi \rightarrow \psi$ , где  $\psi$  — формула ранга 1, а  $\xi$  — формула ранга 0.
  - (b) Покажите, что если  $\phi = \chi \rightarrow \forall x.\psi$ , где  $x \notin FV(\chi)$ , то  $\vdash \phi \rightarrow (\forall x.\chi \rightarrow \psi)$  и  $\vdash (\forall x.\chi \rightarrow \psi) \rightarrow \phi$ .
  - (c) Покажите, что  $\vdash (\forall x.\psi) \rightarrow \forall y.\psi[x := y]$  и  $\vdash (\forall y.\psi[x := y]) \rightarrow \forall x.\psi$ , если  $y$  не входит свободно в  $\psi$ .
  - (d) Опираясь на утверждения выше, покажите искомое утверждение.
4. *О выразительной силе НМ.* Заметим, что список — это «параметризованные» числа в аксиоматике Пеано. Число — это длина списка, а к каждому штриху мы присоединяем какое-то значение. Операции добавления и удаления элемента из списка — это операции прибавления и вычитания единицы к числу.

Рассмотрим тип «бинарного списка»:

```
type 'a bin_list = Nil | Zero of (('a*'a) bin_list) | One of 'a * (('a*'a) bin_list);;
```

Если бы такое можно было выразить в типовой системе Хиндли-Милнера, то операция добавления элемента к списку записалась бы на языке Окамль вот так (сравните с прибавлением 1 к числу в двоичной системе счисления):

```
let rec add elem lst = match lst with
  Nil -> One (elem,Nil)
  | Zero tl -> One (elem,tl)
  | One (hd,tl) -> Zero (add (elem,hd) tl)
```

- (a) Какой тип имеет `add` (обратите внимание на ключевое слово `rec`: для точного указания соответствующего лямбда-выражения и вывода типа необходимо использовать Y-комбинатор)? Считайте, что семейство типов `bin_list 'a` предопределено, и обозначается как  $\tau_a$ . Также считайте, что определены функции `roll` и `unroll` с надлежащими типами.
- (b) Какой ранг имеет тип этой функции? Почему этот тип не выразим в типовой системе Хиндли-Милнера?
- (c) Предложите функцию для удаления элемента списка (головы).

- (d) Предложите функцию для эффективного соединения двух списков (источник для вдохновения — сложение двух чисел в столбик).
- (e) Предложите функцию для эффективного выделения  $n$ -го элемента из списка.
5. Используя расширения системы Хиндли-Милнера (изо-рекурсивные типы и  $Y$ -комбинатор), определите тип для списка и реализуйте функцию, вычисляющую длину списка.
6. Выразите  $Y$ -комбинатор в Хаскеле и докажите с его помощью, что  $\phi \rightarrow \neg\phi$ ,  $\alpha \rightarrow \alpha \ \& \ \beta$  и  $\neg\neg\phi \rightarrow \phi$ .
7. Постройте в НМ вывод (дерево из аксиом и правил вывода) для **let**  $t = \lambda f.\lambda x.f\ x$  **in**  $t\ t$ .
8. Рассмотрим следующий код на Окамле, содержащий определения чёрчевских нумералов и некоторых простых операций с ними:

```
let zero = fun f x -> x;;
let plus1 a = fun f -> fun x -> a f (f x);;
let power m n = n m;;

let two = plus1 (plus1 zero);;
let two2 = fun f x -> f (f x);;

let e  = power two two;;           (* не компилируется *)
let e2 = power two2 two2;;         (* компилируется и работает *)
```

Поясните, почему:

- (a) определение  $e2$  компилируется и работает;
- (b) определение  $e$  не компилируется.

Пояснение должно содержать необходимые фрагменты вывода типа в системе Хиндли-Милнера, или должно показывать, что нужного вывода типа не существует.

## Домашнее задание №6: «Обобщённые типовые системы, исчисления конструкций»

1. Укажите тип (род) в исчислении конструкций для следующих выражений (при необходимости определите типы используемых базовых операций и конструкций самостоятельно):
- (a) В алгебраическом типе `'a option = None | Some 'a` предложите тип (род) для: `Some`, `None` и `option`.
- (b) Пусть задан род `nonzero : * → *`, выбрасывающий нулевой элемент из типа. Например, `nonzero unsigned` — тип положительных целых чисел. Тогда, для кода
- ```
template<typename T, T x>
struct NonZero { const static std::enable_if_t<x != T(0), T> value = x; };
```
- предложите тип (род) поля `value`.
2. Предложите выражение на языке C++ (возможно, использующее шаблоны), имеющее следующий род (тип):
- (a)  $\star \rightarrow \star \rightarrow \star$ ;  $\star \rightarrow \text{unsigned}$
- (b)  $\text{int} \rightarrow (\star \rightarrow \star)$
- (c)  $(\star \rightarrow \text{int}) \rightarrow \star$
- (d)  $\Pi x^{\star}. n^{\text{int}}. F(n, x)$ , где

$$F(n, x) = \begin{cases} \text{int}, & n = 0 \\ x \rightarrow F(n, x), & n > 0 \end{cases}$$

3. Аналогично типу  $\Pi$ , мы можем ввести тип  $\Sigma$ , соответствующий квантору существования в смысле изоморфизма Карри-Ховарда.
- (a) Определите правила вывода для  $\Sigma$  в обобщённой типовой системе (воспользуйтесь правилами для экзистенциальных типов в системе  $F$ ).
- (b) Укажите способ выразить  $\Sigma$  через  $\Pi$  (также воспользуйтесь идеями для системы  $F$ ).

## Домашнее задание №7: «Теория множеств»

1. Пусть  $a$  и  $b$  — пустые множества. Покажите, что  $a = b$ .
2. Построение множеств. Покажите, что если  $a, b$  — множества, то следующие «наивные» конструкции тоже являются множествами:
  - (a)  $\bigcap a$  (пересечение всех подмножеств множества  $a$ );
  - (b)  $a \setminus b$  (разность множеств);
  - (c)  $a \uplus b$  (дизъюнктное объединение множеств);
  - (d)  $a \times b$  (декартово произведение множеств:  $\{\langle p, q \rangle \mid p \in a, q \in b\}$ ).
3. Покажите, что если  $\langle a, b \rangle = \langle c, d \rangle$ , то  $a = b$  и  $c = d$ .
4. Последовательностью элементов из  $S$  длиной  $k$  назовём множество  $A$  пар  $\langle o, s \rangle$ , что:
  - (a)  $o \in k, s \in S$ ;
  - (b) нет таких двух пар  $\langle o_1, s_1 \rangle$  и  $\langle o_2, s_2 \rangle$ , что  $o_1 = o_2$  и  $s_1 \neq s_2$ ;
  - (c)  $\langle 0, s \rangle \in A$  при некотором  $s$ ;
  - (d) Если  $\langle o, s_1 \rangle \in A$  и  $o' \in k$ , то  $\langle o', s_2 \rangle \in A$  при некотором  $s_2$ .

Будем записывать элементы последовательности как  $s_o$  и говорить что они занумерованы ординалами до  $k$ .

Пусть  $a_0, a_1, a_2, \dots$  — некоторая убывающая последовательность ординалов, занумерованных до некоторого ординала  $k$ : то есть,  $a_i$  — ординал, и, если  $i \in j$ , то  $a_j \in a_i$ . Покажите, что тогда ординал  $k$  — конечный.

5. Давайте покажем, что ординалы линейно упорядочены.
  - (a) Пусть  $a$  — ординал. Покажите, что  $\emptyset \in a$  или  $a = \emptyset$ .
  - (b) Пусть  $a$  — ординал. Покажите, что если  $x \in a$ , то  $x$  — ординал.
  - (c) Пусть  $a$  и  $b$  — ординалы, и  $a \in b$ . Покажите, что  $a' \in b$  или  $a = b$ .
  - (d) Пусть  $a$  и  $b$  — два ординала. Покажите, что  $a \in b$ , или  $b \in a$ , или  $a = b$ .
6. Покажите, что ординалы вполне упорядочены.
7. Пусть  $S$  — множество ординалов: если  $x \in S$ , то  $x$  — ординал. Определите операцию  $\sup_{ord} S$  — строящую минимальный ординал  $k$ , что  $x \in k$ , если  $x \in S$ .
8. Упростите по необходимости левую и правую часть равенств на ординалах и проверьте равенства:
  - (a)  $(\omega + 1)^2 = \omega^2 + \omega \cdot 2 + 1$ ;
  - (b)  $(\omega + \omega)^2 = \omega^2 \cdot 4$ ;
  - (c)  $(\omega^2)^\omega = \omega^\omega$ ;
  - (d)  $1^\omega = \omega$ ;
  - (e)  $2^\omega = \omega$ ;
  - (f)  $(\omega + 1) \cdot \omega = \omega^2 + \omega$ ;
  - (g)  $(\omega + 1)^\omega = \omega^\omega + 1$ .

## Домашнее задание №8: «Язык Аренд»

1. Равенство.
  - (a) Докажите, что `left = right`
  - (b) Докажите, что если  $a, b : \text{Nat}$  и  $a = b$ , то  $\neg(a \neq b)$
  - (c) Докажите, что если  $a, b : \text{Nat}$ , то  $a = b \vee a \neq b$
2. Определим отношение «меньше» на натуральных числах так:



```
\data NatLess (a b : Nat) \with
  | 0, suc m => natless_less
  | suc m, suc n => natless_next (NatLess m n)
```

Данный тип изоморфен утверждению  $a < b$ . Например, утверждение  $1 < 3$  доказывается так:  
`\func zerolesszero : NatLess 1 3 => natless_next (natless_less)`

Докажите (везде предполагается, что  $a, b, c : \text{Nat}$ , если не указано иного):

- (a)  $a < a + b + 1$ ; то есть, определите функцию  
`\func n_less_sum (a b : Nat) : NatLess a (a Nat.+ suc b)`
  - (b) Если  $a < b$ , то  $a + c < b + c$
  - (c) Если  $a < b$  и  $c < d$ , то  $a \cdot c < b \cdot d$
  - (d)  $a < 2^a$
  - (e) Транзитивность: если  $a < b$  и  $b < c$ , то  $a < c$
  - (f) Определите аналогичное отношение «меньше или равно» и докажите его антисимметричность
  - (g) Если  $a \neq b$ , то  $a < b \vee b < a$
  - (h) Докажите, что  $a < b$  тогда и только тогда, когда  $\mathbf{a} < \mathbf{b}$  в смысле стандартных определений Аренда.
3. Аналогично предыдущему упражнению, определите тип данных **Even** («чётное натуральное число») и докажите следующие утверждения:
- (a) Если  $n$  — чётное, то  $\exists x. x + x = n$
  - (b) Если  $n$  таково, что  $\exists x. x + x = n$ , то  $n$  — чётное
  - (c) Если  $\exists x. x + x + 1 = n$ , то неверно, что  $n$  — чётное
4. Определите отношение (тип) «делится нацело» и докажите:
- (a) Рефлексивность, транзитивность и антисимметричность отношения
  - (b)  $a \cdot b$  делится нацело на  $a$  и на  $b$
  - (c) Если  $a$  делится нацело на  $b$ , то  $\exists t. a = b \cdot t$
  - (d) Если  $\exists t. a = b * t$ , то  $a$  делится нацело на  $b$
  - (e) Если  $a < b$ , то невозможно, чтобы  $a$  делилось нацело на  $b$