ISSN 0100-8919

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA
Vinculada ao Ministério da Agricultura
Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Bagé
UEPAE de Bagé
BR 153 Km 141
Caixa Postal 242
96400 Bagé, RS

COMUNICADO TÉCNICO

Nº 2, dez/85, p.1-6.

ASPECTOS A CONSIDERAR NA TOSQUIA DOS OVINOS

Arturo Bernardo Selaive-Villarroel[1]

A tosquia é a colheita da lã. Representa o fruto de um ano de produção, constituindo uma das práticas de maior atividade na propriedade rural. É uma operação importante em função dos efeitos físicos que exerce no animal como na própria lã que ele produz. Uma boa programação permite melhorar a eficiência da tosquia e a manipulação dos velos. Nesta, o produtor deve considerar, entre outros, os seguintes aspectos: qual é a melhor época para tosquiar os ovinos? é de interesse tosquiar os cordeiros? em que ordem os animais devem ser tosquiados? na ocasião da tosquia, quais são os cuidados com a lã para evitar a depreciação dos velos?

Nas respostas a estas perguntas deve-se considerar uma série de fatores que influem na lã e no manejo do rebanho.

QUANDO TOSQUIAR?

A decisão da época de tosquia está fortemente influenciada por fatores climáticos e/ou de manejo. Tradicionalmente, os ovinos no Rio Grande do Sul são tosquiados anualmente na primavera, principalmente nos meses de outubro-novembro, após a parição e antes do desmame dos cordeiros, quando as chuvas e/ou frio de inverno passaram e antes da época de incidência de bichei

[1]Méd.Vet., Ph.D. EMBRAPA/Unidade de Execução de Pesquisa de Âmbito Estadual de Bagé (UEPAE de Bagé), Caixa Postal 242, CEP 96400 Bagé, RS.

ras. As condições climáticas com tempo frio, chuva e vento, cinco a sete dias após a tosquia, podem ocasionar mortalidade de até 20-25% do rebanho, afetando principalmente as ovelhas com cria, velhas e/ou magras.

Em geral as ovelhas podem ser tosquiadas em 3 épocas diferentes do ciclo de produção:

1) antes do acasalamento (tosquia de outono);
2) antes da parição (tosquia pré-parto);
3) antes ou durante o desmame dos cordeiros (tosquia de primavera).

Diversos trabalhos de pesquisa têm avaliado o efeito da época de tosquia na produção de lã e fertilidade das ovelhas. Estudos realizados nos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, em que foram comparadas duas épocas de tosquia (primavera e outono) em ovelhas da raça Corriedale, não foram observadas diferenças significativas na produção de lã e no comportamento reprodutivo, porém houve diferença na qualidade dos velos. As ovelhas com tosquia na primavera apresentaram uma maior incidência de velos com capacho e as tosquiadas no outono uma maior incidência de velos amarelos. Por outro lado, fatores como condições climáticas mais favoráveis após tosquia, a maior idade das cordeiras e borregas na tosquia, conseqüentemente com mais lã, e a menor quantidade de lã que possuem as ovelhas no momento da parição, são aspectos favoráveis para a tosquia de outono.

Todavia, a tosquia pré-parto é a que apresenta maiores vantagens em termos de qualidade de velo e facilidade no manejo do rebanho. Esta prática não é empregada no Rio Grande do Sul, salvo raras exceções, pelas condições climáticas adversas que ocorrem no período pré-parição das ovelhas, porém, a pesquisa tem mostrado que o uso de capas protetoras, que podem ser feitas de sacos de adubo, por 2-3 semanas após a tosquia, constitui uma solução para o problema. As vantagens e desvantagens das diferentes épocas de tosquia dos ovinos no estado do Rio Grande do Sul são mostradas ao final do texto.

De uma maneira geral, pode-se dizer que a época da tosquia não influi significativamente na quantidade de lã produzida, mas tem efeito na qualidade do velo e, fundamentalmente, no manejo do rebanho, principalmente para os cordeiros.

O aumento na freqüência das tosquias pode aumentar a produção de lã. Em alguns países têm sido observados, em ovelhas falhadas, aumentos na produção de lã de até 15%, com duas tosquias por ano. Em nosso meio, não existem trabalhos de pesquisa que permitam preconizar um maior número de tosquias por ano, embora o preço da lã de "retosa" (6 meses de crescimento) corresponda a mais de 60% do valor do velo (12 meses de crescimento), já descontado o

valor da tosquia extra. Observações pessoais do autor em ovinos de "cabanha", onde as condições de criação são superiores a média dos rebanhos gerais, e onde a finalidade principal da exploração é a venda de reprodutores, a prática de duas tosquias por ano mostrou-se favorável em função do manejo do rebanho.

A TOSQUIA DO CORDEIRO

É bastante generalizado o argumento de que os cordeiros, após a tosquia, apresentam um maior desenvolvimento corporal. Entretanto, alguns sustentam que a tosquia dos cordeiros não compensa, pela reduzida quantidade de lã obtida e o custo da operação. Somente nos campos com problemas de semente ("flechilha", trevo carretilha) é unânime a opinião da necessidade de tosquiar os cordeiros.

No estado do Rio Grande do Sul, o manejo dos cordeiros não recebe a devida atenção, por este motivo, o produtor muitas vezes desconhece a conveniência ou não de tosquiar os cordeiros, assim como da idade ou da época mais apropriada para isso. As respostas a essas perguntas variam segundo a finalidade comercial dos cordeiros. Aqueles que vão ser vendidos na época de Natal, com 3-4 meses de idade e ainda não desmamados, não convém serem tosquiados. Os destinados para venda com aproximadamente 8 meses de idade (borregão) é conveniente tosquiá-los no outono (março-abril) e abatê-los entre 30 a 45 dias mais tarde para obtenção de peles de melhor qualidade. Aqueles a serem comercializados com aproximadamente 14-16 meses de idade (2 dentes), convém tosquiá-los pela primeira vez após desmame e/ou na primavera do ano seguinte (setembro-outubro) e vendê-lo no verão (novembro-dezembro).

Tratando-se de cordeiras a serem retidas no rebanho, a tosquia deve ser feita considerando a época das ovelhas. Quando se faz tosquia de outono ou tosquia pré-parto, as cordeiras são esquiladas no ano seguinte, junto com as ovelhas. No caso das ovelhas serem tosquiadas na primavera, as cordeiras podem ser tosquiadas junto com as ovelhas quando apresentarem bom desenvolvimento, caso contrário devem ser tosquiadas ao desmame (verão), geralmente no mês de janeiro.

ORDEM DE TOSQUIA DOS ANIMAIS

Os ovinos devem ser tosquiados separadamente por categoria (idade e

sexo) e por raça quando houver mais de uma. A ordem na qual os animais devem ser tosquiados depende das circunstâncias de cada propriedade, mas é aconselhável iniciar pelos capões, seguidos das borregas e os cordeiros desmamados. As ovelhas com cordeiro ao pé geralmente são tosquiadas ao final, evitando de ficarem separados por mais de um dia. Quando o número de ovelhas no rebanho for muito grande, recomenda-se encerrar diariamente grupos delas com seus respectivos cordeiros, tosquiando-se primeiro as ovelhas e terminando-se o dia com os cordeiros. Os carneiros, rufiões e ovelhas de consumo podem ser tosquiados em horários de maneira a preencher uma jornada de trabalho, em continuação ao término de uma categoria animal, caso contrário, podem ser tosquiados ao final da programação.

Os animais devem ser encerrados pelo menos com 12 horas de antecedência a fim de evitar o excesso de fezes e urina no momento da tosquia.

CUIDADOS NA TOSQUIA

A indústria têxtil estabelece determinados requerimentos técnicos e, em definitivo, o preço da lã. Além das características de finura, comprimento, cor e resistência da mecha, a valorização da lã está ligada à apresentação do produto, sendo a preparação do velo um aspecto importante para a obtenção de melhores preços na comercialização. Do ponto de vista comercial e têxtil é prejudicial incluir no velo categorias de lã inferior como a de barriga, pata, pontas queimadas, quarto grosso, etc. A limpeza ou "descole" das ovelhas antes da tosquia contribue para melhorar a apresentação do velo. Os "recortes" ou "segundo cortes" efetuados na tosquia do animal diminue a qualidade comercial do produto.

As cooperativas de lãs recomendam os seguintes cuidados para evitar a depreciação dos velos:

a) antes da tosquia do animal:
   - não esquilar lãs úmidas; deixar um lote de animais em área coberta durante a noite anterior a tosquia;
   - recortar "pontas queimadas" e "cascarrias"; as mechas "coloridas" provenientes de pontas queimadas pela urina, não saem ao lavado e originam problemas no tingimento.

b) durante a tosquia do animal:
   - esquilar sobre grade de madeira, mantendo a cancha sempre limpa;
   - evitar os recortes; estes são eliminados no lavado e penteagem da lã,

contituindo-se num subproduto de pouco valor. O recorte poderia ficar no animal evitando não só uma perda ao produtor, como também o tempo do esquilador;

c) após tosquia do animal:

- não misturar no velo outras categorias de lã como pata, barriga e pontas queimadas. Antes de atar os velos, retirar mechas de lã preta, manchadas e pontas queimadas;
- atar o velo colocando a lã da região do centro do velo (costelas) para o lado de fora; isto facilita a classificação da finura média do velo;
- atar os velos somente com fios de papel ou com a mesma lã; o fio de sisal solta fibras que prejudicam o tingimento da lã;
- embolsar a lã por categoria e imediatamente após a tosquia do animal; embolsar separadamente a lã das ovelhas de cria, borregas, capões, carneiros. O embolse imediato facilita a classificação, evita o sujar a lã e o desatar dos velos;
- evitar o excesso de velos numa mesma bolsa; produz rasgos nos velos;
- conservar as bolsas em piso seco, preferencialmente sobre estrados de madeira e ao abrigo do tempo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A tosquia é uma das práticas que provoca maior "stress" nos ovinos pela movimentação, imobilização, isolamento e remoção da lã. Esta, funciona como isolante térmico protegendo ao animal tanto do frio como do calor e, ao ser removida, deixa o mesmo exposto às condições climáticas do ambiente que podem ser fatais. Para compensar a perda da cobertura de lã, a pele engrossa atingindo o máximo duas semanas após a tosquia. Nesse período, as ovelhas vão aumentando o consumo alimentar para compensar a maior necessidade de energia. Resultados de pesquisa têm mostrado um aumento no consumo alimentar pós-tosquia entre 5-30% por um período aproximadamente de 2 meses, embora em climas frios observa-se uma depressão inicial nas primeiras 48 horas.

O período crítico pós-tosquia dos animais é de aproximadamente 15 dias e um bom manejo pode evitar possíveis riscos. Recomenda-se esquilar os ovinos quando estes estão ganhando peso, não esquilar cordeiros muito pequenos e terminar a tosquia das ovelhas de cria em tempo hábil para facilitar o reencontro com os cordeiros antes do anoitecer.

A depreciação que tem as lãs no mercado deve-se principalmente ao ex

cesso de recortes e a presença de mechas "coloridas". Um bom controle do trabalho na mesa do "atador" e um adequado condicionamento do velo contribuem para a valorização do produto. A tosquia se faz uma vez ao ano e, pelo que ela representa, deve receber uma programação e execução adequada por parte do produtor.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS DIFERENTES ÉPOCAS DE TOSQUIA DOS OVINOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Época de Tosquia	Vantagens	Desvantagens
Antes do acasalamento (Tosquia de outono)	Menor incidência de velos com capacho; Fatores climáticos mais favoráveis após a tosquia; Tosquia de cordeiros e borregas com mais lã; Ovelhas com menos lã durante a parição; Época mais favorável do banho após tosquia.	Maior incidência de velos amarelados; Maior incidência de bicheiras antes da tosquia; Comercialização da lã tardia.
Antes da parição (Tosquia de inverno)	Melhora a qualidade de velos; Ovelhas parem com maior facilidade e amamentam melhor os cordeiros; Tosquia de ovelhas sem cordeiro ao pé; Menor risco de cortes de tetos; Fácil identificação de ovelhas falhadas para separação.	Mortalidade de ovelhas pelas condições climáticas adversas no inverno; As chuvas de inverno poderão estender o período de tosquia; Impossibilidade de banho após tosquia.
Antes ou durante o desmame (Tosquia primavera/verão)	Menor incidência de velos com amarelo; Reduz a incidência de bicheiras no verão; Pode ser conjugada com desmame dos cordeiros; Maior disponibilidade de mão-de-obra; Possibilidade de banho imediato; Coincidência com a época de maior comercialização da lã.	Maior incidência de velos acapachados; Maior incidência de ovelhas deitadas durante a parição; Abandono de cordeiros no caso de tosquia antes do desmame; Excesso de cortes na tosquia favorece incidência de bicheiras.