

## § 2.3 泊松过程(一)


### 一、计数过程与泊松过程

在天文，地理，物理，生物，通信，医学，计算机网络，密码学等许多领域，都有关于随机事件流的计数问题，如：

电话交换机上的呼唤流；

计算机网络上的（图象，声音）流；

编码（密码）中的误码流；



交通中事故流;

均构成以时间顺序出现的事件流  $A_1, A_2, \dots$

**定义2.3.1** 随机过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 称为**计数过程(Counting Process)**,如果 $N(t)$ 表示在 $[0, t]$ 内事件A 出现的总次数.


计数过程应满足:

(1)  $N(t) \geq 0;$

(2)  $N(t)$  取非负整数值;

(3) 如果  $s < t$ , 则  $N(s) \leq N(t)$ ;

(4) 对于  $s < t$ ,  $N(t) - N(s)$  表示时间间隔  $(s, t]$  内事件出现的次数.



**引例** 在数字通信中误码率  $\lambda$  是重要指标, 设  $\{N(t), t \geq 0\}$  为时间段  $[0, t]$  内发生的误码次数,  $\{N(t), t \geq 0\}$  是计数过程, 而且满足


(1) 初始时刻不出现误码是必然的, 故  $N(0)=0$ ;

(2) 在互不相交的区间

$$[0, t_1], (t_1, t_2], \dots, (t_{n-1}, t_n], \quad 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$$

出现的误码数互不影响, 故  $N(t)$  独立增量过程.

在系统稳定运行的条件下, 在相同长度区间内出现  $k$  个误码概率应相同, 故可认为  $N(t)$  是平稳增量过程.



$\{N(t), t \geq 0\}$  是平稳独立增量过程;

(3) 认为  $\Delta t$  时间内出现一个误码的可能性与区间长度成正比是合理的, 即有

$$P\{N(\Delta t)=1\}=\lambda\Delta t + o(\Delta t), \lambda>0;$$

(4) 假定对足够小的  $\Delta t$  时间内, 出现两个以上误码的概率是关于  $\Delta t$  的高阶无穷小也是合理的, 有

$$P\{N(\Delta t)\geq 2\}=o(\Delta t).$$

## 一般数学模型：

此过程有如下特点：

- 1) 零初值性  $N(0)=0$ ;
- 2) 独立增量性 任意两个不相重叠的时间间隔内到达的呼叫次数相互独立;

3) **齐次性** 在 $(s, t]$ 时间内到达的呼叫次数仅与时间间隔长度 $t - s$ 有关, 而与起始时间 $s$ 无关;

4) **普通性** 在充分小的时间间隔内到达的呼叫次数最多仅有一次, 即对充分小的 $\Delta t$ , 有

$$P\{N(\Delta t) = 0\} = p_0(\Delta t) = 1 - \lambda\Delta t + o(\Delta t),$$

$$P\{N(\Delta t) = 1\} = p_1(\Delta t) = \lambda\Delta t + o(\Delta t),$$

$$P\{N(\Delta t) \geq 2\} = \sum_{k=2}^{\infty} p_k(\Delta t) = o(\Delta t),$$

其中 $\lambda > 0$ .

**定义2.3.2** 设计数过程 $\{N(t), t \geq 0\}$  满足:

- (1)  $N(0)=0$ ;
- (2) 是平稳独立增量过程;
- (3)  $P\{N(h)=1\}=\lambda h+o(h), \lambda>0$ ;
- (4)  $P\{N(h)\geq 2\}=o(h)$ .

称 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数(或速率, 强度)为 $\lambda$ 的  
齐次泊松过程.



**定理2.3.1** 齐次泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 在时间间隔 $(t_0, t_0+t]$ 内事件出现 $n$  次的概率为

$$P\{[N(t_0 + t) - N(t_0)] = n\} = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}, (n = 0, 1, 2, \dots)$$

证 记  $P_n(t) = P\{N(t) = n\} = P\{[N(t) - N(0)] = n\}$   

$$= P\{N(t_0 + t) - N(t_0) = n\} \quad (1)$$

平稳  
增量

1° 由条件(2)~(4), 得:

$$\begin{aligned} P_0(t+h) &= P\{N(t+h)=0\} = P\{N(t)=0, N(t+h) - N(t)=0\} \\ &= P\{N(t)=0\} P\{N(t+h) - N(t)=0\} \\ &= P_0(t)[1 - \lambda h + o(h)] \end{aligned}$$

增量  
独立

$$\Rightarrow \frac{P_0(t+h) - P_0(t)}{h} = -\lambda P_0(t) + \frac{o(h)}{h}$$

令  $h \rightarrow 0$ , 得


$$\begin{cases} \frac{dP_0(t)}{dt} = -P_0(t)\lambda \\ P_0(0) = 1, \quad (\text{条件(1) } N(0) = 0) \end{cases}$$

解得  $p_0(t) = e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$

2° 当  $n \geq 1$ , 根据全概率公式有

$$p_n(t+h) = p_n(t)p_0(h) + p_{n-1}(t)p_1(h)$$





$$p_n(t+h) = (1-\lambda h)p_n(t) + \lambda h p_{n-1}(t) + o(h)$$


$$\Rightarrow \frac{P_n(t+h) - P_n(t)}{h} = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t) + \frac{o(h)}{h}$$

令  $h \rightarrow 0$ , 得 
$$\frac{dP_n(t)}{dt} = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t)$$

两边同乘以  $e^{\lambda t}$  后移项整理得

$$\frac{d[e^{\lambda t} P_n(t)]}{dt} = \lambda e^{\lambda t} p_{n-1}(t) \quad (2)$$

当  $n=1$ , 则



$$\begin{cases} \frac{d[e^{\lambda t} P_1(t)]}{dt} = \lambda e^{\lambda t} P_0(t) = \lambda e^{\lambda t} e^{-\lambda t} = \lambda \\ P_1(0) = 0 \end{cases}$$

解得  $p_1(t) = \lambda t e^{-\lambda t}$

假设  $P_{n-1}(t) = \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!} e^{-\lambda t}$  成立

代入(2)式有

$$\frac{d[e^{\lambda t} P_n(t)]}{dt} = \lambda e^{\lambda t} p_{n-1}(t) = \frac{\lambda (\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$\Rightarrow e^{\lambda t} P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} + C$$

利用初始条件  $P_n(0) = 0$ , 可证得

$$P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t}$$

对一切  $n \geq 0$  均成立.

定理证明反之亦然, 得泊松过程的等价定义:

**定义2.3.2** '设计数过程  $\{N(t), t \geq 0\}$  满足下述条件:

(1)  $N(0) = 0$ ;

(2)  $N(t)$ 是独立增量过程;

(3) 对一切  $0 \leq s < t$ ,  $N(t) - N(s) \sim P(\lambda(t-s))$ , 即

$$P\{[N(t) - N(s)] = k\} = \frac{[\lambda(t-s)]^k}{k!} e^{-\lambda(t-s)},$$

$$(k = 0, 1, 2, \dots)$$

**注**

有  $P\{N(t) = k\} = P\{[N(t) - N(0)] = k\}$

$$= \frac{[\lambda t]^k}{k!} e^{-\lambda t},$$

**问题** 若  $N(t)$  的一维分布是泊松分布, 能否推出第(3)条成立? ( $k = 0, 1, 2, \dots$ )

**EX.2** 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda$ 的泊松过程, 事件A在 $(0, \tau)$ 时间区间内出现 $n$ 次, 试求:

$$P\{N(s)=k \mid N(\tau)=n\}, \quad 0 < k < n, \quad 0 < s < \tau$$

解 原式 = 
$$\frac{P\{N(s)=k, N(\tau)=n\}}{P\{N(\tau)=n\}}$$

$$= P\{N(s)=k, N(\tau)-N(s)=n-k\} \cdot n! e^{\lambda \tau} (\lambda \tau)^{-n}$$

$$= e^{-\lambda s} \frac{(\lambda s)^k}{k!} e^{-\lambda(\tau-s)} \frac{[\lambda(\tau-s)]^{n-k}}{(n-k)!} n! e^{\lambda \tau} (\lambda \tau)^{-n}$$



$$\begin{aligned} &= \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{s}{\tau}\right)^k \left(1 - \frac{s}{\tau}\right)^{n-k} \\ &= C_n^k \left(\frac{s}{\tau}\right)^k \left(1 - \frac{s}{\tau}\right)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

## 二、齐次泊松过程的有关结论

### 1. 数字特征

因对  $\forall t > 0$ ,  $N(t) \sim P(\lambda t)$ .

均值函数  $m(t) = E\{N(t)\} = \lambda t$

方差函数  $D(t) = \lambda t$

有  $\lambda = \frac{E\{N(t)\}}{t}$  称 $\lambda$ 为事件的到达率

$\lambda$ 是单位时间内事件出现的平均次数.

均方差函数  $C(s,t)=\lambda\min(s,t),$

相关函数  $R(s,t)=\lambda\min(s,t)+\lambda^2st.$

**EX.3** 设 $N_1(t)$ 和 $N_2(t)$ 分别是强度为 $\lambda_1$ 和 $\lambda_2$ 的相互独立的泊松过程,

1) 令 $Y(t)=N_1(t) - N_2(t)$ ,  $t>0$ ,求 $Y(t)$ 的均值函数和相关函数.

2) 证明  $X(t)=N_1(t) + N_2(t)$ ,  $t > 0$ , 是强度为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松过程.

解 1)  $m_Y(t) = E[N_1(t)] - E[N_2(t)] = (\lambda_1 - \lambda_2)t,$

$$\begin{aligned}R_Y(s, t) &= E\{[N_1(s) - N_2(s)][N_1(t) - N_2(t)]\} \\&= E[N_1(s)N_1(t)] + E[N_2(s)N_2(t)] \\&\quad - E[N_1(s)N_2(t)] - E[N_2(s)N_1(t)] \\&= R_{N_1}(s, t) + R_{N_2}(s, t) - E[N_1(s)]E[N_2(t)] \\&\quad - E[N_2(s)]E[N_1(t)] \\&= \lambda_1 \min(s, t) + \lambda_1^2 st + \lambda_2 \min(s, t) + \lambda_2^2 st - 2\lambda_1 \lambda_2 st \\&= (\lambda_1 + \lambda_2) \min(s, t) + (\lambda_1^2 + \lambda_2^2) st - 2\lambda_1 \lambda_2 st.\end{aligned}$$

2) 根据泊松分布的可加性知

$$X(t) = N_1(t) + N_2(t), \quad t > 0,$$

服从参数为 $(\lambda_1 + \lambda_2)t$ 的泊松分布.

注:  $X(t) = N_1(t) - N_2(t)$  的特征函数为

独立和的  
特征函数

$$\varphi_X(u) = \exp\{\lambda_1 t e^{ju} + \lambda_2 t e^{-ju}\} - (\lambda_1 + \lambda_2)t\}$$

由分布函数与特征函数的一一对应的惟一性定理知 $X(t)$ 不是泊松过程.

**EX.4** 设一位交通警察需处理的交通事故次数 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是泊松过程, 且每个工作日需处理 $\lambda$ 件事故. 试求:

- (1) 他在某个周末两天需处理3件事故的概率 $p$ ;
- (2) 第3次事故在星期日内发生的概率 $q$ .


**解** 不妨记周六为  $t_1 = 6 = t_0 + 1$

周日为  $t_2 = 7 = t_0 + 2$

$$\begin{aligned} p &= P\{N(t_2) - N(t_0) = 3\} = P\{N(2) - N(0) = 3\} \\ &= P\{N(2) = 3\} = \frac{(2\lambda)^3}{3!} e^{-2\lambda} = \frac{8\lambda^3}{6} e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q &= P\{N(t_2) - N(t_1) = 3, N(t_1) - N(t_0) = 0\} \\ &\quad + P\{N(t_2) - N(t_1) = 2, N(t_1) - N(t_0) = 1\} \\ &\quad + P\{N(t_2) - N(t_1) = 1, N(t_1) - N(t_0) = 2\} \\ &= P\{N(1) = 3\}P\{N(1) = 0\} \\ &\quad + P\{N(1) = 2\}P\{N(1) = 1\} \\ &\quad + P\{N(1) = 1\}P\{N(1) = 2\}] \\ &= \frac{\lambda^3}{6} e^{-\lambda} \cdot e^{-\lambda} + 2 \cdot \frac{\lambda^2}{2} e^{-\lambda} \cdot \lambda e^{-\lambda} \\ &= \frac{7\lambda^3}{6} e^{-2\lambda} \end{aligned}$$

## 2. 时间间隔与等待时间的分布



$W_n$ 为事件A第 $n$ 次出现的等待时间(到达时间).




用 $T_n$ 表示事件A第 $n-1$ 次出现与第 $n$ 次出现的时间间隔.

有  $W_n = \sum_{i=1}^n T_i$  和  $T_i = W_i - W_{i-1}$

**定理2.3.2** 设 $\{T_n, n \geq 1\}$ 是参数为 $\lambda$ 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 的时间间隔序列, 则 $\{T_n, n \geq 1\}$ 相互独立同服从指数分布, 且 $E\{T\} = 1/\lambda$ .

证 (1) 因  $\{T_1 > t\} = \{(0, t) \text{ 内事件A不出现}\}$

  $P\{T_1 > t\} = P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$

$$\longrightarrow F_{T_1}(t) = 1 - P\{T > t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0$$

即 $T_1$ 服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布.


(2) 由泊松过程的平稳独立增量性, 有

$$P\{T_2 > t / T_1 = s\} = P\{\text{在}(s, t+s)\text{内事件}A\text{不出现} \mid T_1 = s\}$$

$$= P\{N(t+s) - N(s) = 0\}$$

$$= P\{N(t) - N(0) = 0\}$$

$$= P\{N(t) = 0\} = e^{-\lambda t}$$



与 $s$  无关

故 $T_2$ 与 $T_1$ 相互独立, 且 $T_2$ 也服从均值为 $1/\lambda$ 的指数分布.


(3) 对于一般  $n > 1$  和  $t > 0$  以及  $r_1, r_2, \dots, r_{n-1} > 0$ , 有

$$P\{T_n > t \mid T_i = r_i, 1 \leq i \leq n-1\}$$

$$= P\{N(t + r_1 + \dots + r_{n-1}) - N(r_1 + r_2 + \dots + r_{n-1}) = 0\}$$

$$= P\{N(t) - N(0) = 0\} = e^{-\lambda t}.$$

即 
$$F_n(t) = P\{T_n \leq t\} = 1 - e^{-\lambda t}, \quad t \geq 0.$$



**定理2.3.3** 参数为 $\lambda$ 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ , 事件A第 $n$ 次出现的等待时间服从 $\Gamma$ 分布, 其概率密度为:

$$f_{W_n}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, & t \geq 0; \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

注: 在排队论中称 $W_n$ 服从**爱尔朗分布**.

证 因 $W_n$ 是事件A第 $n$ 次出现的**等待时间**, 故

$$\{W_n \leq t\} = \{N(t) \geq n\} = \{(0, t) \text{ 内 } A \text{ 至少出现 } n \text{ 次}\}$$

$$F_{w_n}(t) = P\{W_n \leq t\} = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, t \geq 0$$

$$f_{w_n}(t) = F'_{W_n}(t) = \left[ \sum_{k=n}^{\infty} \frac{\lambda (\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} - \sum_{k=n}^{\infty} \lambda \frac{(\lambda t)^k}{k!} \right] e^{-\lambda t},$$

$$= \lambda e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^{n-1}}{(n-1)!}, \quad t \geq 0.$$

### 3. 到达时间的条件分布

**EX2.3.7** 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\lambda$ 的泊松过程, 已知事件A在 $[0, t]$ 内出现一次, 试确定事件A到达时间的分布.

**解** 对任意 $0 < s \leq t$ , 有

$$\begin{aligned} P\{W_1 \leq s | N(t) = 1\} &= \frac{P\{W_1 \leq s, N(t) = 1\}}{P\{N(t) = 1\}} \\ &= \frac{P\{N(s) = 1, N(t) - N(s) = 0\}}{P\{N(t) = 1\}} \\ &= \frac{\lambda s e^{-\lambda s} \cdot e^{-\lambda(t-s)}}{\lambda t e^{-\lambda t}} = \frac{s}{t} \end{aligned}$$

得条件分布函数  $F_{W_1|N(t)}(s|1) = \begin{cases} 0, & s < 0; \\ \frac{s}{t}, & 0 \leq s < t; \\ 1, & s \geq t. \end{cases}$

条件概率密度  $f_{W_1|N(t)}(s|1) = \begin{cases} \frac{1}{t}, & 0 \leq s < t; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

事件A在 $[0, t]$ 内出现一次的前提下, 其等待时间 $W_1$ 在 $[0, t]$ 上服从均匀分布.

定义：设  $(X_1, X_2, \cdots; X_n)$  是来自总体  $X$  一样本

(1)  $X_i$  与总体同分布；

(2)  $X_1, X_2, \cdots; X_n$  相互独立.

称  $(X_1, X_2, \cdots; X_n)$  为简单随机样本，简称样本.



**引理2.3.1** 设总体 $X$ 有概率密度 $f(x)$ ,  $X_{(1)}, X_{(2)}, \dots, X_{(n)}$ 是 $X$ 的简单随机样本生成的顺序统计量(order statistics), 其概率密度为

$$p(x_1, x_2, \dots, x_n) = n! f(x_1) f(x_2) \cdots f(x_n)$$

当 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ .

**定理2.3.4** 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是Poisson过程, 已知在 $[0, t]$ 时间内 $A$ 出现 $n$ 次, 这 $n$ 次到达时间 $W_1, W_2, \dots, W_n$ 的联合**条件分布密度**为

$$f(t_1, t_2, \dots, t_n | N(t) = n) = \begin{cases} \frac{n!}{t^n}, & 0 < t_1 < \dots < t_n \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

**注 1**  $W_1, W_2, \dots, W_n$  与  $n$  个相互独立同服从  $[0, t]$  上均匀分布随机变量  $U_1, U_2, \dots, U_n$  的顺序统计量  $U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(n)}$  有相同分布, 而且.

$$W_1 < W_2 < \dots < W_n$$

$W_1, W_2, \dots, W_n$  可视为由相互独立在  $(0, t)$  上均匀分布随机变量  $U_1, U_2, \dots, U_n$  所得的顺序统计量.

注 2

$$\sum_{k=1}^n U_{(k)} = \sum_{k=1}^n U_k$$

**Ex.2.3.9** 设到达电影院的观众组成强度为  $\lambda$  的 Poisson流, 如果电影从  $t$  时刻开演, 计算  $(0, t]$  内到达电影院的观众等待时间总和的数学期望.

**解** 设  $W_k$  是第  $k$  名观众到达时刻, 在  $(0, t)$  内到达的观众数为  $N(t)$ , 则总等待时间为

$$\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k)$$

根据全数学期望公式

$$E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k)\right] = E\left\{E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t)\right]\right\}$$

对  $\forall n \geq 1$ ,

$$E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t) = n\right] = nt - E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} W_k \middle| N(t) = n\right]$$

由定理2.3.3 知  $W_1, W_2, \dots, W_n$  与  $[0, t]$  上均匀分布相互独立随机变量的顺序统计量  $U_{(1)}, U_{(2)}, \dots, U_{(n)}$  有相同的分布函数.

随机变量函数的条件期望公式

$$E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} W_k \mid N(t) = n\right]$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \cdots \int_{-\infty}^{+\infty} \sum_{k=1}^n t_k f(t_1, t_2, \cdots, t_n \mid N(t) = n) dt_1 dt_2 \cdots dt_n$$

$$= E\left(\sum_{k=1}^n U_{(k)}\right) = E\left(\sum_{k=1}^n U_k\right) = \sum_{k=1}^n E(U_k) = \frac{nt}{2}$$

$$\Rightarrow E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \mid N(t) = n\right] = nt - \frac{nt}{2} = \frac{nt}{2}$$

$$\Rightarrow E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t)\right] = \frac{t}{2} N(t)$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k)\right] &= E\left\{E\left[\sum_{k=1}^{N(t)} (t - W_k) \middle| N(t)\right]\right\} \\ &= E\left[\frac{t}{2} N(t)\right] = \frac{\lambda t^2}{2}.\end{aligned}$$