


Здесь должно быть название организации

# XVI ЛЕТНЯЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ШКОЛА

17 ИЮЛЯ – 6 АВГУСТА 2010



Санкт-Петербург  
2010

# 1. Общие сведения.

Летняя Физическая Школа в 2010 году проходила в шестнадцатый раз. Школа началась 17 июля, а закончилась 6 августа. Продолжительность Школы составила три недели.

В работе ЛФШ участвовали 67 школьников. Преподавательская и воспитательская деятельность осуществлялась силами 18 человек.

## 1.1. Участники Летней Физической Школы.

В ЛФШ принимаются школьники, перешедшие в 8, 9, 10 или 11 класс. Приём осуществляется либо по результатам городской или региональной олимпиады по физике, либо по результатам собеседования с руководителями смены.

### **8 класс (школьники, закончившие в 2010 году 6 или 7 класс)**

- 1) Иванов Владислав, 7 класс, гимназия 177, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике
- 2) Гуцол Ксения, 7 класс, школа 175, обладательница диплома III степени городской олимпиады по физике
- 3) Муретова Мария, 7 класс, ФМЛ 239, обладательница похвального отзыва городской олимпиады по физике
- 4) Портянкин Егор, 7 класс
- 5) Порчук Павел, 7 класс, школа 636
- 6) Коско Софья, 7 класс, ФМЛ 239
- 7) Ходунов Павел, 6 класс, ФМЛ 239, обладатель диплома I степени городской олимпиады по математике
- 8) Ковзель Николай, 6 класс, школа «Унисон»
- 9) Йона Андрей, 6 класс

### **9 класс (школьники, закончившие в 2010 году 8 класс)**

- 1) Егоров Антон, лицей «ФТШ», обладатель диплома I степени городской олимпиады по физике, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике за 9 класс, учащийся ГЦФО
- 2) Базакий Вячеслав, лицей «ФТШ», обладатель диплома I степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 3) Крачун Дмитрий, ФМЛ 239, обладатель диплома I степени городской олимпиады по физике
- 4) Погодаев Илья, гимназия 610, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике
- 5) Гуревич Александр, лицей «ФТШ», обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 6) Минкин Алексей, лицей «ФТШ», обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО

- 7) Серов Юрий, лицей «ФТШ», обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 8) Грудкин Антон, ФМЛ 239, обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике
- 9) Цейтлин Леонид, ФМЛ 30, обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике
- 10) Горбунова Елизавета, лицей «ФТШ», обладательница похвального отзыва городской олимпиады по физике, учащаяся ГЦФО
- 11) Недошивин Михаил, ФМЛ 239, обладатель похвального отзыва городской олимпиады по физике
- 12) Капралов Николай, лицей «ФТШ», учащийся ГЦФО
- 13) Корешкова Ксения, гимназия 114, учащаяся ГЦФО
- 14) Ковалёв Григорий, ФМЛ 239
- 15) Пильщикова Екатерина, лицей «ФТШ»

**10 класс (школьники, закончившие в 2010 году 9 класс)**

- 1) Шалымов Роман, ФМЛ 239, участник Всероссийской олимпиады, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике
- 2) Терехов Антон, ФМЛ 239, обладатель диплома I степени городской олимпиады по физике
- 3) Маслов Артем, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике, участник региональной олимпиады, учащийся ГЦФО
- 4) Лежнин Михаил, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 5) Любаров Марк, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 6) Никитин Денис, ФМЛ 239, обладатель диплома III степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике
- 7) Чурилова Мария, лицей «ФТШ», обладательница диплома III степени городской олимпиады, участница региональной олимпиады по физике
- 8) Матюшин Георгий, лицей «ФТШ», обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 9) Большаков Николай, ФМЛ 239, участник региональной олимпиады по физике
- 10) Афанасьева Анна, школа 245
- 11) Балашов Александр, ФМЛ 30
- 12) Борздун Наталья, ФМЛ 239
- 13) Егоров Сергей, Аничков лицей

- 14) Едовина Алина, ФМЛ 239
- 15) Езус Альбина, ФМЛ 239
- 16) Жаровов Дмитрий, ФМЛ 239
- 17) Косицын Александр, ФМЛ 239
- 18) Михайлов Кирилл, ФМЛ 239
- 19) Свирина Анна, ФМЛ 239
- 20) Смирнов Иван, гимназия 116
- 21) Толстомятов Всеволод, школа 216
- 22) Трофимов Павел, лицей «ФТШ»

**11 класс (школьники, закончившие в 2010 году 10 класс)**

- 1) Свиткин Максим, лицей «ФТШ», участник Всероссийской олимпиады, обладатель диплома I степени городской олимпиады по физике
- 2) Богданов Святослав, ФМЛ 239, участник Всероссийской олимпиады, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 3) Фоминых Сергей, лицей «ФТШ», участник Всероссийской олимпиады, обладатель диплома II степени городской олимпиады по физике
- 4) Михайлов Иван, ФМЛ 30, обладатель диплома I степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике
- 5) Максимова Дина, лицей «ФТШ», обладательница диплома II степени городской олимпиады, участница региональной олимпиады по физике, учащаяся ГЦФО
- 6) Ходунов Игорь, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 7) Лежнев Константин, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 8) Авдеев Иван, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 9) Геллер Марк, лицей «ФТШ», обладатель диплома II степени городской олимпиады, участник региональной олимпиады по физике, учащийся ГЦФО
- 10) Петухов Федор, лицей «ФТШ», обладатель диплома III степени городской олимпиады по физике
- 11) Киракосян Давид, лицей «ФТШ», участник региональной олимпиады по физике
- 12) Осолодков Михаил, ФМЛ 30, участник региональной олимпиады по физике
- 13) Дмитриев Павел, лицей «ФТШ»
- 14) Забиякин Иван, ФМЛ 239

- 15) Ким Дмитрий, ФМЛ 239
- 16) Киракосян Георгий, лицей «ФТШ»
- 17) Лиознов Антон, лицей «ФТШ», учащийся ГЦФО
- 18) Милевич Дмитрий, ФМЛ 239
- 19) Филиппов Василий, ФМЛ 239, учащийся ГЦФО
- 20) Жуков Андрей, ФМЛ 30
- 21) Вязьмитинов Никита, лицей «ФТШ»

## 1.2. Преподаватели Летней Физической Школы.

В 1995 году была создана система физического образования в Санкт-Петербурге, включающая в себя кружки по физике, Летнюю и Весеннюю физические школы, сборы по подготовке команды СПб к Всероссийской олимпиаде по физике. Участники кружков, далее победители олимпиад становились преподавателями, наставниками новых победителей и успешными учёными. Таким образом, коллектив преподавателей традиционно состоит из людей, в разное время проходивших обучение в ЛФШ, и знакомых с традициями преподавания, принятыми в ЛФШ. Важно отметить не только преподавательскую, но и научную квалификацию исполнителей, что позволяет осуществлять преподавание на достаточно высоком содержательном уровне, и заинтересовывать школьников в физике как в интересной и перспективной профессии.

**В 8 классе работали:** Н.В. Тараканов (преподаватель Городского Центра Физического Образования), О.В. Шустова (студентка 5 курса ФТФ СПбГПУ), Ф. Затылкин (студент 1 курса ФМФ СПбГПУ), В. Иванов (студент 1 курса ФОПФ МФТИ).

**В 9 классе работали:** И.А. Барыгин (к.ф.-м.н., педагог дополнительного образования лицея ФТШ), А.В. Лиознова, С.М. Атамась (студенты 2 курса ФТФ СПбГПУ).

**В 10 классе работали:** С.С. Колеватов, А.Г. Кострыгин (студенты 4 курса ФФ СПбГУ), Д.С. Смирнов (студент 3 курса ФТФ СПбГПУ).

**В 11 классе работали:** И.Е. Шендерович (аспирант ПОМИ им. В.А. Стеклова РАН), Д.В. Батькович, Я.Ю. Коптелов (студенты 4 курса ФФ СПбГУ), П.И. Буслаев (студент 3 курса ФОПФ МФТИ).

Также в работе школы принимали участие А.В. Савельев (к.ф.-м.н., доцент УРАН СПб АУ НОЦНТ РАН), А.М. Минарский (учитель физики лицея ФТШ), Р.С. Колеватов (к.ф.-м.н., ассистент ФФ СПбГУ), С.Н. Тараканов (психолог).

Большинство преподавателей в прошлом является победителями олимпиад по физике, математике и астрономии различных уровней (городских, Всероссийских и Международных).

## 2. Образовательная часть.

Главное звено в образовательной цепочке ЛФШ — **ежедневные занятия**. Они проходят каждый день, кроме воскресенья и специальных дней, отведённых для командных физических соревнований (физбой и физхоккей). Занятия проходят отдельно для каждого класса (см. разделы [2.1](#), [2.2](#), [2.3](#), [2.4](#)).

В этом году занятия проводились с 9:45 до 13:45. Для удобства восприятия материала четыре часа занятий были поделены на две пары. Изначально было запланировано отводить по 105 минут на каждую пару, но из-за аномально высокой температуры в течение

всей смены было решено сократить пару до 90 минут, а освободившееся время отвести для купания на озере.

Каждая пара представляла собой теоретическую лекцию, либо решение задач повышенной сложности, либо выполнение экспериментальной работы с последующим написанием отчёта. Таким образом, за всю смену в каждой параллели было прочитано десять лекций, проведено десять занятий по решению задач, а также выполнено десять экспериментальных работ.

После окончания ежедневных занятий участникам ЛФШ предлагались на выбор различные **спецкурсы** (см. раздел 2.5). Продолжительность этих факультативных занятий каждый день составляла около двух часов.

В ЛФШ также имеются мероприятия, проходящие через всю смену. Во-первых, это **ежедневные задачи**. Каждое утро школьники получают по две задачи (обычно это задачи из городских олимпиад прошлых лет) для решения и сдачи преподавателям. Задачи могут сдаваться в течение всей смены. В качестве стимула для работы в каждом классе был организован «Экран задач» — таблица, в которой отмечались успехи каждого школьника. По итогам смены школьникам, решившим наибольшее количество задач, выдавался значок «Лучший теоретик».

Во-вторых, это так называемая **«Большая Задача»** (см. 2.7). По сути, это небольшое исследование на заданную тему, которое надо провести за время смены. Исследование должно включать в себя сбор и обработку экспериментальных данных, построение теории и написание отчёта о проделанной работе. Затем, в один из вечеров, проводится защита исследования — публичное выступление с результатами работы и дискуссия. Выполнение исследования по «Большой Задаче» проводится в команде из 4-5 школьников. Тем самым, происходит моделирование реальной научной работы. Члены команды, представившей лучшее исследование, получают значок «Лучший исследователь».

Кроме этого, в ЛФШ есть два тематических дня, которые проводятся в первое и второе воскресенье смены — это **«День Изобретателя»** (см. 2.8) и **«День Экспериментатора»** (см. 2.9). В «День Изобретателя» школьникам предлагается построить установку, которая обеспечивает заданный эффект или демонстрирует заданное явление. В «День Экспериментатора» команды школьников соревнуются друг с другом в решении сложных экспериментальных задач. За победу в этих конкурсах школьники награждаются значками «Лучший изобретатель» и «Лучший экспериментатор».

Помимо тематических дней, в ЛФШ два дня отводятся под **физические бои** (см. 2.6). Члены команды, победившей в физическом бое, получают значки «Физбоец». В 8-9 классах, помимо физбоя, проводился также **физический хоккей**.

Ниже приводятся материалы ежедневных занятий, разбитые по классам.

## 2.1. 8 класс.

### 2.1.1. Теория.

Преподаватель: Н.В. Тарakanов.

Курс для 7-8 классов был направлен на то, чтобы сформировать у учащихся представление о физике, как естественной науке. Показать единство теоретического и экспериментального подхода, логику построения научного знания. В рамках теоретического курса обсуждались вопросы описания механических явлений, а экспериментальная часть была призвана подкрепить теоретические рассуждения на предметно-чувственном уровне.

#### План занятий.

- 1) Введение. Принципы построения естественных наук. Предмет и объект физики. Постулат существования мира.

- 2) Пространство и его измерение. Начало отсчета. Определение положения тела в пространстве. Декартова система координат и полярные координаты.
- 3) Время и его измерение. Приборы для измерения времени. Астрономическое и декретное время.
- 4) Масса. Понятие массы. Измерение массы тел (гравитационная масса). Понятие материальной точки.
- 5) Характеристики механического движения. Траектория, путь, перемещение, скорость.
- 6) Относительность движения. Системы отсчета. Равномерное прямолинейное движение. Первый закон Ньютона.
- 7) Определение силы. Импульс тела. Второй закон Ньютона. Инерциальная масса.
- 8) Движение тела под действием силы. Ускорение. Равноускоренное движение. Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении.
- 9) Причины появления силы. Третий закон Ньютона. Парные силы в природе.
- 10) Трение. Виды трения и их особенности. Разные виды трения в природе и технике. Закон Кулона-Аматона.
- 11) Сила упругости. Деформация тел. Виды деформации. Закон Гука. Модуль Юнга.
- 12) Сила тяжести. Сила тяжести вблизи Земли. Ускорение свободного падения тел. Закон Всемирного тяготения. Понятие гравитационного поля. Графическое представление полей, силовые линии. Характеристики поля. Напряженность силы тяжести.
- 13) Движение планет. Представление о движении планет в разные исторические периоды (Птолемей, Коперник, Браге). Законы Кеплера.
- 14) Движение тела по окружности. Угловая скорость, период, частота. Равномерное движение по окружности. Центробежная сила, центробежное ускорение. Законы Кеплера, как следствия закона Всемирного тяготения.

### 2.1.2. Решение задач.

Преподаватель: О.В. Шустова.

### 2.1.3. Экспериментальные работы.

Преподаватели: В. Иванов, Ф. Затылкин.

Занятия экспериментом в 8 классе были направлены на знакомство с общей культурой выполнения экспериментальных работ. Школьникам была прочитана вводная лекция о правилах составления отчетов о проведенных экспериментальных работах, рассказано о погрешностях. По нашим наблюдениям, на уроках физики в школе погрешностям уделяется исключительно мало внимания. Тем не менее, для настоящего понимания экспериментальной работы необходимо уметь свободно пользоваться этим аппаратом.

Трудность проведения экспериментальных занятий в 8 классе связана ещё и с тем, что школьники недостаточно хорошо умеют пользоваться относительно сложным оборудованием. Поэтому одной из задач было показать школьникам, что даже с помощью тривиального оборудования (линейка, монетки, нитки) можно достаточно точно померить различные физические величины.

- 1) Измерение скорости муравья.  
*Оборудование:* линейка, секундомер, муравей.
- 2) Измерение массы капли воды.  
*Оборудование:* ведро, стакан, шприц, монетки.
- 3) Нахождение центра масс палочки.  
*Оборудование:* линейка, монетки, нитки, палочка.
- 4) Изучение зависимости силы растяжения резинки от её удлинения.  
*Оборудование:* резинка, монетки, линейка.
- 5) Изучение вращательного движения.  
*Оборудование:* камни, нитки.

## 2.2. 9 класс.

### 2.2.1. Теория.

Преподаватель: И.А. Барыгин.

Теоретический курс для 9 класса был целиком посвящен механике. По окончании 8 класса школьники имеют определенный объем знаний по этому разделу физики, и целью курса являлось свести их воедино, а также осветить вопросы, которым уделяется недостаточное внимание в школьной программе.

#### План занятий.

- 1) Скорость. Радиус-вектор. Мгновенная скорость как предел средней скорости. Операции с векторами: сложение, проецирование, скалярное произведение.
- 2) Ускорение. Равноускоренное движение. Скорость и перемещение при равноускоренном движении. Движение в однородном поле тяжести: время движения, максимальная высота подъема, дальность полета, уравнение траектории.
- 3) Движение по окружности. Период обращения и частота. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение. Радиус кривизны траектории. Угловое ускорение. Нормальное и тангенциальное ускорение при движении с постоянным угловым ускорением.
- 4) Силы. Виды сил. Законы Ньютона. Преобразование координат, скоростей и ускорений при переходе в другую систему отсчета.
- 5) Закон сохранения импульса. Его связь с третьим законом Ньютона. Движение тела с переменной массой.
- 6) Работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. Потенциальная энергия постоянной силы, силы упругости, силы всемирного тяготения.
- 7) Первый закон Кеплера. Первая и вторая космическая скорость. Гравитационный маневр.
- 8) Центр масс. Второй закон Ньютона для системы тел. Столкновения. Рассмотрение абсолютно упругого столкновения в системе отсчета центра масс.
- 9) Правило моментов. Неинерциальные системы отсчета. Сила инерции.





### 2.2.2. Решение задач.

Преподаватель: С.М. Атамась.

#### Листок 1.

1	Три микрофона, расположенные на одной прямой в точках А, В, С, зарегистрировали последовательно в моменты времени $t_a > t_b > t_c$ звук от взрыва, который произошёл в точке О, лежащей на отрезке АС. Найдите отрезок АО, если $AB = BC = L$ . В какой момент времени произошёл взрыв? Скорость звука $c$ .
2	По прямому шоссе идёт автобус с постоянной скоростью $V$ . Вы заметили автобус, когда тот находился в некоторой точке А. Из какой области около шоссе вы можете догнать автобус если скорость вашего бега $V/2$ ?
3	Сверхзвуковой самолёт летит горизонтально. Два микрофона, расположенные на одной вертикали на расстоянии $l$ друг от друга, зарегистрировали приход звука от самолёта с запаздыванием времени $\Delta t$ . Скорость звука в воздухе $c$ . Какова скорость самолёта?
4	По бильярдному столу со сторонами $a$ и $b$ пускают шар из середины стороны $b$ . Под каким углом к борту стола должен начать движение шар чтобы вернуться в ту же точку из которой он начал движение?


#### Листок 2.


5	Тело начинает движение из точки А и движется сначала равноускоренно в течении времени $t_0$ , а затем с тем же по модулю ускорением равнозамедленно. Через какое время от начала движения тело вернётся в точку А?	
6	Время отправления электрички по расписанию 12:00. На ваших часах 12:00, но мимо вас уже начинает проезжать последний вагон, который движется мимо вас в течении 10 с. Последний вагон проходит мимо вас за 8 с. Электричка отправилась вовремя, и движется равноускоренно. На какое время отстают ваши часы?	
7	Из миномёта ведут стрельбу по объектам, расположенным на склоне горы. На каком расстоянии от миномёта будут падать мины, если их начальная скорость $V$ , угол наклона горы $\alpha$ и угол стрельбы по отношению к горизонту $\beta$ ?	
8	Утка летит по горизонтальной прямой с постоянной скоростью $U$ . В неё бросил камень неопытный охотник, причём в момент броска скорость камня $V$ была направлена как раз на утку под углом $\alpha$ к горизонту. На какой высоте летела утка, если камень всё же попал в неё?	

#### Листок 3.

9	Край гладкого горизонтального стола скруглён по окружности радиуса $R$ . С какой наименьшей скоростью надо пустить тело, чтобы оно, достигнув скругления, сразу полетело по параболе?	
10	По деревянным сходам, образующим угол $\alpha$ с горизонтом, втаскивают за привязанную к нему верёвку ящик. Коэффициент трения ящика о сходи $k$ . Под каким углом к горизонту надо тянуть верёвку, чтобы с наименьшим усилием втащить ящик?	
11	Тело массы $m_1$ лежит на доске массы $m_2$ , находящейся на гладкой горизонтальной поверхности. Коэффициент трения между телом и доской $k$ . Какую силу надо приложить к доске, чтобы тело соскользнуло с неё. За какое время тело соскользнёт, если к доске приложена сила $F_0$ , а длина доски $l$ ?	
12	Между двумя одинаковыми гладкими брусками массами $m_1$ каждый вставлен клин массы $m_2$ с углом $\alpha$ . Определите ускорение тел.	

Листок 4.

13	К свободному концу нити, прикрепленной к стене и перекинутой через блок, подвешен груз. Блок закреплён на бруске массы $m_0$ , который может скользить по горизонтальной плоскости без трения. В начальный момент нить с грузом отклоняют от вертикального положения на угол $\alpha$ и затем отпускают. Определите ускорение бруска, если угол, образованный нитью с вертикалью, не меняется при движении системы. Чему равна масса груза.	
14	Где находится центр масс: однородного прута, согнутого посередине под прямым углом; однородной треугольной пластинки; гардеробного номерка в виде диска с круглым отверстием.	

15	Обезьяна массы $m$ удерживается на блоке А. Блок А удерживается грузом массы $2m$ на блоке В. Система неподвижна. Как будет двигаться груз, если обезьяна начнёт равномерно выбирать верёвку со скоростью $V$ относительно себя? Массой блоков и трением пренебречь.	
16	С какой силой давит на землю кобра, когда она, готовясь к прыжку, поднимается вертикально вверх с постоянной скоростью $V$ ? Масса змеи $m$ , её длина $l$ .	



Листок 5.

17	Автомобиль с работающим двигателем въезжает на обледенелую гору, поверхность которой образует угол $\alpha$ с горизонтом. Какой высоты гору может преодолеть автомобиль, если его начальная скорость при въезде на него равна $V$ , а коэффициент трения колёс о лёд $k$ ?
18	Каков радиус орбиты спутника, лежащей в экваториальной плоскости, если тот всё время находится в зените над одной и той же точкой земной поверхности?
19	Однородный куб с помощью верёвки, привязанной к середине его ребра, подвешен к вертикальной стене. При каких значениях угла между верёвкой и стеной куб соприкасается со стеной всей гранью, если коэффициент трения его о плоскость равен $k$ ?
20	Лестница опирается на вертикальную стену и пол. При каких значениях угла между лестницей и полом она может стоять если коэффициент трения лестницы о пол и о стену равен $k_1$ и $k_2$ соответственно?

Листок 6.

21	Необходимо с поверхности земли попасть камнем в цель, которая расположена на высоте $h$ и на расстоянии $S$ по горизонтали. При какой наименьшей скорости это возможно? Сопротивлением воздуха пренебречь.
22	Между целью и миномётом, находящимся на одной горизонтали, расположена стена высотой $h$ . Расстояние от стены до миномёта $a$ , от стены до цели $b$ . Определить минимальную начальную скорость мины, необходимую для поражения цели. Под каким углом при этом надо стрелять? Сопротивлением воздуха пренебречь.
23	Гладкий однородный стержень длины $2L$ опирается на край полусферической чаши радиуса $R$ . Какой угол с горизонтом образует стержень в положении равновесия?
24	Зенитное орудие может сообщить снаряду скорость $V$ в любом направлении. Требуется найти зону поражения, т. е. границу, отделяющую цели, до которых снаряд из данного орудия может долететь, от недостижимых целей. Сопротивлением воздуха пренебречь.
25	Автомобиль удаляется от стены со скоростью $V$ под углом $\alpha$ к ней. В момент, когда расстояние до стены равно $l$ , шофёр подаёт короткий звуковой сигнал. Какое расстояние пройдёт автомобиль до момента, когда шофёр услышит эхо? Скорость звука в воздухе $c$ .

Листок 7.

26	<p>Два одинаковых кубика с длиной ребра <math>b</math> массой <math>m</math> каждый стоят на горизонтальном столе, на расстоянии <math>b</math> друг от друга. Между ними помещён рычаг длиной <math>2^{3/2}b</math> с пренебрежимо малой массой. Коэффициент трения между поверхностями кубиков и столом <math>k</math>. Коэффициент трения между рычагом и кубиками очень большой в точке <math>A</math> и очень маленький в точке <math>C</math>. В точке <math>B</math> приложена сила <math>F</math>, направленная перпендикулярно рычагу как показано на рисунке. Определите, какой из кубиков сдвигается раньше, если постепенно увеличивать силу <math>F</math>.</p>	
27	<p>Однородный стержень длиной <math>l</math> опирается о пол и ступеньку. Коэффициент трения между стержнем и полом равен 1, трения между стержнем и ступенькой нет. При какой высоте ступеньки стержень может находиться в равновесии, если угол <math>\alpha = \pi/4</math>?</p>	
28	<p>В системе, изображённой на рисунке, трение в блоках и между другими поверхностями отсутствует. Если грузу массой <math>m</math> позволить двигаться, то за какое время он достигает подставки? Начальная скорость груза равна нулю, начальное расстояние от груза до подставки <math>h</math>, нить невесомая и нерастяжимая. Масса подставки <math>M</math>.</p>	
29	<p>Найдите ускорение грузов, если масса каждого груза равна <math>m</math>. Массами нитей и блоков пренебречь, нити нерастяжимы, трение отсутствует.</p>	

### 2.2.3. Экспериментальные работы.

Преподаватель: А.В. Лиознова.

- Измерить толщину масляной плёнки.  
Оборудование: шприц, масло, линейка.
- Найти неизвестное сопротивление.  
Оборудование: вольтметр, батарейка, сопротивление, провода.
- Измерить силу разрыва нити.  
Оборудование: нитки, кнопки, грузики.
- Найти показатель преломления жидкости.  
Оборудование: лазерная указка, линейка, бумага, пластиковые стаканчики.

- 5) Измерить отношение коэффициента трения покоя к коэффициенту трения скольжения дерева по дереву.  
*Оборудование:* деревянный брусок, палочка, линейка.
- 6) Измерение скорости муравья.  
*Оборудование:* линейка, секундомер, муравей.
- 7) Определить содержание соли в воде.  
*Оборудование:* прозрачная бутылка, пластилин, вода с солью, колпачок от ручки.
- 8) Определить плотность металла в пластилине.  
*Оборудование:* разновесы, пластилин с металлом, стакан с водой.
- 9) Исследование времени падения тел различной массы.  
*Оборудование:* грузики, секундомер.
- 10) Нахождение центра масс тела неправильной формы.  
*Оборудование:* линейка, нитки, неизвестное тело (вырезано из картона).

## 2.3. 10 класс.

### 2.3.1. Теория.

Преподаватель: С.С. Колеватов.

В 10 классе лекции были посвящены электростатике. Выбор такого предмета лекций неслучаен: многолетний опыт работы в жюри физических олимпиад показывает, что школьники зачастую относятся к электростатике как к набору простейших формул, не понимая физического смысла явлений. В школьном курсе физики, по нашим наблюдениям, электростатика была и остаётся одним из самых сложных разделов.

После окончания курса электростатики был прочитан мини-курс по гидродинамике. Поскольку математический аппарат был довольно схож с аппаратом электростатики, удалось разобрать довольно большое число физических явлений, не выводя заново математические факты, а пользуясь лишь электромеханическими аналогиями. Такой подход, кроме всего прочего, хорошо демонстрирует единство методов, применяемых в физике.

#### План занятий.

- 1) История. Закон Кулона. 2 вида зарядов. Принцип суперпозиции. Независимость парных взаимодействий, дискретность заряда. Закон сохранения заряда. Напряженность электрического поля. Электрическое поле точечного заряда, системы точечных зарядов. Линии векторного поля. Поток вектора электрического поля. Электростатическая теорема Гаусса и её доказательство.
- 2) Свойства линий электрического поля. Теорема Ирншоу и её доказательство. Задачи на применение теоремы Гаусса. Потенциальность кулоновских сил. Электростатические и гравитационные силы. Потенциальная энергия. Потенциал. Потенциал точечного заряда.
- 3) Производная. Частная производная. Градиент. Связь потенциала с напряженностью электрического поля. Краевая задача электростатики. Задача Дирихле. Задача Неймана. Краевая задача с границей в виде проводника. Проводники. Определение. Свойства проводников. Экранирование.

- 4) Метод изображений. Решение задач с помощью метода изображений. Заряд и заземленная плоскость, заземленных уголок, сфера. Электростатическая ёмкость уединенного проводника. Ёмкость шара.
  - 5) Ёмкость конденсатора. Плоский конденсатор. Соединение конденсаторов. Энергия взаимодействия зарядов. Энергия конденсатора. Электрический ток. Плотность тока. Закон Ома. Сопротивление. Соединение сопротивлений.
  - 6) Проводимость. Вывод зависимости сопротивления от проводимости и размеров тела. Закон Ома в дифференциальной форме. Правила Кирхгофа. Алгоритм и пример решения задач. Закон Джоуля-Ленца и его доказательство. Сверхпроводники. Высокотемпературная сверхпроводимость.
  - 7) Эффект Пельтье. Энергетические уровни. Эффект Томсона. Термопара. Градуировка термопары. Решение схем — метод контурных токов, метод эквивалентной э.д.с.
- 
- 8) Гидродинамика. Основные определения. Приближения, в которых будут выписываться уравнения. Линии тока, их свойства, связь с силовыми линиями. Уравнение неразрывности. Поток через малый куб. Запись уравнения аналогично теореме Гаусса. Уравнение Бернулли.
  - 9) Вязкость. Формула Пуазейля (распределение скоростей в круглой трубе с жидкостью, поток воды через трубу в единицу времени).
  - 10) Вязкость или турбулентность? Коэффициент сопротивления и число Рейнольдса. Поверхностное натяжение: поверхностный слой, его энергия. Оценка радиуса капли в момент отрыва.

### 2.3.2. Решение задач.

Преподаватель: Д.С. Смирнов.

Программа задач по теме «Электростатика» призвана дополнять курс теоретических лекций. Программа разработана таким образом, что сложность задач от занятия к занятию постепенно увеличивается. Это позволяет школьникам начать с простых и увлекательных задач, а затем повысить своё мастерство до уровня численного описания сложных физических экспериментов и расчёта некоторых электротехнических схем. Контрольная, проведённая по итогам темы «Электростатика», показала, что слушатели успешно усвоили материал занятий. На последних занятиях школьники познакомились с гидродинамикой.

Кроме того, на занятиях, прошедших после физбоёв, разбирались задачи, вызвавшие особое затруднение у школьников.

Ниже приводятся задачи, обсуждавшиеся на занятиях. Большинство из них взято из классического задачника повышенной сложности под редакцией О.Я. Савченко.

#### Листок 1.

1	Что будет происходить, если потереть стеклянную палочку о шёлк и затем подносить её к бумажному шарiku на шёлковой нити? А затем коснуться палочкой второго такого же шарика? А затем сблизить шарики?
2	Как будут меняться показания электроскопа, если трижды коснуться его наэлектризованной палочкой?


3	Что произойдёт, если соединить два электроскопа: один заряженный, а другой нет медной проволокой, держа её в руках? Держать её на подвесе из шелковых нитей? Если соединить те же электроскопы чёрной, белой или шелковой нитью?
4	Что будет, если нагреть конец заряженного электроскопа?
5	Что будет происходить в последовательном соединении лампочки, батарейки и стеклянной трубочки, если последнюю постепенно нагревать?
6	Что будет, если зарядить один электроскоп стеклянной палочкой, потёртой о шелк, другой сургучом, потёртым о шерсть, а затем соединить их проволокой?
7	Как будет вести себя заряженный груз, подвешенный на нити, если приближать к нему руку?

### Листок 2.

8	Чему равно электрическое поле на оси равномерно заряженной сферы, у которой удалили узкий поясok вблизи экватора?
9	Сила взаимодействия между двумя одинаковыми зарядами на расстоянии 1 м равна 1 Н. Определите эти заряды в СИ и СГС.
10	Предположим, что удалось бы разъединить 1 см <sup>3</sup> воды на элементарные разноимённые заряды, которые затем удалили бы друг от друга на расстояние 100 км. С какой силой притягивались бы эти заряды?
11	На концах горизонтальной трубы длины $l$ закреплены положительные заряды $q_1$ и $q_2$ . Найдите положение равновесия шарика с положительным зарядом $q$ , который помещён внутрь трубы. Устойчиво ли это положение равновесия? Будет ли положение равновесия отрицательно заряженного шарика устойчивым?
12	В атоме водорода электрон движется вокруг протона с угловой скоростью $10^{16}$ рад/с. Найдите радиус орбиты.
13	Чему равна напряжённость электрического поля в центре равномерно заряженного тонкого кольца радиуса $R$ ? Чему она равна на оси кольца на расстоянии $h$ от центра? Заряд кольца $Q$ .
14	Металлическое кольцо разорвалось кулоновскими силами, когда заряд кольца был равен $Q$ . Сделали точно такое же новое кольцо, но из материала, прочность которого в 10 раз больше. Какой заряд разорвёт новое кольцо?

### Листок 3.

15	Напряжённость однородного электрического поля равна $E$ . Чему равен поток напряжённости электрического поля через квадрат со стороной $l$ , плоскость которого расположена под углом $30^\circ$ к направлению поля?
16	Найдите отрицательные и положительные потоки однородного электрического поля напряжённости $E$ через замкнутую поверхность прямой трёхгранной призмы, высота которой $h$ . Передняя грань призмы, ширина которой равна $h$ , перпендикулярна $E$ , нижняя грань параллельна $E$ .
17	Используя теорему Гаусса, определите напряжённость электрического поля внутри и вне равномерно заряженной сферы, если полный заряд сферы $Q$ ; равномерно заряженной бесконечной нити, если заряд единицы длины равен $\rho$ ; вне и внутри равномерно заряженной бесконечной пластины толщиной $h$ , если объёмная плотность заряда в пластине равна $\rho$ .
18	Докажите теорему Ирншоу.

19	При пересечении двух шаров радиуса $R$ , центры которых находятся на расстоянии $l$ друг от друга, образуются два «полумесяца», равномерно заряженных разноимёнными электрическими зарядами. Объёмная плотность электрического заряда равна $\rho$ . Докажите, что электрическое поле в области пересечения шаров однородно. Найдите его напряжённость.	
20	В равномерно заряженной бесконечной пластине вырезали сферическую полость так, как показано на рисунке. Толщина пластины $h$ , объёмная плотность заряда $\rho$ . Чему равна напряжённость электрического поля в точке $A$ , в точке $B$ ?	
21	Две пересекающиеся под углом $\alpha$ бесконечные плоскости делят пространство на четыре области. Чему равна напряжённость электрического поля в этих областях, если поверхностная плотность заряда плоскостей $\pm\sigma$ ?	


#### Листок 4.

22	Потенциал заряженного проводника 300 В. Какой минимальной скоростью должен обладать электрон, чтобы улететь с поверхности проводника на бесконечно далёкое от него расстояние?
23	Заряд 0.1 Кл удалён от заряда 0.2 Кл на расстояние 20 м. Чему равен потенциал поля в середине отрезка, соединяющего заряды?
24	Заряды 100, 10, 1, -10, -1, -10 СГС находятся в вершинах правильного шестиугольника со стороной 2 см. Чему равен потенциал в центре шестиугольника в СИ и СГС?
25	Две бесконечные проводящие изолированные плиты заряжены так, что суммарная поверхностная плотность заряда обеих сторон первой плиты равна $\sigma_1$ , а второй — $\sigma_2$ . Плиты параллельны друг другу. Найдите поверхностную плотность заряда на каждой стороне плит.
26	Найдите напряжённость электрического поля между тремя пластинами в случае, если средняя пластина заземлена. Расстояния между средней пластиной и крайними $a$ и $b$ . Потенциал крайних пластин $\phi$ .
27	В полости металлического шара радиуса $R$ находится заряд $Q$ . Найдите заряд, индуцируемый этим зарядом на поверхности полости. Почему на поверхности шара заряд будет распределён с постоянной плотностью?
28	Металлический шар радиуса $R_1$ , заряженный до потенциала $\phi$ , окружают концентрической проводящей незаряженной оболочкой радиуса $R_2$ . Чему станет равен потенциал шара, если заземлить оболочку? Соединить шар с оболочкой проводником?

#### Листок 5.

29	Размеры пластин плоского конденсатора увеличили в два раза. Как изменилась его ёмкость? Как изменится ёмкость, если расстояние между пластинами удвоить?
30	Определите ёмкость конденсатора, образованного двумя концентрическими сферами радиуса $R_1$ и $R_2$ .
31	Определите ёмкость систем конденсаторов, изображённых на рисунке.
32	Как изменится ёмкость плоского конденсатора, если поместить его в металлическую коробку? Расстояние от обкладок до стенок коробки равно расстоянию между обкладками $d$ . Как изменится ёмкость, если коробку соединить с одной из обкладок?





Листок 6.

33	Определите силу, с которой притягиваются друг к другу пластины плоского конденсатора, если источник тока, зарядивший конденсатор до разности потенциалов 1000 В, отсоединён. Площадь пластин 100 см <sup>2</sup> , расстояние между пластинами 1 мм. Изменится ли сила взаимодействия пластин, если источник тока будет постоянно подсоединён к пластинам?
34	Как изменится энергия конденсатора, если при той же разности потенциалов между пластинами увеличить все его геометрические размеры в $k$ раз?
35	На пластины плоского конденсатора помещён заряд $Q$ . Площадь пластин $S$ , расстояние между ними $d$ . Какую работу надо совершить, чтобы увеличить расстояние между пластинами на $d$ ? Какую работу надо совершить, чтобы сдвинуть пластины на расстояние $x$ относительно друг друга? Пластины имеют форму квадрата со стороной $a$ . Какая совершается работа в обоих предыдущих случаях, если между пластинами конденсатора поддерживается батареей постоянная разность потенциалов?

Листок 7 (гидродинамика).

36	Под каким углом к горизонту располагается вода в сосуде, движущемся с известным ускорением?
37	Под каким углом к полу вагона расположится чай в стакане, если поезд движется по окружности радиусом 1 км со скоростью 72 км/ч ?
38	С какой скоростью вытекает вода через маленькую дырочку у дна широкой бочки с известным уровнем воды? А из узкой бочки, если известны площади бочки и дырки? Что изменится, если дырка не в боку, а в дне?
39	Как меняется площадь сечения струи, вытекающей из крана, с высотой?
40	Как определить, в какую сторону действует подъёмная сила на крыло известной формы?
41	Даны времена, за которые параллелепипедовидная ванна известных размеров наполняется из крана и опустошается через дырку в дне. До какой высоты дойдёт вода, если одновременно открыть и кран, и дырку?

Листок 8 (заключительная контрольная).

42	Два одинаковых заряженных шарика массы $m$ , подвешенных в одной точке на нитях длины $l$ , разошлись так, что угол между нитями стал прямым. Определите заряд шариков.
----	---

43	Чему равен поток напряжённости однородного электрического поля через боковую поверхность усечённого конуса, радиусы сечения которого равны $R$ и $r$ ? Напряжённость электрического поля $E$ составляет угол $\alpha$ с осью конуса.
44	Три проводящие концентрические сферы радиуса $r$ , $2r$ , $3r$ имеют заряд соответственно $q$ , $2q$ , $-3q$ . Определите потенциал на каждой сфере.
45	Какие заряды индуцируются на каждом из трёх одинаковых конденсаторов ёмкости $C$ , соединённых звездой, если подать на свободные концы напряжения $0$ , $\phi$ и $2\phi$ ?

### 2.3.3. Экспериментальные работы.

Преподаватель: А.Г. Кострыгин.

- 1) Измерить модуль упругости каучукового шарика.  
*Оборудование:* каучуковый шарик, вода, линейка.
- 2) Измерить атмосферное давление.  
*Оборудование:* вода, трубочки, линейка.
- 3) Распределение Гаусса.  
*Оборудование:* монетки.
- 4) Измерение диаметра выходного отверстия у шприца.  
*Оборудование:* шприц, линейка.
- 5) Измерение радиуса песчинки.  
*Оборудование:* секундомер, линейка.
- 6) Изучение зависимости силы растяжения резинки от её удлинения.  
*Оборудование:* миллиметровка, резинка, линейка, грузики.
- 7) Измерение отношения длин ниток маятника.  
*Оборудование:* нитки, грузики.
- 8) Нахождение хаусдорфовой размерности листа дерева.  
*Оборудование:* лист клёна, линейка.
- 9) Измерение скорости вытекания воды из крана.  
*Оборудование:* линейка.
- 10) Измерение плотности карандаша.  
*Оборудование:* вода, нитки, линейка, карандаш.

## 2.4. 11 класс.

### 2.4.1. Теория.

Преподаватель: И.Е. Шендерович.

В 11 классе лекции были посвящены электродинамике. Последние два занятия были посвящены применению общей теории к анализу электрических цепей переменного тока, а также кратко изучалась волновая оптика.

Целью такого курса было изучение разнообразных методов, широко применяемых в физике. Кроме того, итогом лекций явилось построение цельной самосогласованной теории, различные следствия которой можно наблюдать на эксперименте. Фактически, школьники

в первый раз столкнулись с построением работающей физической теории из первопринципов (в данном случае за основу были взяты законы сохранения).

#### План занятий.

- 1) Физические принципы электродинамики. Понятие о физических полях. Примеры полей: поле температур, поле скоростей. Скалярные и векторные поля. Основные операции с векторами. Начала векторного анализа. Интегральные теоремы векторного анализа. Теорема Стокса, Гаусса–Остроградского.
- 2) Электростатика. Закон Кулона как следствие теоремы Гаусса. Потенциал как следствие безвихревой природы электрического поля. Уравнение Пуассона. Теорема Ирншоу.
- 3) Энергия электрического поля. Аналогии с гидродинамикой (задача об обтекании шара идеальной жидкостью) и теплопроводностью (распределение температур в среде с простой геометрией).
- 4) Сохранение энергии в электродинамике. Связь закона сохранения энергии и уравнений Максвелла. Получение уравнений Максвелла, их физический смысл. Симметрия в уравнениях Максвелла. Калибровка.
- 5) Частный случай: магнитостатика. Закон Био–Савара–Лапласа, закон Ампера. Примеры применения этих законов, расчёт магнитного поля от проводников с током простой формы.
- 6) Физика индукции. Закон Фарадея. Сила Ампера. Задача про взаимодействие параллельных токов. Сила Лоренца. Два источника возникновения магнитного поля, физический смысл этого.
- 7) Движущееся электромагнитное поле. Задача про движущуюся заряженную плоскость. Понятие об электромагнитной волне. Волновые процессы в электродинамике. Волновое уравнение.
- 8) Задача про конденсатор в переменном электрическом поле. Пример решения физической задачи методом последовательных приближений. Функция Бесселя.
- 9) Законы Кирхгофа. Примеры применения законов Кирхгофа к цепям постоянного и переменного тока. Катушки индуктивности. Аналогия с механикой. Колебательный контур.
- 10) Понятие о волновой оптике. Явление интерференции как следствие волновой природы света. Интерференция от двух точечных источников света. Интерференция на плоскопараллельной пластинке.

#### 2.4.2. Решение задач.

Преподаватель: Д.В. Батькович.

### 2.4.3. Экспериментальные работы.

Преподаватель: Я.Ю. Коптелов.

Экспериментальные задачи в 11 классе в большинстве своём состояли из задач, ранее предлагавшихся на городских и Всероссийских олимпиадах. Почти в каждой задаче для того, чтобы измерить требуемую величину с помощью предлагающегося оборудования, школьник должен был придумать оригинальную методику. Кроме экспериментов по стандартной школьной программе, в программу 11 класса были включены эксперименты по интерференции и дифракции (№7, №10), по гидродинамике (№5), а также по теории колебаний (№9).

- 1) Изучение зависимости силы сопротивления среды от скорости.  
*Оборудование:* теннисные шарики, нитка, линейка.
- 2) Изучение распределения вероятностей нахождения груза в математическом маятнике.  
*Оборудование:* нитки, груз.
- 3) Измерение толщины масляного пятна на поверхности воды.  
*Оборудование:* масло, вода, линейка.
- 4) Измерение массы куска пластилина.  
*Оборудование:* карандаш, вода, нитка, линейка.
- 5) Измерение радиуса песчинки.  
*Оборудование:* вода, секундомер.
- 6) Измерение момента инерции шарика.  
*Оборудование:* каучуковый шарик, вода, линейка.
- 7) Измерение объёма данных на компакт-диске.  
*Оборудование:* компакт-диск, указка, линейка.
- 8) Измерение плотности карандаша.  
*Оборудование:* вода, нитки, линейка, карандаш.
- 9) Исследование колебательных мод в двойном маятнике.  
*Оборудование:* нитки, монетки.
- 10) Измерение длины волны лазерной указки.  
*Оборудование:* фольга, булавки, указка, линейка.

### 2.5. Факультативы.

Каждый рабочий день в ЛФШ проводились факультативы, или спецкурсы. Спецкурсы обычно представляют собой серию из 4-5 лекций по 1 часу, по теме, не входящей в школьную программу. Целью подобных спецкурсов является рассказ об области науки, являющейся новой и неизвестной для школьников. Школьники свободны в выборе спецкурсов для посещения.

Прочитанные спецкурсы.

1) Космология.

Преподаватель: С.С. Колеватов.

Общая теория относительности. Модель Фридмана. Космологическая постоянная. Сжимающаяся или расширяющаяся Вселенная. Большой Взрыв. Элементарные частицы в первые три минуты. Тёмная материя и тёмная энергия.

2) Физика элементарных частиц.

Преподаватель: И.Е. Шендерович.

Шкала энергий в физике частиц. Материя. Классификация элементарных частиц. Бозоны и фермионы. Виды фундаментальных взаимодействий. Роль симметрии в физике частиц. Законы сохранения и их нарушения. Античастицы. Странность и изоспин. Кварковая модель. Цвет и аромат.

3) Квантовая механика.

Преподаватель: И.А. Барыгин.

Волны. Явление интерференции. Электромагнитные волны. Внешний фотоэффект. Фотон. Опыт с двумя щелями. Дебройлевская длина волны. Принцип неопределённости.

4) Полупроводники.

Преподаватель: Д.С. Смирнов.

Металлы, диэлектрики, полупроводники. Собственные полупроводники. Примесные полупроводники. Язык энергетических диаграмм. Рождение и смерть электрона и дырки. Тепловое движение. Барьер на границе кристалла. Работа выхода. Поверхностное состояние. Поверхностный потенциал.

5) Эксперименты в физике частиц.

Преподаватель: Р.С. Колеватов.

История физики элементарных частиц. Опыты Крукса, Рентгена, Беккереля, Томсона и Форда. Первые приборы в физике элементарных частиц: счётчик Гейгера, камера Вильсона, ядерная эмульсия. Устройство детекторов. Пузырьковая камера. Устройство современного электронного детектора (на примере детектора CMS). Многоклубная структура и её взаимодействие с элементарными частицами.

6) Хаос и фракталы.

Преподаватель: И.Е. Шендерович.

Общее понятие о хаосе. Логистическое отображение. Бифуркационная диаграмма. Удвоение периода. Критическое значение параметра. Постоянная Фейгенбаума. Универсальность. Отображение Жюлиа. Множество Мандельброта. Хаос в физических системах. Маятник с колеблющейся точкой подвеса. Магнетизм. Идея перенормировки на примере фазового перехода в точке Кюри. Наличие хаотической динамики вблизи точки Кюри.

7) Теория узлов.

Преподаватель: А.М. Минарский.

Зачем нужна топология. Математическое определение топологии (топологического пространства). Примеры топологий на конечных множествах. Определение узла. Диаграммы узлов и зацеплений. Преобразования Редемейстера. Идея полинома узла как инварианта. Построение полинома. Вычисление полинома для некоторых узлов и зацеплений. Соотношения типа Конвея. Идея группы узла. Примеры групп.

- 8) Психология.  
Преподаватель: Н.В. Тараканов.
- 9) История Великой Отечественной Войны.

Рассматривались основные сражения и операции во время ВОВ. Каждое занятие факультатива представляло собой подробный рассказ о каком-либо временном этапе с июня 1941 года по август 1945 года. Было проведено десять семинаров, в подготовке занятий участвовали все преподаватели.

## 2.6. Физические бои.

Физические бои проходили по классам. Жюри выбирало капитанов, которые могли самостоятельно набирать команду по системе, принятой в футбольных соревнованиях. Таким образом, соревнующиеся команды были примерно одинаковой силы.

В 8 классе был проведён один физбой (участвовало 8 человек, две команды). В 9 классе был также проведён один физбой (участвовало 15 человек, три команды). В 10 и 11 классе физбои проводились в два дня (полуфинал и финал), участвовало 21 и 23 человека соответственно (по четыре команды в каждом классе).

Задачи для физбоек подбирались в основном из сборников задач повышенной сложности, а также из всевозможных физических олимпиад. Использовалась следующая литература:

- 1) «Всероссийские олимпиады по физике 1992-2001», сборник задач под ред. С.М. Козела и В.П. Слободянина. Москва, 2002.
- 2) «Олимпиадные задачи по физике. Международная олимпиада “Туймадаа”», под ред. Ю.М. Григорьева, В.М. Муравьёва, В.Ф. Потапова. Москва, 2007.
- 3) «Польские физические олимпиады», В. Горшковский. Москва, 1982.
- 4) Задачи из журнала «Квант», 1970–2006.
- 5) «Задачи Московских физических олимпиад», под ред. С.С. Кротова. Москва, 1988.
- 6) 1001 задача по физике с решениями, И. М. Гельфгат, Л.Э. Генденштейн, Л.А. Кирик. Харьков–Москва, 1996.

Ниже приводятся задачи, выдававшиеся на физбоях.

## 2.7. «Большая Задача».

«Большая Задача» выдаётся командам школьников в начале смены. В середине смены проводится защита проведённых исследований. В том случае, если большинство команд справилось с исследованием, выдаётся вторая «Большая Задача», отчёты по которой защищаются непосредственно перед окончанием смены. В противном случае, командам даётся дополнительное время на исследование до конца смены.

Темы исследований по «Большой Задаче».

- (8-9 класс) Определить плотность человека.

Командами были предложены следующие методики определения плотности человека:

- измерить ускорение, с которым человек тонет в воде, и, зная массу человека, из этих данных определить плотность;
  - погружаться в воду, прижимая к себе бутылку, частично заполненную водой и частично — воздухом. Плотность человека рассчитывалась из объема воздуха, необходимого, чтобы человек перестал тонуть;
  - аналогичный метод был предложен и для случая, когда плотность человека меньше плотности воды. В этом случае можно измерить массу песка, которую должен удерживать человек, чтобы начать тонуть;
  - рассчитать плотность человека на основании объема воздуха, который нужно после вдоха выпустить из легких, чтобы начать погружаться в воду;
  - определить плотность на основании измерения доли подводного объема человека в ситуации, когда человек лежит на воде.
- (8-9 класс) Исследовать вытекание воды из сифона.  
Одна из команд установила, что скорость вытекания воды из сифона пропорциональна квадратному корню из высоты уровня воды над свободным концом трубки.  
(TODO)
  - (10-11 класс) Исследовать силу сопротивления воды.

Приведём отчёт команды, которая по мнению жюри лучше всех справилась с исследованием.

**Цель:** исследовать зависимость силы сопротивления от скорости тела в воде.

**Методика.**

- 1) В качестве тела для измерений был выбран шарик для настольного тенниса. В него шприцом заливалась вода, что меняло плотность шарика.
- 2) Мячик погружался в воду специально сделанным держателем.
- 3) В определённый момент мячик отпускали и он поднимался вверх.
- 4) Вышеописанные действия снимали на видеокамеру с частотой 30 кадров в секунду.

**Физическое обоснование.**

- 1) Объём шарика может измерить, обхватив его ниткой. Узнали длину окружности и, тем самым, узнали объём.
- 2) Массу шарика измерили на весах, используя линейку и монеты известной массы.
- 3) Видео, снятое камерой, разбивалось на кадры. Так как около ёмкости с водой стояла линейка, то в каждый момент можно было определить высоту шарика. Отсюда

$$V = \frac{dh}{dt}, \quad a = \frac{dV}{dt}, \quad (1)$$

где  $dt = 1/30$  секунды. Далее, зная ускорение, находим

$$ma = F_a - mg - F_c, \quad F_c = V(g(\rho_{\text{ж}} - \rho_{\text{т}}) - \rho_{\text{т}}a). \quad (2)$$

**Экспериментальные данные.**

**(вставить таблицы и график)**

**Теоретическое обоснование.**

Посмотрим на рисунок токов воды во время движения шарика.

**(вставить картинку)**

В точках 1 и 2 скорость воды  $\approx 0$ , а в точках 1' и 2' находящихся чуть дальше от шарика,  $V$ . Сила вязкого трения, как известно, равна  $F = \eta SV/d$ , следовательно, сила сопротивления линейно зависит от скорости.

Заметно, что перед шариком образуется «водяная подушка», область двигающейся вместе с шариком воды (область между точками 3 и 3'). Поток воды отражается от неё, изменяя импульс шарика:  $\vec{F}\Delta t = m\Delta\vec{V}$ .

**(вставить картинку)**

Рассмотрим отдельно взятый поток. Его начальная скорость равна  $\vec{V}_1$ , конечная —  $\vec{V}_2$ . Так как площадь сечения воды уменьшается, то  $V_2 > V_1$ , но незначительно, поэтому мы будем считать, что  $V_1 = V_2$ .

$$\vec{V}_1 + d\vec{V} = \vec{V}_2 \quad \Rightarrow \quad dV = V_1(2 + 2\cos\alpha). \quad (3)$$

При получении  $\Delta\vec{V}_0 = \left(\int \Delta\vec{V} dS\right)/S$  перпендикулярные скорости шарика проекции взаимоуничтожаются (в силу симметрии), а параллельные складываются, но все они пропорциональны  $V_1$ , поэтому  $\Delta V_0 \sim V_1$ .

Запишем закон изменения импульса:

$$F = \frac{m\Delta V_0}{\Delta t} = \frac{S_{\text{ш}}V_1\Delta t\rho\Delta V_0}{\Delta t} = S_{\text{ш}}\rho V_1\Delta V_0 \quad \Rightarrow \quad F \sim V_1^2. \quad (4)$$



Мы видим, что сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости набегающего потока.

Кроме того, можно заметить, что на больших скоростях сзади шарика появляется турбулентность, которая изменяет силу сопротивления.

(TODO)

## 2.8. «День Изобретателя».

День Изобретателя проводится в первое воскресенье смены. Это командное соревнование, в котором школьники соревнуются в умении сконструировать действующее устройство, демонстрирующее тот или иной физический эффект.

В этом году школьникам 8-9 классов было предложено соорудить установку, демонстрирующую **реактивную силу**, а школьникам 10-11 классов — установку, выдающую максимально возможную **электрическую мощность** (при этом запрещалось использовать любые готовые источники тока, например, розетки или батарейки).

## 2.9. «День Экспериментатора».

Во время «Дня Экспериментатора» (обычно второе воскресенье смены) школьники также разбиваются по командам. Всем командам выдаётся условие двух экспериментальных задач, вместе с необходимым оборудованием. Далее команды обдумывают методику проведения эксперимента и рассказывают её членам жюри. После рассказа методики команды должны продемонстрировать преподавателю ход эксперимента, провести необходимые измерения и после этого написать отчёт. После сдачи отчёта команда получает условие новой экспериментальной задачи. Обычно лучшим командам удаётся решить около 5-6 экспериментальных задач за отведённое время (с 10:00 до 17:00). В конце дня жюри проверяет отчёты и подводит итоги. Члены победившей команды получают значки «Лучший Экспериментатор».

Стилистика задач для этого соревнования немного отличается от принятой на ежедневных занятиях: школьникам даётся минимум оборудования. Это означает, что методика решения задачи может быть довольно нестандартной. Например, объект эксперимента может выступать как измерительный прибор (см., например, задачу №1 в 11 классе). Возможна и обратная ситуация: измерительный прибор может играть нестандартную роль (например, с помощью омметра в задаче №7 11 класса предполагалось заряжать конденсаторы).

В этом году 8, 9, 10 и 11 класс были поделены на 2, 3, 4 и 4 команды соответственно.

### Список экспериментальных задач.

#### • 8 класс

- 1) Измерить толщину бумаги.  
*Оборудование:* бумага, линейка.
- 2) Измерить силу отрыва магнита от куска железа.  
*Оборудование:* магнит, монетки, резинка.
- 3) Измерить плотность камня и бруска.  
*Оборудование:* камень, брусок, вода, линейка, нитки.
- 4) Измерить скорость ветра.  
*Оборудование:* бумага, скотч, линейка.
- 5) Измерить скорость вытекания воды из крана.  
*Оборудование:* секундомер, бумага, пакет, линейка, камни.

#### • 9 класс

- 1) Измерить высоту дерева.  
*Оборудование:* линейка.
- 2) Измерить плотность неизвестной жидкости.  
*Оборудование:* вода, линейка, нитки, камни, кружка, неизвестная жидкость.
- 3) Измерить разрешающую способность глаза.  
*Оборудование:* линейка.
- 4) Измерить толщину карандашной линии.  
*Оборудование:* карандаш, бумага, линейка.
- 5) Измерить плотность масла.  
*Оборудование:* вода, масло, 2 трубки, линейка.
- 6) Измерить амплитуду дрожания рук экспериментатора.  
*Оборудование:* лазерная указка, бумага, карандаш, линейка.

● **10 класс**

- 1) Измерить отношение радиуса острия булавки к радиусу её головки.  
*Оборудование:* булавка, фольга, миллиметровка.
- 2) Измерить силу отрыва скотча от мотка.  
*Оборудование:* скотч, резинка, линейка, монетки.
- 3) Измерить длину футбольного поля.  
*Оборудование:* линейка.
- 4) Измерить угловой размер Солнца.  
*Оборудование:* линейка.

● **11 класс**

- 1) Измерить коэффициент трения верёвки о трубу.  
*Оборудование:* верёвка.
- 2) Измерить расстояние между витками в лампочке.  
*Оборудование:* батарейка, фольга, провода, игла, линейка, бумага, пластилин.
- 3) Измерить высоту облаков.  
*Оборудование:* линейка.
- 4) Измерить отношение теплопроводностей двух металлов.  
*Оборудование:* свечка, две проволоки из разных металлов, линейка.
- 5) Измерить солёность раствора.  
*Оборудование:* соль, монетки, линейка, вода, раствор, два стакана.
- 6) Расшифровать электрический чёрный ящик.  
*Оборудование:* чёрный ящик, мультиметр.
- 7) Измерить отношение ёмкостей двух конденсаторов.  
*Оборудование:* мультиметр.

В целом, все предложенные задачи были успешно решены командами. Наиболее активно школьники проявили себя в 9 и 11 классе (в последнем пришлось выдавать дополнительную задачу, чтобы выявить победителя). Задачи, предложенные в 10 классе, по-видимому, оказались довольно сложными с технической точки зрения (так, задачу №1 решила всего одна команда).

(TODO)

### 3. Развлекательная часть.

Во второй половине дня в ЛФШ проводятся различные традиционные игры и состязания. После ужина у школьников обычно свободное время. В это время обычно проходил факультатив по истории Великой Отечественной Войны, либо демонстрировались различные художественные фильмы. Кроме того, после ужина проходили матчи чемпионата по футболу, поскольку именно в это время суток температура воздуха становилась приемлемой для игры в футбол.