

# Случайные процессы. Прикладной поток.

## Теоретическое задание 4.

Процессы с независимыми приращениями. Пуассоновские процессы.

При решении можно пользоваться следующим утверждением.

Пусть  $\xi_1, \dots, \xi_n$  — независимые экспоненциальные случайные величины с параметром  $\lambda$ ,  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ . Тогда вектор  $(S_{n-1}, S_n)$  имеет плотность

$$f(x, y) = p_{S_{n-1}}(x)p_{\xi_n}(y - x).$$

1. Пусть  $(X_t, t \geq 0)$  — процесс восстановления, построенный по  $\{\xi_n, n \in \mathbb{N}\}$ . Верно ли, что процесс  $X_t$  всегда имеет независимые приращения?
2. Пусть  $N^1 = (N_t^1, t \geq 0), \dots, N^k = (N_t^k, t \geq 0)$  — независимые пуассоновские процессы, причем  $N^i$  имеет интенсивность  $\lambda_i$ . Докажите, что процесс  $N_t = \sum_{i=1}^k N_t^i$  также является пуассоновским, и найдите его интенсивность.
3. Пусть  $(\xi_n, n \in \mathbb{N})$  — независимые экспоненциальные случайные величины с параметром  $\lambda$ ,  $S_n = \xi_1 + \dots + \xi_n$ , а  $N = (N_t, t \geq 0)$  — процесс восстановления, построенный по ним (пуассоновский процесс интенсивности  $\lambda$ ). Для каждого  $t > 0$  обозначим  $V_t = S_{N_t+1} - t$  (“перескок”) и  $U_t = t - S_{N_t}$  (“недоскок”).
  - а) Вычислите вероятность  $P(V_t > v, U_t > u)$ .
  - б) Докажите, что  $V_t$  и  $U_t$  — независимы и что  $V_t \sim \text{Exp}(\lambda)$ .
  - в) Вычислите функцию распределения  $U_t$  и  $EU_t$ .
4. Пусть  $(N_t, t \geq 0)$  — пуассоновский процесс интенсивности  $\lambda$ . Найдите предел п.н.  $N_t/t$  при  $t \rightarrow \infty$ .