

## Билет 24

Правосторонний и левосторонний пределы функции в точке. Свойства пределов функций

### Определение правостороннего и левостороннего пределов функции в точке

Пусть функция  $f$  определена на  $(a; x_0)$

$g \in \overline{\mathbb{R}}$  называется пределом  $f$  в точке  $x_0$  слева, если

$$\forall \{x_n\} : ((\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in (a; x_0) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g$$

Обозначение:  $\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = g$  или  $f(x_0 - 0) = g$

Пусть функция  $f$  определена на  $(x_0; a)$

$g \in \overline{\mathbb{R}}$  называется пределом  $f$  в точке  $x_0$  справа, если

$$\forall \{x_n\} : ((\forall n \in \mathbb{N}) x_n \in (x_0; a) \wedge \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = g$$

Обозначение:  $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = g$  или  $f(x_0 + 0) = g$

### Теорема

$f$  определена на  $X := (a; x_0) \cup (x_0; b)$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = g \wedge \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = g \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = g$$

### Необходимость

Возьмём последовательность  $\{x_n\} \subset X$ , сходящуюся к  $g$

$\{x_{a_n}\}$  — подпоследовательность всех  $x_n < x_0$

$\{x_{b_n}\}$  — подпоследовательность всех  $x_n > x_0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 - 0} f(x) = g \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{a_n}) = g$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} f(x) = g \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{b_n}) = g$$

Иными словами:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists k : (\forall m > k) |f(x_{a_m}) - g| < \varepsilon \wedge |f(x_{b_m}) - g| < \varepsilon \Rightarrow (\forall n > \max\{a_m, b_m\}) |f(x_n) - g| < \varepsilon \square.$$

### Достаточность

Определение предела по Гейне распространяется в том числе и на последовательности из  $(a; x_0) \subset X$  и  $(x_0; a) \subset X$   $\square$ .

### Свойства пределов функций

Арифметические свойства, свойства, связанные с операциями сравнения и принцип сжатой переменной доказываются через последовательности

Аналогично эти свойства доказываются и для односторонних пределов