

Билет 55

Производные высших порядков, их свойства, формула Лейбница.

Определение производных высших порядков

Пусть f имеет на P производные $f'(x), f''(x), \dots, f^{(n-1)}(x)$.

Если в $x_0 \in P \exists f^{(n)}(x_0)$, то её называют производной n -го порядка в x_0

$$f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)}(x))' \quad f^{(0)}(x) := f(x)$$

Определение n раз дифференцируемой функции

Если $(\forall x \in X) \exists f^{(m)}(x) \forall m \leq n$, то f — n раз дифференцируема на X .

Если $(\forall x \in X, n \in \mathbb{N}) \exists f^{(n)}(x)$, то f — бесконечно дифференцируема на X .

Свойства производных высших порядков

Из определения следует:

$$(cf(x))^{(n)} = cf^{(n)}(x), \quad c = \text{const} \quad (f(x) + g(x))^{(n)} = f^{(n)}(x) + g^{(n)}(x)$$

Теорема (формула Лейбница)

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)}$$

Доказательство

Индукция: $P(n)$ — верность формулы Лейбница для n

1. $P(1)$

$$(uv)' = uv' + u'v = C_1^0 uv' + C_1^1 u'v = \sum_{k=0}^1 C_1^k u^{(k)} v^{(1-k)}$$

2. $P(n-1) \Rightarrow P(n)$

$$\begin{aligned} (uv)^{(n)} &= ((uv)^{(n-1)})' = \left(\sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k u^{(k)} v^{(n-1-k)} \right)' = \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k u^{(k+1)} v^{(n-1-k)} + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k u^{(k)} v^{(n-k)} = \\ &= \sum_{k=1}^n C_{n-1}^{k-1} u^{(k)} v^{(n-k)} + \sum_{k=0}^{n-1} C_{n-1}^k u^{(k)} v^{(n-k)} = \\ &= C_{n-1}^{n-1} u^{(n)} v^{(0)} + \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-1}^{k-1} u^{(k)} v^{(n-k)} + \sum_{k=1}^{n-1} C_{n-1}^k u^{(k)} v^{(n-k)} + C_{n-1}^0 u^{(0)} v^{(n)} = \\ &= C_n^0 u^{(0)} v^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} (C_{n-1}^{k-1} + C_{n-1}^k) u^{(k)} v^{(n-k)} + C_n^n u^{(n)} v^{(0)} = \\ &= C_n^0 u^{(0)} v^{(n)} + \sum_{k=1}^{n-1} C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} + C_n^n u^{(n)} v^{(0)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(k)} v^{(n-k)} \quad \square. \end{aligned}$$