中学数学公式一覧

Ver.1.13　(2026 年作成)

1　計算の公式

1.1　交換法則・結合法則・分配法則

加法の交換法則　$a+b=b+a$
加法の結合法則　$a+b+c=(a+b)+c=a+(b+c)$
乗法の交換法則　$ab=ba$
乗法の結合法則　$abc=(ab)c=a(bc)$
分配法則　$(a+b)\times c=c\times(a+b)=ac+bc$

1.2　等式の性質

$A=B$ が成り立つとき、
和　$A+C=B+C$
差　$A-C=B-C$
積　$AC=BC$
商　$\dfrac{A}{C}=\dfrac{B}{C}$　　$(C\neq 0)$

1.3　指数法則

$a^m\times a^n=a^{m+n}$
$(a^m)^n=a^{mn}$
$(ab)^m=a^mb^m$

1.4　展開・因数分解

$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$
$(x+a)(x+b)=x^2+(a+b)x+ab$
$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$
$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$
$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$
$(ax+b)(cx+d)=acx^2+(ad+bc)x+bd$

1.5　平方根

$(\sqrt{a})^2=a$
$\sqrt{a^2}=|a|$　　($|a|$ は a の絶対値)
$\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$
$\dfrac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}=\sqrt{\dfrac{b}{a}}$

1.6　２次方程式の解の公式

$ax^2+bx+c=0$ の解　　$x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$ax^2+2b'x+c=0$ の解　　$x=\dfrac{-b'\pm\sqrt{b'^2-ac}}{a}$


2　関数の公式

2.1　比例

$y=ax$　　(a: 比例定数)　　$a=\dfrac{y}{x}$

2.2　比例のグラフ

$y=ax$ のグラフは、原点を通る直線
(1) $a>0$ のとき　(2) $a<0$ のとき




y
a

2.3　反比例

$y=\dfrac{a}{x}$　　(a: 比例定数)　a=xy

2.4　反比例のグラフ

$y=\dfrac{a}{x}$ のグラフは、双曲線と呼ばれる曲線
(1) $a>0$ のとき　　(2) $a<0$ のとき




2.5　1次関数 $y=ax+b$ のグラフ

$y=ax+b$　　(a: 傾き　b: y 切片)


2 直線が平行 $\Rightarrow$ 2 直線の傾きが等しい

2 直線が垂直 $\Rightarrow$ 2 直線の傾きをかけると -1

(1) $a>0$ のとき




(2) $a<0$ のとき



2.6　2次関数 $y=ax^2$ のグラフ


$y=ax^2$ のグラフは、原点を通る放物線で、y 軸について対称

(1) $a>0$ のとき



下に凸

(2) $a<0$ のとき



上に凸

2.7　変化の割合

変化の割合 $=\dfrac{y\text{の増加量}}{x\text{の増加量}}$

$y=ax+b$ の変化の割合　(x が p から q まで変化するとき)

$$\frac{(aq+b)-(ap+b)}{q-p}$$
$$=\frac{a(q-p)+(b-b)}{q-p}$$
$$=a$$

$y=ax^2$ の変化の割合　(x が p から q まで変化するとき)

$$\frac{aq^2-ap^2}{q-p}$$
$$=\frac{a(q^2-p^2)}{q-p}$$
$$=\frac{a(q+p)(q-p)}{q-p}$$
$$=a(p+q)$$


$y=ax^2$ と交わる直線 $y=mx+n$ の求め方

傾き：$m=a(p+q)$


切片：$n=-apq$

$y=a(p+q)x-apq$

交点の x 座標が p, q ($p\neq q$、$a\neq 0$)



2.8　中点の座標



2 点 $A(x_a,y_a), B(x_b,y_b)$ の中点の座標は、


$$\left(\frac{x_a+x_b}{2}\ ,\ \frac{y_a+y_b}{2}\right)$$

3　図形の公式

3.1　円

円周　$l=2\pi r$

面積　$S=\pi r^2$




3.2　おうぎ形

弧の長さ　$l=2\pi r\times\dfrac{\theta}{360}$

面積　$S=\pi r^2\times\dfrac{\theta}{360}$

$=\dfrac{1}{2}lr$





3.3　角柱・円柱

表面積 = 側面積 + 底面積 ×2

側面積 = 底面の周 × 高さ

体積　$V=Sh$　　(S: 底面積　h: 高さ)







3.4　角錐・円錐

表面積 = 側面積 + 底面積

体積　　$V = \frac{1}{3}Sh$　　(S: 底面積　h: 高さ)





中心角 θ　　$360^\circ \times \frac{2\pi r}{2\pi l} = 360^\circ \times \frac{r}{l}$

側面積　　$\pi l^2 \times \frac{2\pi r}{2\pi l} = \pi lr$


表面積　　底面積 + 側面積 $= \pi r^2 + \pi lr = \pi r(r+l)$

体積　　$\frac{1}{3}Sh = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

3.5　球

表面積　　$S = 4\pi r^2$

体積　　$V = \frac{4\pi r^3}{3}$




3.6　平行線と角

対頂角は等しい
2 直線が平行 $\Leftrightarrow$ 同位角が等しい
2 直線が平行 $\Leftrightarrow$ 錯角が等しい

3.7　三角形の内角の和・外角

三角形の内角の和は 180°
三角形の 1 つの外角は、それと隣り合わない 2 つの内角の和に等しい



3.8　多角形

n 角形の内角の和　　$180^\circ \times (n-2)$
n 角形の外角の和　　360°

3.9　三角形の合同条件

3 組の辺がそれぞれ等しい
2 組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
1 組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

3.10　直角三角形の合同条件

斜辺と一つの鋭角がそれぞれ等しい
斜辺と他の 1 辺がそれぞれ等しい

3.11　二等辺三角形

二等辺三角形の底角は等しい
二つの角が等しい三角形は二等辺三角形である
頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分する

3.12　平行四辺形の性質

2 組の対辺がそれぞれ等しい
2 組の対角がそれぞれ等しい
対角線がそれぞれの中点で交わる

3.13　平行四辺形になる条件


2 組の対辺がそれぞれ平行である
2 組の対辺がそれぞれ等しい
2 組の対角がそれぞれ等しい
対角線がそれぞれの中点で交わる
1 組の対辺が平行でその長さが等しい


3.14　三角形の相似条件

3 組の辺の比がすべて等しい
2 組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい
2 組の角がそれぞれ等しい

3.15　相似の基本

相似な三角形では、
　対応する角がそれぞれ等しい
　対応する辺の比がすべて等しい






$AD : AB = AE : AC = DE : BC$

3.16　平行線と線分の比

平行線によって分けられる線分の比はどこも等しい




$$AB : BC = DE : EF = GH : HI$$

3.17　面積比・体積比

二つの図形の相似比が $m : n$ であるとき、


面積比　$m^2 : n^2$


体積比　$m^3 : n^3$




高さが同じ三角形では、


底辺の比 ＝ 面積比







3.18　三角形の内角、外角の二等分線と線分の比





$$AB : AC = BD : DC$$






3.19　中点連結定理

$MN \parallel BC$

$MN = \dfrac{1}{2}BC$




3.20　円周角の定理


同じ弧に対する円周角は等しい


同じ弧に対する中心角は円周角の 2 倍


円周角・中心角の大きさは弧の長さに比例

円に内接する四角形の対角の和は 180°










3.21　円の接線・弦


円の接線は接点を通る半径に垂直

円の弦の垂直二等分線は円の中心を通る

円外の点から円に引いた接線の長さは等しい

3.22　接弦定理






接線と弦の作る角 ＝ 円周角

3.23　方べきの定理


平行でない 2 直線が円とそれぞれ 2 点で交わるとき



円周角の定理、および、対頂角が等しいことから
△PAC ∽ △PDB なので
$PA : PD = PC : PB$

$$\therefore \quad PA \times PB = PC \times PD$$

平行でない 2 直線のうち、1 本が円と 2 点で交わり、もう 1 本が円と接するとき




接弦定理、および、∠P は共通なので
△PTA ∽ △PBT
従って $PT : PB = PA : PT$

$$\therefore \quad PA \times PB = PT^2$$

3.24　三平方の定理

直角三角形の斜辺の 2 乗は、その他 2 辺の 2 乗の和になる


$a^2 + b^2 = c^2$



3.25　ピタゴラス数

$a^2 + b^2 = c^2$ を満たす正の整数の組 (a, b, c) のことを、
ピタゴラス数と呼ぶ
ピタゴラス数は無限個存在する
$(a, b, c) = (3, 4, 5), (5, 12, 13), (7, 24, 25), (8, 15, 17), \cdots$


3.26　特別な直角三角形の辺の比



3.27　三角形に内接する円の半径

△ABC の面積を S、△ABC の内接円の半径を r とすると、

$$r = \frac{2S}{a+b+c}$$




3.28　ヘロンの公式

3 辺の長さが a, b, c の三角形の面積 S は、

$$S = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$


（　ただし　$s = \frac{1}{2}(a+b+c)$　）



3.29　直方体の対角線

縦の長さ a、横の長さ b、高さ c の直方体の対角線の長さは、

$$\sqrt{(\sqrt{a^2+b^2})^2 + c^2} = \sqrt{a^2+b^2+c^2}$$



4　データの活用

4.1　度数の分布

度数分布表


階級（kg）	度数（人）	相対度数
以上　未満		
45 〜 50	1	0.05
50 〜 55	4	0.20
55 〜 60	8	0.40
60 〜 65	5	0.25
65 〜 70	2	0.10
計	20	1.00

範囲（レンジ）　資料の最大の値と最小の値の差
階級の幅　区間の幅
階級値　階級の中央の値
（階級 45〜50kg の階級値は 47.5kg）

相対度数

$$\text{相対度数} = \frac{\text{その階級の度数}}{\text{度数の合計}}$$

4.2　ヒストグラム



度数折れ線　ヒストグラムで、１つ１つの長方形の上の辺の中点を結んだもの
両端は度数 0 の階級があるものと考える

4.3　平均値

資料の値から求める方法

$$\text{平均値} = \frac{\text{資料の値の合計}}{\text{資料の個数}}$$

度数分布表から求める方法

$$\text{平均値} = \frac{\{(\text{階級値}) \times (\text{度数})\} \text{ の合計}}{\text{度数の合計}}$$

（上の度数分布表では、平均値は 58.25kg）

仮の平均を利用する方法

$$\text{平均値} = \frac{\{(\text{階級値} - \text{仮の平均}) \times (\text{度数})\} \text{ の合計}}{\text{度数の合計}} + \text{仮の平均}$$

4.4　中央値（メジアン）

資料の値を大きさの順に並べたとき、その中央の値のこと

奇数個のデータの場合

7　11　25　48　64
中央値

偶数個のデータの場合

2　5　16　21　72　99
この平均が中央値

4.5　最頻値（モード）

資料の中で最も多く現れる数値
度数分布表では、度数が最も大きい階級の階級値
（上の度数分布表では、最も度数が大きいのは、55kg 以上 60kg 未満の階級であるから、最頻値は 57.5kg）

4.6　近似値と有効数字

近似値　測定などによって得た真の値に近い値
誤差　（誤差）＝（近似値）−（真の値）
有効数字　近似値の表す数のうち、信頼できる数字
0.1cm の目盛りがついたものさしで長さを測り、測定値（近似値）が 4.8cm だったとき、この近似値の 4.8 という数字は信頼できるので、有効数字は 4.8

有効数字の表し方
ある人の身長を 170cm と表したとき、この 170cm という数字は、単位が 1cm の測定器で測った結果なのか、それとも 167cm を四捨五入した値なのかで、どこまでが有効数字（＝信頼できる）なのかが異なる
このようなとき、近似値を整数部分が 1 桁の数と 10 の累乗の積の形で表すと、有効数字が何桁なのか（＝どの程度信頼できるか）がはっきりとわかるようになる
1cm 単位の測定器で測ったとき (有効数字が 3 桁)
→ $1.70 \times 10^2 cm$
10cm 単位の測定器で測ったとき (有効数字が 2 桁)
→ $1.7 \times 10^2 cm$

データを小さい順に並べ、中央の位置と散らばりに着目して考える。

4.7 四分位数

四分位数の意味

小さい順に並べたデータを、個数に着目しておよそ四等分するときの区切りの値。

- 第 2 四分位数 Q_2：全体の中央値。
- 第 1 四分位数 Q_1：小さい方の半分のデータの中央値。
- 第 3 四分位数 Q_3：大きい方の半分のデータの中央値。

データが**奇数個**のときは、全体の中央値を**除いて**、小さい方と大きい方の半分に分ける。

求める手順

1. データを小さい順に並べる。
2. 全体の中央値 Q_2 を求める。
3. 小さい方の半分から Q_1 を求める。
4. 大きい方の半分から Q_3 を求める。

4.8 四分位範囲

第 3 四分位数から第 1 四分位数を引いた値。

$$\boxed{\text{四分位範囲} = Q_3 - Q_1}$$

中央付近のおよそ 50% のデータの散らばりを表す。

- 小さいほど、中央付近の散らばりは小さい。
- 大きいほど、中央付近の散らばりは大きい。

範囲（レンジ）との違い

$$\text{範囲} = \text{最大値} - \text{最小値}$$

範囲はデータ全体、四分位範囲は中央付近の散らばりを表す。

四分位**数**は 3 つの区切りの値。四分位**範囲**は $Q_3 - Q_1$ で求める **1 つの値**。

4.9 四分位数の求め方の例

(1) データが偶数個の場合：8 個

$$2,\ 4,\ 5,\ 7,\ 8,\ 10,\ 12,\ 16$$

全体の中央値は、中央の 2 つの値の平均。

$$Q_2 = \frac{7+8}{2} = 7.5$$

小さい方の半分は $2, 4, 5, 7$ なので、

$$Q_1 = \frac{4+5}{2} = 4.5$$

大きい方の半分は $8, 10, 12, 16$ なので、

$$Q_3 = \frac{10+12}{2} = 11$$

$$\text{四分位範囲} = 11 - 4.5 = 6.5$$

$$\text{範囲} = 16 - 2 = 14$$

---

(2) データが奇数個の場合：9 個

$$1,\ 3,\ 4,\ 6,\ 7,\ 9,\ 11,\ 12,\ 15$$

全体の中央値は、中央の 5 番目の値。

$$Q_2 = 7$$

中央値の 7 を除いて、前後に分ける。
小さい方は $1, 3, 4, 6$、大きい方は $9, 11, 12, 15$。

$$Q_1 = \frac{3+4}{2} = 3.5$$

$$Q_3 = \frac{11+12}{2} = 11.5$$

$$\text{四分位範囲} = 11.5 - 3.5 = 8$$

$$\text{範囲} = 15 - 1 = 14$$

全体の中央値を求めるときも、半分に分けた後の中央値を求めるときも、**偶数個なら中央の 2 つの平均**を使う。


4.10 箱ひげ図

次の 5 つの値を、箱とひげで表した図。

$$\text{最小値},\ Q_1,\ Q_2,\ Q_3,\ \text{最大値}$$

- 箱の左端：第 1 四分位数 Q_1。
- 箱の中の線：中央値 Q_2。
- 箱の右端：第 3 四分位数 Q_3。
- ひげの両端：最小値・最大値。

前ページの 8 個のデータの箱ひげ図



かき方

1. 5 つの値を求め、目盛りをそろえる。
2. Q_1 から Q_3 までの箱をかく。
3. 箱の中に Q_2 の線をかく。
4. 最小値・最大値までひげを伸ばす。


ここでは**中学数学の箱ひげ図**を扱う。ひげの両端を、最小値・最大値として表す。

4.11 箱ひげ図の読み取りと比較

比較するときは、**同じ目盛り**で見る。

- 中央値の位置：分布の中心を比べる。
- 箱の幅：四分位範囲を比べる。
- ひげの端から端：範囲を比べる。

例：中央値と範囲が同じ 2 つの集団



	最小値	Q_1	Q_2	Q_3	最大値
A	2	5	8	11	16
B	2	7	8	9	16

A・B ともに、中央値は 8、範囲は $16-2=14$。

$$\text{A の四分位範囲} = 11-5=6$$
$$\text{B の四分位範囲} = 9-7=2$$

B の方が、中央付近のデータの散らばりは小さい。

4.12 間違えやすい点

- 中央値と平均値は、いつも等しいとは限らない。
- 箱が長いほど、人数が多いわけではない。
- ひげの長さや箱の面積から、人数を比べない。
- 箱ひげ図だけでは、一般に平均値・最頻値・データの個数は分からない。

四分位数で分けた各部分には、およそ 25% ずつのデータが含まれる。ただし、**同じ値が重なる場合**があるので、「ある値より大きい人数」などを厳密に判断するときは注意する。

5　場合の数と確率

5.1　順列と組み合わせの違い

場合の数を求めるときは、いくつのものからいくつを選んで並べるのか（＝ 順列）、いくつのものからくつを選ぶのか（＝ 組み合わせ）を区別して考える

順列　　順番を考える（＝並べる）

組み合わせ　順番を考えない（＝選ぶ）


A,B,C,D の 4 人がいて、この 4 人の席順を決めるときは、順番を考える（＝並べる）ので「順列」、4 人から 2 人の委員を決めるときは、順番を考えない（＝選ぶ）なので「組み合わせ」の数え方をする

5.2　場合の数の求め方

漏れや重なりがないように数える
順番に注意して「規則的」に数えるのがコツ

樹形図を書く

（例）A, B, C の 3 枚のカードから 2 枚を取り出してならべる場合の数（＝ 順列）：



・・・・・　6 通り

列挙する

（例）1, 2, 3, 4 の 4 枚のカードから 3 枚を選ぶ場合の数（＝組み合わせ）：

$(1,2,3),(1,2,4),(1,3,4),(2,3,4)$　・・・・・　4 通り

表にする

（例）大小 2 個のさいころを投げたとき、出た目の積が 4 の倍数になる場合の数：

小＼大	1	2	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5	6
2	2	4	6	8	10	12
3	3	6	9	12	15	18
4	4	8	12	16	20	24
5	5	10	15	20	25	30
6	6	12	18	24	30	36

・・・・・　15 通り

計算で求める

「樹形図を書く」方法において、それぞれ何か所の「枝分かれ」があるかを考えると、場合の数は「計算で求める」 こともできる
上記の例では、1 枚目は A, B, C の 3 通り、2 枚目は、1 枚目のそれぞれについて 2 通りの場合があるので、全部の場合の数は、

$$3 \times 2 = 6$$

となる

5.3　確率

確率とは

「あることがら」がどれくらい確かに起こりうるのかを、割合・率であらわしたもの

$$\text{確率} = \frac{\text{あることがらの場合の数}}{\text{すべての場合の数}}$$

絶対起こらない確率 $= 0$

絶対起こる確率 $= 1$

P が起こらない確率

$1 - p$　　(p : P が起こる確率)

少なくとも 1 回以上 P が起こる確率

1 − (1 回も P が起こらない確率)