教育心理学与教育产品设计-第七组



往期汇报参考： 教育心理学与教育产品设计往期汇报参考

PPT：【金山文档 | WPS云文档】 第七组-心理健身房
https://www.kdocs.cn/l/chbaXJnqnTGV

汇报发言人：一、四、五：朱康静；二、三、六、七：郑梁

一、产品简单介绍

1. 主题：心理健身房
2. 目标用户：心理亚健康大学生（感觉自己心理没那么健康，需要调节，但是又没有达到非常抑郁或者焦虑，需要直接去心理咨询的大学生）
3. 平台：微信小程序或手机app
4. 核心理念：情绪健身房是一个基于健康心理学的情绪能力训练系统。来这里的人不是因为生病了，是因为想对自己更好一点，想在难的时候还能撑住自己。我们做的，是帮他们把这件事变得容易一点。
5. 定位一句话：不治病，不替代心理咨询。帮助大学生在日常生活中系统提升情绪调节能力——就像Keep 帮你提升身体素质一样。

6. 副标题：候选练出更好的自己，从情绪开始；每一次练习，都是对自己更温柔一点；情绪也是肌肉，越练越有力量
7. 两种入口，同一套系统

类比 Keep：用户既可以选「练腹肌」（部位导向），也可以选「备战马拉松」（目标导向）。

情绪健身房同理，提供两种进入方式：

入口类型	用户心态	进入方式
维度导向	我想系统提升情绪能力	选择生物 / 心理 / 社会维度，按计划训练
情境导向	我现在有具体困扰	选择当下困扰情境，系统推荐专属路径

二、用户痛点 领取人：王煦博 4月6日 8:00

1、在快节奏、高刺激的数字时代，高校学生的情绪体验变得**高频、短暂且碎片化**。他们习惯于用“emo”、“破防”等流行用语概指代一切负面感受，对情绪的感知颗粒度变得愈发粗糙，**失去了精准识别“焦虑”、“羞耻”、“孤独”等不同情绪的能力（无准确数据确定）**。加之高校学生**长期处于“久坐、熬夜、屏幕前”（相比而言久坐比例不太高）**的静态生存模式中，身体感受的敏锐度大幅下降，压力不再以“我感到紧张”的形式被感知，而是异化为查无原因的头痛、失眠、暴食。这种“身心断连”使得他们无法从身体层面感知和释放情绪。

2、在竞争加剧的社会环境下，大量高校学生日常处于心理亚健康状态（介于心理健康与精神疾病之间的过渡状态，个体尚未达到临床诊断标准，但已出现明显的身心不适和功能下降），常会出现**情绪低落、易怒、焦躁（无准确量表数据）**的状态，认知层面也会有注意力、记忆力下降的情况（但未达到抑郁等临床标准）。目前高校学生解决心理问题的选择主要有三类：**a、高校内部心理中心和援助热线；b、社会专业咨询机构资源与热线；c、医疗机构精神专科。（线上自媒体）**高校内部心理中心虽然免费、易得，但资源较为紧张，且主要服务群体是处于更严重的心理问题与困扰中的学生群体，覆盖面小；社会咨询机构则鱼龙混杂，并且费用昂贵，学生群体不一定负担得起；医疗机构则面向达到较严重心理疾病诊断标注的个体，且现阶段社会环境下**学生的病耻感和对精神专科的污名化还较为突出（更多是懒得去，对危害认识不足，且）**，仅有轻度心理困扰的学生可能不愿就医。因此心理亚健康高校学生群体的心理保健需求在当下的环境下无法得到满足。

三、市场调研 领取人：赵佳 4月6日 8:00

1. 行业分析：
2. 竞品分析：

四、产品具体介绍 领取人：朱康静 4月3日 8:00

第一部分：情绪体能基线测评

用途：用户首次进入产品时完成，3题快速分流，30秒内完成，用户根本感觉不到在做量表；做完立刻生成三维度报告和推荐训练顺序；如果用户想更精准，才进入深化测评选对应维度——约10分钟，生成三维度情绪体能报告，系统据此推荐优先训练维度和起始级别。

快速分流 · 第1题，共3题

最近这段时间，哪个方面最让你感到吃力？

选一个最符合的就好，不用想太多

- ✓ 身体状态——睡不好、吃不规律、总是累
- ○ 脑子里的声音——焦虑、反复想、停不下来
- ○ 关系里的感觉——累、内耗、不知道怎么相处
- ○ 说不清楚，好像哪里都有一点

快速分流 · 第2题，共3题

当你情绪不好时，你通常会怎么做？

- ○ 一个人待着、睡觉、刷手机转移注意力
- ○ 反复想这件事，越想越难受
- ○ 找人说说、或者特别想找人说但不知道找谁
- ○ 吃东西、或者完全没有食欲

快速分流 · 第3题，共3题

此刻，你的整体情绪状态大概是几分？

0 = 很糟糕，10 = 很好

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

很糟糕　　还好　　很好



深化测评说明：以下题目改编自多个成熟量表，经过语言温暖化处理，适合大学生日常使用。计分方式保留在各维度说明中。

【生物维度】身体和情绪的关系

请根据最近两周的实际情况作答。

计分说明：1=从不 2=偶尔 3=有时 4=经常 5=总是

题号	题目	1	2	3	4	5
1	我睡醒后感觉精力充沛，状态不错	○	○	○	○	○
2	我能感觉到自己什么时候真的饿了，什么时候只是想吃东西	○	○	○	○	○
3	当我情绪不好时，我能说出身体哪个部位有感觉（如胸口紧、肩膀酸）	○	○	○	○	○
4	我的睡眠质量影响了我第二天的情绪状态	○	○	○	○	○
5	我会因为情绪不好而多吃东西或没有食欲	○	○	○	○	○

6	运动之后我的心情会变好	○	○	○	○	○
7	我能分辨「我累了」和「我情绪不好」的区别	○	○	○	○	○
8	我的睡眠时间和规律比较稳定	○	○	○	○	○

生物维度得分 = 各题分数加总（第4、5题为反向计分：6-原始分）。满分40分，得分越高表示身心联结越好。

【心理维度】思维和情绪的关系

请根据最近两周的实际情况作答。

计分说明：1=完全不符合 2=较不符合 3=有点符合 4=较符合 5=完全符合

题号	题目	1	2	3	4	5
1	当我心情不好时，我会努力从不同角度看这件事	○	○	○	○	○
2	遇到麻烦时，我会反复想同一件事，停不下来	○	○	○	○	○
3	我相信自己能处理好大多数让我难受的情况	○	○	○	○	○
4	我有时候会用压抑情绪来应对，假装没事	○	○	○	○	○
5	当我感到焦虑时，我能找到让自己平静下来的方法	○	○	○	○	○
6	我会因为一件不顺心的事情影响一整天	○	○	○	○	○
7	我能根据不同情境选择不同的情绪应对方式	○	○	○	○	○
8	我对自己的未来感到有把握	○	○	○	○	○
9	失败或挫折之后，我能比较快地恢复过来	○	○	○	○	○
10	我经常在脑子里反复回放让自己难受的场景	○	○	○	○	○

心理维度得分：第2、4、6、10题反向计分（6-原始分），其余正向。满分50分，得分越高表示情绪调节能力越强。

【社会维度】关系和情绪的关系

请根据最近两周的实际情况作答。

计分说明：1=完全不符合 2=较不符合 3=有点符合 4=较符合 5=完全符合

题号	题目	1	2	3	4	5
1	当我有困难时，我知道可以找谁求助	○	○	○	○	○

2	我在某些关系中会感到很疲惫，觉得付出太多	○	○	○	○	○
3	我能在需要时拒绝别人的请求	○	○	○	○	○
4	我有可以倾诉心里话的朋友或家人	○	○	○	○	○
5	维护人际关系让我感到有压力	○	○	○	○	○
6	我知道自己在关系中需要什么，也能说出来	○	○	○	○	○
7	当关系中出现冲突，我能控制住自己的情绪	○	○	○	○	○
8	我会主动维护对自己重要的关系	○	○	○	○	○

社会维度得分：第2、5题反向计分（6-原始分），其余正向。满分40分，得分越高表示社会维度情绪资源越丰富。

测评结果解读与报告建议

维度	得分区间	解读	推荐优先训练
生物维度	32-40分	身心联结良好，基础稳固	可直接进入进阶级
生物维度	20-31分	部分区域需要关注	从入门级开始系统训练
生物维度	20分以下	身心联结较弱，需重点关注	优先选择此维度，从入门级开始
心理维度	40-50分	情绪调节策略丰富灵活	可直接进入进阶级
心理维度	25-39分	有一定调节能力，仍有提升空间	从入门级开始
心理维度	25分以下	情绪调节较困难，需系统训练	优先选择此维度
社会维度	32-40分	社会支持系统健全	可直接进入进阶级
社会维度	20-31分	支持网络有待加强	从入门级开始
社会维度	20分以下	社会资源较匮乏，关系内耗较重	优先选择此维度

第二部分 训练模块全集

三大维度 × 十一个训练包，每包分入门 / 进阶 / 强化三级。

1 生物维度——身体是情绪的载体

①夜晚好好睡

原名：睡眠节律训练 | 理论依据：PSQI · Wirz-Justice昼夜节律研究

· 入门：睡眠日记 + 情绪关联记录，识别睡眠质量与次日情绪的对应规律

· 进阶：睡前情绪缓冲练习（写出明日待办 + 今日情绪清空）；刺激控制训练

· 强化：昼夜节律重建计划；跨周情绪-睡眠趋势分析报告

可量化指标：PSQI睡眠质量评分变化 | 训练时长：入门5分钟 / 进阶10分钟

匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）

原著：Buysse et al., 1989 | 对应维度：生物维度 · 睡眠节律训练

用途：评估过去一个月的睡眠质量，包含7个成分，总分0-21分，>5分提示睡眠质量较差。

以下问题关于您最近一个月的睡眠情况

题号	题目	填写
1	近一个月，晚上上床睡觉通常是____点	○
2	近一个月，从上床到入睡通常需要____分钟	○
3	近一个月，通常早上____点起床	○
4	近一个月，每夜通常实际睡眠____小时（不等于卧床时间）	○

近一个月，以下情况困扰您睡眠的频率：

题号	题目	无	＜1次/周	1-2次/周	≥3次/周
1	入睡困难（30分钟内不能入睡）	○	○	○	○
2	夜间易醒或早醒	○	○	○	○
3	夜间去厕所	○	○	○	○
4	呼吸不畅	○	○	○	○
5	咳嗽或鼾声高	○	○	○	○
6	感觉冷	○	○	○	○
7	感觉热	○	○	○	○
8	做噩梦	○	○	○	○
9	疼痛不适	○	○	○	○

10	其他影响睡眠的事情	○	○	○	○
11	近一个月，总体睡眠质量如何	○	○	○	○
12	近一个月，是否需要服药才能入睡	○	○	○	○
13	近一个月，开车、吃饭或参加社会活动时是否难以保持清醒	○	○	○	○
14	近一个月，是否感到精力不足或容易疲倦	○	○	○	○

PSQI计分：7个成分各0-3分，总分0-21。总分>5分建议重点关注睡眠训练模块。

②听懂身体说的话

原名：身体感知训练 | 理论依据：内感受研究（Craig & Garfinkel）· 情绪粒度理论（Barrett）

- 入门：身体部位情绪定位练习（「你的焦虑在哪里？胸口？肩膀？」）
- 进阶：身体扫描 + 情绪命名联动练习；躯体化信号识别清单
- 强化：建立个人躯体化情绪词典；身体信号作为情绪预警系统的训练

差异化说明：不是冥想放松内容，而是内感受能力的系统训练

③读懂你和食物的关系

原名：饮食-情绪联结训练 | 理论依据：情绪性进食研究（van Strien · DEBQ量表）

- 入门：情绪性进食识别测试；饥饿感 vs 情绪性饥饿的区分练习
- 进阶：饮食日记与情绪记录关联分析；触发情绪性进食的情境识别
- 强化：替代性应对策略建立（情绪性进食冲动来临时的行动菜单）

高频场景：压力暴食 / 减肥节食崩溃 / 用食物奖惩自己

场景 2 / 8

图书馆坐了三个小时，胃开始发出声音，你意识到午饭还没吃。

这次的进食信号来自？

- 身体发出的真实饥饿
- 情绪驱动的进食冲动
- 不确定

胃里的声音、距离上次进食很久——这些是身体真实的饥饿信号，吃东西完全没问题。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 3 / 8

考试前一晚，你反复刷手机，然后发现自己在找零食，其实刚吃完饭。

这次想吃的冲动是？

- 身体还需要能量
- 焦虑或无聊引发的
- 不确定

刚吃完饭就想找零食，通常是情绪在说话。焦虑会让人想通过咀嚼获得安慰感。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 4 / 8

你正在专心做一件事，突然脑子里冒出"好想吃薯片"的念头，停不下来。

这种"想吃"更像是？

- 身体需要补充能量
- 大脑在寻找分心的借口
- 真的不知道

专注时突然浮现的特定食物渴望，通常是大脑想逃避当前任务，不是真的饿。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 5 / 8

你妈妈说了一句让你很受伤的话，你坐在那里沉默，然后去翻柜子找吃的。

驱动这次进食的是？

- 身体饿了
- 情绪受伤需要安慰
- 两者都有

受伤时找食物，是寻求情绪安慰的本能反应。食物短时间内能带来安慰，这很正常。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 6 / 8

跑步结束，你感觉轻飘飘的，身体有点虚，想吃东西补充能量。

这次是哪种饥饿？

- 运动消耗后的真实需要
- 情绪波动引发的进食
- 不确定

运动后的虚弱感、轻飘飘——这是身体真实的能量需求，及时进食是对自己身体的照顾。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 7 / 8

你独自待在宿舍，什么都不想做，翻来覆去，最后打开外卖软件。

这次点外卖更多是？

- 身体真的需要吃东西
- 无聊或低落引发的
- 不确定

无聊和低落是情绪性进食最常见的触发器。那种空洞的感觉，让人很想用食物来填满它。

没有对错，只有觉察

下一题

场景 8 / 8

和朋友一起玩得很开心，大家说去吃夜宵，你其实不太饿，但很想一起去。

你的进食动机是？

- 身体真的需要食物
- 社交氛围和情绪驱动
- 两者都有一点

开心时跟朋友吃东西，有社交的成分也有情绪的成分——这没有问题，享受美好时光很重要。

没有对错，只有觉察

下一题

7 / 8

你对自己的进食模式很有觉察

触发器：人际冲突 · 触发器：焦虑/压力 · 触发器：注意力逃避 · 触发器：情绪受伤 · 触发器：无聊/低落 · 触发器：社交情绪

你已经能清楚地分辨情绪和饥饿了——这是很难得的能力，继续保持这份觉察。

你的进食触发模式

人际冲突 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

焦虑/压力 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

注意力逃避 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

情绪受伤 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

无聊/低落 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

社交情绪 — 这是你比较容易用食物处理情绪的时刻，下次出现时可以先暂停一下，问问自己真正需要的是什么

两种"想吃"，感觉不一样

先认识它们的区别，再用清单练习觉察

真正的饥饿

- 慢慢来，胃里有信号
- 吃什么都行，不挑剔
- 吃饱了自然会停
- 没有紧迫感，可以等一等
- 吃完感觉满足

情绪性饥饿

- 突然出现，很紧迫
- 只想吃某种特定食物
- 吃完了还想继续
- 等不了，现在就要
- 吃完可能会有罪恶感

下次"想吃"的时候，勾选你感受到的

如果是这些感觉——可能是真的饿了

- [ ] 胃里有点空，有轻微的饿感
- [ ] 上次吃东西已经好几个小时了
- [ ] 吃什么都可以，不特别挑
- [ ] 感觉有点没力气或注意力不集中

如果是这些感觉——可能是情绪在说话

- [ ] 刚刚发生了让我烦恼或难受的事
- [ ] 感到无聊、空洞，不知道干什么
- [ ] 只想吃某样东西，换别的不行
- [ ] 这种想吃的感觉很急，等不了
- [ ] 压力大、焦虑或者低落

如果发现是情绪性饥饿，可以试试

暂停10分钟 — 告诉自己"我可以先等10分钟"，情绪性饥饿通常会减弱

说出感受 — 问自己"我现在是什么感觉？"把情绪命名出来，有时候就够了

换一个动作 — 喝一杯水、走走、或者做一件5分钟内能完成的小事

如果还是想吃 — 没关系，允许自己吃，只是慢一点，一口一口地吃，感受每一口

④动一动，心也跟着松了

原名：运动-情绪联结训练 | 理论依据：运动心理学（Biddle）

· 入门：运动前后情绪值记录；发现哪种运动对自己情绪影响最大

- 进阶：制定情绪导向的运动触发规则（「焦虑超过7分时，走路20分钟」）
- 强化：建立个人运动-情绪响应档案；跨月趋势分析

注意：不做运动指导，聚焦感知与情绪联结，不与Keep重叠

2 心理维度——思维方式决定情绪走向

①换一个角度想想看

原名：认知重构训练 | 理论依据：CBT（Beck）· 苏格拉底式提问

- 入门：认知扭曲类型识别测试（灾难化 / 非黑即白 / 过度概括等10种）
- 进阶：思维记录表练习（情境→自动化思维→情绪→替代思维）
- 强化：核心信念识别与重构；建立个人认知扭曲预警清单

可量化指标：认知灵活性评分（CFQ改编）| 循证支持最充分的模块

②找到适合自己的方式

原名：情绪调节策略训练 | 理论依据：Gross过程模型 · ERQ · DERS

- 入门：个人惯用调节策略识别（认知重评 vs 表达抑制 vs 回避）
- 进阶：适应性策略扩充练习；情绪调节灵活性训练（根据情境选择策略）
- 强化：建立个人情绪调节策略库；高压情境下的策略切换练习

可量化指标：ERQ认知重评分量表得分变化

情绪调节问卷（ERQ）

原著：Gross & John, 2003 | 对应维度：心理维度 · 情绪调节策略训练

用途：测量认知重评和表达抑制两种策略的使用倾向。认知重评6题（1,3,5,7,8,10），表达抑制4题（2,4,6,9）。

计分：1=完全不同意 2 3 4=中立 5 6 7=完全同意

题号	题目	1	2	3	4	5	6	7
1	当我想要有更多的积极情绪时，我会改变对正在想的事情的看法	○	○	○	○	○	○	○
2	当我有消极情绪时，我会小心地不表达出来	○	○	○	○	○	○	○
3	当我想要有更少的消极情绪时，我会改变对正在想的事情的看法	○	○	○	○	○	○	○
4	当我有积极情绪时，我会小心地不表达出来	○	○	○	○	○	○	○
5		○	○	○	○	○	○	○

	当我碰到令人担忧的情况时，我会以一种让自己感觉更好的方式来看待							
6	我通过不表达情绪来控制自己的情绪	○	○	○	○	○	○	○
7	当我希望自己感觉更好时，我会改变自己对情境的思维方式	○	○	○	○	○	○	○
8	我通过改变自己看待情境的方式来控制情绪	○	○	○	○	○	○	○
9	当我有消极情绪时，我不会表达出来	○	○	○	○	○	○	○
10	当我想要有更少的消极情绪时，我改变了自己对于正在经历的情境的想法	○	○	○	○	○	○	○

认知重评分：第1,3,5,7,8,10题均分（范围1-7），分数越高说明越倾向于使用认知重评。

表达抑制分：第2,4,6,9题均分（范围1-7），分数越高说明越倾向于压抑情绪。

情绪调节困难量表（DERS-16）

原著：Gratz & Roemer, 2004；Bjureberg et al., 2016（简版） | 对应维度：心理维度 · 情绪调节策略训练

用途：评估情绪调节困难的程度，包含冲动性、目标导向行为、策略、不接纳四个维度。

计分：1=几乎从不（0-10%） 2=有时（11-35%） 3=大约一半时间（36-65%） 4=多数时候（66-90%） 5=几乎总是（91-100%）

题号	题目	1	2	3	4	5
1	当我心情不好时，我对自己的情绪感到愤怒	○	○	○	○	○
2	当我心情不好时，我感到难以集中注意力	○	○	○	○	○
3	当我心情不好时，我难以完成工作	○	○	○	○	○
4	当我心情不好时，我感到失控	○	○	○	○	○
5	当我心情不好时，我认为我会一直感觉那么糟糕	○	○	○	○	○
6	当我心情不好时，我感到情绪爆发	○	○	○	○	○
7	当我心情不好时，我为自己感受到这些情绪而感到羞愧	○	○	○	○	○
8	当我心情不好时，我知道我能找到方法最终让自己感觉好一些（反向）	○	○	○	○	○
9	当我心情不好时，我变得难以控制自己的行为	○	○	○	○	○

10	当我心情不好时，我认为沉浸在自己的情绪中是有道理的	○	○	○	○	○
11	当我心情不好时，我感到情绪很快就会失控	○	○	○	○	○
12	当我心情不好时，我仍然可以完成任务（反向）	○	○	○	○	○
13	当我心情不好时，我对自己的感受感到不好意思	○	○	○	○	○
14	当我心情不好时，我感到无法做任何事情	○	○	○	○	○
15	当我心情不好时，我相信我能保持沉着（反向）	○	○	○	○	○
16	当我心情不好时，我对自己的感受感到不对劲或错误	○	○	○	○	○

计分：第8、12、15题反向（6-原始分）。总分16-80，分数越高表示情绪调节困难程度越大。

③放下脑子里的那个声音

原名：反刍思维干预训练 | 理论依据：Nolen-Hoeksema · 反应风格理论 · RRS量表

- 入门：反刍思维识别测试；反刍（绕圈）vs 反思（前进）的区分
- 进阶：注意力转移练习；行为激活打破反刍循环
- 强化：建立个人反刍触发情境清单；预防性应对计划

高频场景：失恋后反复回想 / 考试失利后持续自责

反应风格量表（RRS-反刍分量表）

原著：Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991 | 对应维度：心理维度 · 反刍思维干预训练

用途：测量个体在抑郁情绪下的反刍反应倾向。

计分：1=从不 2=有时 3=经常 4=总是（请描述情绪低落时你通常会怎么做）

题号	题目	1	2	3	4
1	想「我为什么总是这样反应」	○	○	○	○
2	去一个人待着，思考你的感受	○	○	○	○
3	写下你的感受并进行分析	○	○	○	○
4	想「我无法集中注意力是因为我感觉这么糟糕」	○	○	○	○
5	想「我为什么有这些问题，别人没有」	○	○	○	○
6	分析你近期的事件，试图理解为什么情绪低落	○	○	○	○
7	想「发生了什么让我感觉这么糟」	○	○	○	○

8	想「我无法开始做任何事情了」	○	○	○	○
9	想「我为什么这么容易受不了事情」	○	○	○	○
10	分析你的性格，试图理解为什么情绪低落	○	○	○	○

总分10-40，分数越高表示反刍思维越强烈。>25分建议优先进行「放下脑子里的那个声音」训练包。

④下次会更从容

原名：心理弹性训练 | 理论依据：Bonanno韧性研究 · Lazarus压力-应对模型

· 入门：压力评价方式测试；应对资源盘点（我有哪些内外部资源）

· 进阶：次级评价能力训练（「我能处理这件事吗？」的系统性评估）

· 强化：建立个人应对资源库；压力预防性规划

支撑理论：Bandura自我效能——效能感提升来自真实的掌握性经验

3 社会维度——关系是情绪最大的变量

①知道自己需要什么

原名：人际边界训练 | 理论依据：DBT人际效能（Linehan）

· 入门：边界感评估测试；识别自己在哪类关系中边界最模糊

· 进阶：拒绝练习（情境模拟）；表达需求的语言训练；关系内耗识别清单

· 强化：建立个人边界规则系统；跨关系类型的边界一致性训练

高频场景：讨好型人格 / 室友冲突 / 家庭压力 / 不会拒绝别人

②找到可以依靠的人

原名：社会支持激活训练 | 理论依据：Cohen & Wills · 社会支持缓冲效应

· 入门：个人支持系统地图绘制（谁能帮我？各擅长什么？）

· 进阶：主动寻求支持的障碍识别；求助行为练习（从低风险到高风险情境）

· 强化：支持网络主动维护计划；识别并减少支持消耗型关系

高频场景：孤独感 / 不敢求助 / 感觉没人理解自己

社会支持评定量表（SSRS）

原著：肖水源，1994 | 对应维度：社会维度 · 社会支持激活训练

用途：评估个体获得社会支持的数量和质量，包含客观支持、主观支持、支持利用度三个维度。

第1题：您有多少关系密切、可以得到支持和帮助的朋友？（单选）

题号	题目
1	

第2-4题：以下情况您获得的帮助（单选）

题号	题目	无	极少	一般	全力支持
1	在您遇到急难情况时，曾经得到的经济支持和解决实际问题的帮助	○	○	○	○
2	在您遇到急难情况时，曾经得到的安慰和关心	○	○	○	○
3	在您遇到烦恼时，经常与您交谈，帮助您分析问题的人	○	○	○	○

第5题：遇到烦恼时您的倾诉方式（多选）

○ 从不向任何人倾诉（1分） ○ 只向关系极为密切的人（2分） ○ 如果朋友主动询问会说出来（3分） ○ 主动倾诉以求得支持（4分）

第6-7题：社会活动与团体参与

题号	题目	相互不了解	了解，但很少来往	有些来往	来往密切
1	您与邻居的关系	○	○	○	○
2	您与同事的关系	○	○	○	○

SSRS总分：各题得分加总，总分越高表示社会支持越好。<20分建议优先训练「找到可以依靠的人」模块。

③在关系里更自在

原名：关系情绪训练 | 理论依据：依恋理论（Bowlby）· 非暴力沟通（Rosenberg）

- 入门：依恋风格识别（安全 / 焦虑 / 回避 / 混乱）；了解自己在亲密关系中的情绪模式
- 进阶：非暴力沟通四要素练习（观察 / 感受 / 需要 / 请求）；冲突情境情绪调节
- 强化：依恋模式对情绪的长期影响分析；建立更安全的关系互动模式

高频场景：失恋 / 亲密关系冲突 / 友情破裂 / 家庭关系紧张

亲密关系体验量表（ECR-R简版）

原著：Fraley et al., 2000 | 对应维度：社会维度 · 关系情绪训练

用途：测量依恋焦虑和依恋回避两个维度，帮助用户了解自己在亲密关系中的情绪模式。

计分：1=完全不同意 2 3 4=中立 5 6 7=完全同意

题号	题目	1	2	3	4	5	6	7
1	我更喜欢不把感情建立在别人身上（回避）	○	○	○	○	○	○	○
2	我很担心被抛弃（焦虑）	○	○	○	○	○	○	○
3	我觉得与恋人亲密让我很不舒服（回避）	○	○	○	○	○	○	○
4	我很担心恋人不是真心爱我（焦虑）	○	○	○	○	○	○	○
5	我觉得和别人亲近很困难（回避）	○	○	○	○	○	○	○
6	我担心恋人不会像我在乎他们那样在乎我（焦虑）	○	○	○	○	○	○	○
7	依赖别人会让我很不舒服（回避）	○	○	○	○	○	○	○
8	我担心恋人最终会离开我（焦虑）	○	○	○	○	○	○	○

依恋回避分：奇数题均分。依恋焦虑分：偶数题均分。两者均分越高表示该维度越强，建议进行「在关系里更自在」训练包。

第三部分 六条情境化训练路径

用户按当下困扰选择入口，系统自动串联相关训练模块，形成专属路径。

情境入口（用户看到的）	路径说明	串联模块
心里有个地方空了	帮你慢慢把那个地方填回来，不是忘掉，是长出新的东西	放下脑子里的那个声音 → 找到可以依靠的人 → 在关系里更自在 → 换一个角度想想看
压力压着我喘不过气	不是让你不焦虑，是帮你在焦虑里还能稳稳地走	听懂身体说的话 → 换一个角度想想看 → 夜晚好好睡 → 下次会更从容
有些关系让我很累	累不是你的错，但你可以练出一点不被消耗的能力	知道自己需要什么 → 在关系里更自在（NVC）→ 找到适合自己的方式
我想在慌乱时也能稳住	稳，是可以练出来的	听懂身体说的话 → 找到适合自己的方式 → 换一个角度想想看 → 下次会更从容

最近提不起劲来	不用假装没事，先动一小步就好	放下脑子里的那个声音 → 动一动，心也跟着松了 → 找到可以依靠的人
我和食物的关系有点复杂	很多人都这样，不是意志力的问题	读懂你和食物的关系 → 找到适合自己的方式 → 听懂身体说的话

第四部分 训练即时情绪温度计

用途：每次训练开始前和结束后各填写一次，即时显示情绪变化——这是产品留存的核心机制，让用户直接感受到训练的效果。

设计原则：极简、快速（30秒内完成）、有画面感，不使用专业术语。

训练前测：现在的我

Q1 此刻你的情绪总体感受是？（滑动条的形式选择）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
很糟糕				还好					很好

Q2 此刻你最强烈的感受是？（单选）

○ 焦虑/紧张　○ 低落/难过　○ 愤怒/烦躁　○ 空洞/麻木　○ 疲惫/无力　○ 还好/平静　○ 其他：___

Q3 这种感受大概有多强烈？（滑动条的形式选择）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
很轻微				中等					非常强烈

Q4 今天是什么让你来训练的？（选填）

○ 学业压力　○ 人际关系　○ 失眠/身体不适　○ 情绪低落　○ 感情问题　○ 就是想练练　○ 其他：___

训练后测：现在的我（训练完成后立刻填写）

Q1 此刻你的情绪总体感受是？

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

很糟糕				还好					很好

Q2 和训练前比，你的感受有什么变化？

○ 好多了，轻松了很多　○ 好一点点　○ 没什么变化　○ 有点不一样，但说不清楚　○ 反而更难受了

Q3 这次训练里，什么让你印象深刻？（选填）

○ 某个练习让我停下来想了很久　○ 我发现了一些没注意到的事情　○ 有个方法我想试试　○ 没什么特别的　○ 其他：___

Q4 今天的训练完成了！给自己打个分：

1	2	3	4	5
我只是看了看	做了一半	基本完成	认真完成了	全力以赴！

产品展示用——变化计算公式

情绪变化值 = 训练后Q1得分 - 训练前Q1得分

显示文案示例：「你的情绪从 4 升到了 7，上升了 3 分 ↑」

若变化值≤0，显示：「今天可能有点难，没关系，你完成了训练，这就够了 ✓」

产品原型 领取人：彭诗婕 4月6日 8:00

五、理论基础 领取人：杨泓力 4月6日 8:00

产品核心理论基础

1、生物-心理-社会模型（Biopsychosocial Model, BPS Model）

1977年，美国罗彻斯特大学医学院精神病学和内科教授乔治·恩格尔（George L. Engel）正式提出了生物-心理-社会医学模式，核心主张是，为理解疾病的决定因素，以及达到合理的治疗和卫生保健模式，医学模式必须考虑到病人自身、病人生活于其中的环境、由社会设计来对付疾病的破坏作用的补充系统。现代的BPS模型强调生物、心理、社会三因素之间的双向互动，重视疾病的多元因果、健康的多维性和治疗的综合性。

BPS模型在精神医学领域获得了广泛的应用，并得到了诸多实证研究的支持，包括抑郁障碍的发生和维持的研究、躁郁症干预研究等都证实BPS模型的合理性和应用的有效性。在临床精神医学实践中，生物-心理-社会模式被转化为BPS Formulation（生物-心理-社会案例建构）这一操作性工具。Campbell和Rohrbaugh在《生物-心理-社会建构手册》中提出了结构化范式：生物层面包括人口学特征、躯体疾病、物质使用和遗传等要素；心理层面包括情绪认知反应、适应性/非适应性应对机制等要素；社会层面则包括文化特性、文化适应性等要素。通过这一工具，健康领域从业者可按照生物、心理、社会三个领域分别制定评估和干预计划，形成整合性的治疗方案。

本产品基于有大量实证的BPS模型开发，从生物-心理-社会三个维度铺开产品的辅助监控-有效干预的功能。

2、跨理论模型（Transtheoretical Model, TTM）

由美国心理学家普罗查斯卡（James O. Prochaska）和迪克莱门特（Carlo C. DiClemente）于1983年提出，又称行为变化阶段模型（Stages of Change Model），核心理念是行为改变不是一个“全或无”的二元事件（如“戒烟了”或“没戒烟”），而是一个动态的、螺旋式发展的过程。不同行为阶段的人有不同的心理特征和需求，因此需要采用不同的干预策略。之所以被称为“跨理论”模型，是因为它整合了心理治疗和行为科学领域中的多种理论，将不同理论体系中的核心概念（如决策平衡、自我效能、变化过程等）融合成一个统一的行为改变框架。

TTM模型由变化阶段基本模型和变化过程、决策平衡和自我效能三个核心构念组成，其中六阶段变化模型详细描述了个体非线性的行为变化时间线，包括前意向阶段（未意识到问题或否认需要改变）——意向阶段（意识到问题但仍充满矛盾）——准备阶段（计划采取行动和小尝试）——行动阶段（明确行为改变但模式未稳定）——维持阶段（新行为逐渐形成习惯）——结束阶段（改变融入人格，不再回到旧有模式）。个体可能在阶段之间循环往复，不一定都能成功进入下一阶段。

TTM目前广泛应用在成瘾行为控制和医疗依从性方面的研究中，在健康行为领域，如健康饮食、体重控制等计划上都能体现TTM的作用。在本产品中，TTM的指导意义在于对处于不同行为阶段的个体提供匹配的干预和训练策略。

3、压力-认知评价理论（Cognitive Appraisal Theory of Stress）

由美国心理学家理查德·拉扎勒斯（Richard S. Lazarus）与其同事苏珊·福尔克曼（Susan Folkman）于1984年正式提出。核心理念是心理压力并不源于环境刺激本身，而是个体与环境之间特定关系的产物。从环境中的压力源到人内心感受到的压力之间要经历压力源 → 初级评价 → 次级评价 → 应对 → 结果反馈 → 再评价的过程，在这个过程中每一次动态变化都会导致后续结果的不同。

不同用户在应对外在压力源时，所经历的认知应对和认知评价过程都不同，本产品基于压力-认知评价理论，根据用户面对环境的评价和应对模式为用户提供多种类型的干预和训练策略。

4、自我效能理论（Self-Efficacy Theory）

由美国著名心理学家阿尔伯特·班杜拉（Albert Bandura）于1977首次提出，是社会学习理论体系中的核心构成，核心观点是人的行为受“结果期望”与“效能期望”两种认知因素的共同影响。结果期望是人们对自己的某项行为多大程度会导致某种结果的推测，效能期望则是人们对自己多大程度成功进行某一行为的实施能力的判断。在人们获得了知识、技能，即有了够高的结果期望时，自我效能的高低就成为了行为的决定性因素。

基于自我效能理论，本产品在评估和训练的全过程都辅以实时的可视化反馈，以增强用户在训练过程中的效能感，推动用户坚持并完成最终的训练目标。

产品训练模块理论依据

1、生理/生物层面

a、情绪具身认知：情绪不是独立于身体的心理状态，而是与身体的感觉、动作、姿势、表情等生理过程密不可分。换言之，情绪体验本身就是身体变化的感受，而不是大脑对身体的“解读”。

b、睡眠-情绪关联：睡眠剥夺会损害情绪识别、增强负性情绪反应；而情绪困扰则通过认知和生理机制干扰正常睡眠。睡眠质量在负性生活事件与抑郁之间起中介作用——负性生活事件通过损害睡眠质量，进而加剧抑郁症状。

2、心理层面

a、认知-行为疗法（CBT）：心理困扰不是由事件本身直接引起的，而是由个体对事件的认知和解释方式所导致的。改变思维方式，就能改变情绪和行为。

b、正念技术（mindfulness）：可自主练习的身心改善技巧，旨在通过刻意的、不判断价值的方式，对当下生命经验保持时时刻刻的专注，改变个体与想法、情绪之间的关系，不是试图消除负面体验，而是学会以接纳、开放的态度与之共处。

c、反应风格理论：个体如何应对自己的抑郁情绪，即其反应风格决定了抑郁情绪的持续时间和严重程度。面对同样的情绪低落，不同的人采取不同的反应方式，会产生截然不同的后果。

3、社会层面

a、压力缓冲假说：社会支持与心理健康关系研究的基本理论框架，社会支持并非对所有人、在所有情境下都有同样的益处，它的主要作用不是直接让人更幸福，而是在个体面临压力时缓冲压力带来的负面影响。

b、非暴力沟通法：一种基于同理心和诚实表达的沟通模式。人与人之间的冲突和伤害，往往源于沟通方式中隐性的暴力——指责、嘲讽、否定、说教、随意评判。这些语言暴力虽不伤及身体，却会在情感和精神上造成深刻伤害。非暴力沟通法的目标不是赢得争论，而是在尊重与理解的基础上建立人与人之间的连接。Rosenberg将其称为“爱的语言”。

六、商业画布 领取人：王翠玲 4月6日 8:00

七、展望与启发 领取人：郑梁 4月6日 8:00