

Determinant of Example 6 3.2

Ryle Pratt

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & 2 & 4 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{R_1+R_2 \rightarrow R_4 \\ R_5-R_2 \rightarrow R_5}} \begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ -2 & 1 & 3 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1)(-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 & -4 \\ 3 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_1 + (-3)C_4 \rightarrow C_1} \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 & -2 \\ -8 & -1 & 2 & 3 \\ 13 & 5 & 6 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = (1)(-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} 8 & 1 & 3 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} \xrightarrow{R_1+R_2 \rightarrow R_1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 5 \\ -8 & -1 & 2 \\ 13 & 5 & 6 \end{vmatrix} = 5(-1)^{2+2} \begin{vmatrix} -8 & -1 \\ 13 & 5 \end{vmatrix}$$

$$= 5(1)(-27) = \boxed{-135}$$