ファイトケミカル分類表（2008年）

by Kazuhiko Shimojo/Japan Supplement Association

ファイトケミカル名	系統	グループ名	成分名	その成分を含む主な食品
ポリフェノール群（光合成によってできた、色素成分と渋み、苦味、えぐみの成分）	フラボノイド系（色素系成分）	フラバン類		天然にはほとんど存在しない
		カルコン類（赤色）	カルタミン	明日葉など
		フラバノン類（無色）		
		フラボン類(無色～黄色)	ルテリオン	シソ、春菊、セロリ、ピーマン　etc
		フラボノール類(淡黄色)	ケルセチン（黄色～褐色）	玉ねぎ、ブロッコリー　etc
			ルチン（黄褐色）	そば、アスパラガス　etc
		フラバノノール類(無色)		
		フラバノール(カテキン)類	カテキン（褐色）	緑茶、紅茶、ウーロン茶、カカオ　etc
		イソフラボン類(無色～淡黄色)	イソフラボン	大豆類　etc
		アントシアニジン類(赤紫～青、橙)	アントシアニン（赤紫色）	ブルーベリー、ぶどう、ナスの皮、,赤じそ、紫芋、あずき　etc
		スチルベノイド(無色)		
	フェノール酸系（色素以外の成分）	リグナン	セサミン、セサモリン、セサミノール配糖体	ゴマ
		クマリン		桜の葉、パセリ、ニンジン、モモ、藤袴(ふじばかま)
		シゲトン類	クルクミン	ターメリック（ウコン）、ショウガ
		クロロゲン酸	クロロゲン酸	コーヒー豆、ごぼう、さつま芋
		ロズマリン酸		シソ科（シソ、　レモンバーム、ローズマリー）
		エラグ酸	エラグ酸	イチゴ、ザクロ、リンゴ、赤ラズベリー、タラの実、栗、ユーカリ
		フェニルカルボン酸	タンニン類	
カロテノイド群（植物、動物、微生物などが持つ黄色、赤色、紫色などの色素および、辛味、苦味、香り成分の総称）	カロテン類（炭素と水素を含む化合物、アルコールに溶け、細胞膜に働く）		αカロテン	にんじんなど赤黄色野菜
			βカロテン	緑黄色野菜、にんじん、カボチャ、明日葉
			リコペン	トマト、スイカ、柿
	キサントフィル類（炭素と水素と酸素を含む化合物、アルコールには溶けず細胞内で働く）		ルテイン	とうもろこし、卵黄、ケール、ほうれん草、ブロッコリー、キャベツ、マリーゴールド、豆類
			ゼアキサンチン	トウモロコシの種子やほうれん草、卵黄
			アスタキサンチン	鮭、イクラ、エビ、カニ、オキアミなどの赤色の魚介類や海藻類
			カプサンチン	赤ピーマンや赤唐辛子などの色素
			クリプトキサンチン	みかんなどの柑橘類や、とうもろこし
			カプサイシン	唐辛子などの辛味成分
イオウ化合物群（にんにくやねぎなどの刺激のある香り成分の総称）	システインスルホキシド類		アリシン	にんにく
			メチルシステインスルホキシド	にんにく、玉ねぎ
			アリルメチルトリスルフィド	にんにく　玉葱
			アリルメルカプタン	にんにくなど
			ジアリルスルフィド	らっきょう、玉ねぎなど
			アリイン	にんにく
			アホエン	にんにく
			硫化アリル	らっきょう　にんにく　にら　ねぎ　玉葱の刺激臭や辛味成分、涙が出る成分
			シクロアリイン	玉ネギなど
	イソチオシアネート類		スルフォラファン	キャベツ　大根　ブロッコリーの新芽などの辛味成分
			アリルイソチオシアネート	ワサビの辛味の主成分
			イソチオシアネート	キャベツ・ダイコン・カブ・ブロッコリーなど
	ポリスルフィド類		レンチオニン	しいたけの匂い成分
その他	糖質関連物質		β-グルカン、ペクチン、フコイダン[フコイジン]	
	アミノ酸類		タウリン、グルタチオン	
	テルペン類（炭素を含み有機化合物とし存在）		リモネンなど	

植物系色素成分比較

フラボノイド	光合成によってできるため、比較的、植物の表面に存在する
	水溶性で、細胞内外の水分の多い部分や血液など、体液を守る
植物系カロテノイド	温度差の変化によって植物の中で合成されるため、表面から内部まで広く存在する
	油脂に溶ける性質があり、細胞膜や体内の脂質の部分を守る