

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|----|----|---|
| OAAS | Antiasth 225mg slow release | Aminophylline | X | X | 本藥為持續性藥效錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。院內另有 Theophylline 成份藥水 Centertheo 60mL (5.34mg/mL) liquid 及持續性藥效膠囊 Xanthium 200mg。 |
| OACC6 | ACC 600mg 發泡錠 | Acetylcysteine | O | X | 本藥為發泡錠，服用前將此發泡錠置玻璃容器中，加少量水 (60-100mL) 溶解、混勻後服用。 |
| OACZ | Acarizax 12 SQ-HDM (30 tablets/box) | Der pte extract + Der far extract | O | X | 本藥為舌下錠，目前相關臨床研究皆以舌下給藥，未經由舌下給藥的療效與安全性無法證實。仿單建議用法:打開阿克立舌下錠的包裝泡殼，應立即用乾燥的手指將口服錠放入舌下令其溶解。應避免在大約1分鐘內吞服。接下來5分鐘內不可以吃東西或喝飲料。 |
| OAFI | Afinitor 5mg | Everolimus | O | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。不可咀嚼或咬碎錠劑。對無法吞服錠劑的病人，應將本藥以輕輕攪拌的方式完全溶散(約7分鐘)於一杯水(約30毫升)中，並立即喝下。再於杯中倒入等量的水洗滌，然後將洗滌液全部喝掉，以確保服下完整劑量。 |
| OAGT | Alglutol 333mg delayed-release | Acamprosate | X | X | 本藥為腸溶錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OAKY | Akynzeo 300/0.5mg | Netupitant + Palonosetron | X | X | 本藥膠囊中含有三片小藥錠及一粒小膠囊，若病患有需要可以拆開後依序吞服。但不建議再將小藥錠及小膠囊拆開或磨粉。 |
| OALA | Alat 10mg | Nifedipine | O | X | 本藥為微粒膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的微粒研磨或壓碎。管灌時建議分次使用，注意沾黏及堵塞管路。 |
| OAMA | AmaRyl 2mg | Glimepiride | X | O | 仿單建議不可咀嚼或壓碎。廠商亦無相關安定性試驗。 |
| OAMIO | Cordarone 200mg | Amiodarone | O | O | 本藥具有苦味，不建議磨粉口服。 |
| OAND | Androcur 50mg | Cyproterone | O | O | 本藥為抗雄性激素製劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於小孩及懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OARH1 | Arheuma 10mg | Leflunomide | O | O | 本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。1. 喝足夠量的白開水將Arheuma錠整顆吞服，食物不會影響Leflunomide吸收。 |
| OARIE | Aricept 10mg orodispersible | Donepezil | O | X | 本藥為口崩錠，可溶水崩散後管灌。 |
| OARIM | Arimidex 1mg | Anastrozole | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|--------------------------------|--------------------------|----|----|---|
| OARO | Aromasin 25mg | Exemestane | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OASP | Aspirin protect 100mg | Acetylsalicylic Acid | X | X | 本藥為腸溶錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。 |
| OAT15 | Ativan 0.5mg | Lorazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OATM10 | apo-Atomoxetine 10mg | Atomoxetine | X | X | 本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。 |
| OATM25 | apo-ATOMOXETINE 25mg | Atomoxetine | X | X | 本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。 |
| OATM40 | 40mg APO-ATOMOXETINE | Atomoxetine | X | X | 本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。 |
| OATMX | APO-Atomoxetine 18mg | Atomoxetine | X | X | 本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。 |
| OATOZ | Atozet 10/20mg | Ezetimibe + Atorvastatin | X | X | 仿單載應將Atozet錠劑整粒吞服。不可將錠劑研碎、溶解或咀嚼使用。詢問廠商後回覆無破壞劑型後的安定性及有效性資料，且有效成分會被破壞失效並影響吸收。(The active ingredients can break down in the mouth and lose efficacy. This could also impair absorption.) |
| OAVE | Avelox 400mg | Moxifloxacin | X | X | 仿單建議應與水整顆吞服。 |
| OBET5 | Betmiga 50mg prolonged-release | Mirabegron | X | X | 本藥為持續性藥效錠，服用時應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。 |
| OBIN | Binosto effervescent 70mg | Alendronate | O | X | 本藥為發泡錠，以120mL常溫白開水配製成溶液，發泡停止後，再攪拌10秒鐘後飲盡。但本藥飲用後需保持上半身直立至少30分鐘。 |
| OBMZ | Bromazin 3mg | Bromazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OBNP | BNG-1 powder 3gm/pack | 當歸，黃芩，紅耆，天竺黃，人參，柴胡，黃連，甘草 | O | X | 本品為顆粒粉劑，請於飯前一小時或飯後兩小時以溫開水服用。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|--|---|----|----|--|
| OBOW | Bowklean powder 16.2gm · 2pk/box | Picosulfate + MgO + Citric acid | O | X | 本品為粉劑，每包須以150毫升常溫冷水配製成溶液，攪拌5分鐘溶解後口服投予，並飲用足量流質液體。 |
| OBRO | Broen-C 20000IU/20mg | Bromelain + L-Cysteine | X | X | 本藥為腸溶錠，請整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。對鳳梨過敏者禁用 |
| OBRVA | Briviact 100mg | Brivaracetam | O | O | 仿單不建議磨粉:因藥物磨粉後有苦味(廠商回覆2022.02.15) |
| OCAP5 | Calveda 500mg | Capecitabine | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OCAS | Casodex 50mg | Bicalutamide | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OCELL | Cellcept 250mg | Mycophenolate mofetil | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。 |
| OCER4 | Ceretal S.C. 400mg | Pentoxifylline | X | X | 本藥為持續性糖衣錠，應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。 |
| OCHEY | Chemo young 4mL/bottle (14bottles/box) | Soybean and probiotics fermentation product | O | X | 本品為藥水劑型，每4毫升，以100毫升溫開水稀釋後空腹服用。 |
| OCHL5 | Chlordiazepoxide 5mg | Chlordiazepoxide | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OCIA5 | Cialis 5mg (28 tablets/box) | Tadalafil | X | X | 仿單建議本藥需整顆服用。 |
| OCLOM | Clomiphene 50mg | Clomiphene | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。 |
| OCLOM5 | Clomiphene 50mg (PEILI) | Clomiphene | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。 |
| OCOD | Co-Diovan 80/12.5mg | Valsartan + Hydrochlorothiazide | O | X | 仿單建議本藥不可分割。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|-------------------------------------|------------------------|----|----|--|
| OCODI | Codeine 30mg | Codeine | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 The FDA is currently investigating the safety of using codeine-containing medicines to treat coughs and colds in children younger than 18 years. |
| OCOF1 | Cofarin 1mg | Warfarin | O | O | 本藥與feeding nutrition有交互作用而影響吸收，可磨粉但需與nutrition間隔1小時，並密切監測INR值。 |
| OCOF5 | COFARIN 5mg | Warfarin | O | O | 本藥與feeding nutrition有交互作用而影響吸收，可磨粉但需與nutrition間隔1小時，並密切監測INR值。 |
| OCON2 | Concerta ER 27mg | Methylphenidate | X | X | 本藥為長效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。 |
| OCON3 | CONCERTA 36mg | Methylphenidate | X | X | 本藥為長效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。 |
| OCONT | Contrave 8/90mg extended-release | Naltrexone + Bupropion | X | X | 仿單建議本藥應整顆吞服，勿剝半、咀嚼或壓碎。1. 請提醒病患近兩週有使用類鴉片止痛藥或抗鬱藥物請主動告知醫師。2. 不可搭配高脂餐點併用。 |
| OCRA5 | Cravit F.C. 500mg | Levofloxacin | O | O | 仿單建議須整粒吞服，可剝半但不要咀嚼或壓碎。因廠商未有相關安定性及療效數據，若有磨粉需求請密切監測病患臨床反應。 |
| OCYM | Cymbalta 30mg | Duloxetine | O | X | 仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或拆開膠囊。 |
| ODEP2 | Depakine 200mg | Valproate Sodium | X | X | 仿單建議應整錠吞服，不可咬碎。院內備有同成份藥水Depakin solution可供無法吞服病患使用。 |
| ODEP5 | DEPAKINE 500mg | Valproate Sodium | X | X | 本藥為持續性藥效錠應整錠吞服，不可咬碎。院內備有同成份藥水Depakin solution可供無法吞服病患使用。 |
| ODET4 | DETRUSITOL SR 4mg prolonged-release | Tolterodine | X | X | 本藥為持續釋放膠囊，需整顆吞服，勿拆開膠囊、咬碎、壓碎、剝半或磨粉。廠商未能提供破壞劑型後的有效性及安定性。 |
| ODEXI | Dexilant delay-release 60mg | Dexlansoprazole | O | X | 本藥為緩釋膠囊，需整顆吞服，勿咬碎、壓碎、剝半或磨粉。廠商提供之建議:對於不會吞膠囊之患者，可打開緩釋膠囊，並將藥粒灑在一湯匙蘋果醬(果泥)上，立刻吞服，不可咀嚼藥粉顆粒。對於管灌的病人，可打開緩釋膠囊，並將藥粉顆粒加入20 mL冷開水中，輕搖並反抽至針筒，打入鼻胃管中。(不要使藥粒溶解) |
| ODIA2 | 當立平Diapin 2mg | Diazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|----------------------------|--|----|----|---|
| ODIAN | Diane 35 (21 tablets/box) | Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| ODIC1 | Diclofenac 100mg S.R. F.C. | Diclofenac | X | X | 本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。若有磨粉管灌需求可改用院內同成分Cataflam 25mg。 |
| ODIL2 | DilTELAN 120mg | Diltiazem | X | X | 本藥為持續性膠囊應整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。若有磨粉管灌需求可改用院內同成分Herbesser 30mg。 |
| ODOX4 | Doxaben XL 4mg | Doxazosin | X | X | 本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。若有磨粉管灌需求可改用院內其它Alpha-Blockers。 |
| ODUO | Duodart 0.5/0.4mg | Dutasteride + Tamsulosin | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。 |
| ODUP1 | Duphaston 10mg | Dydrogesterone | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。 |
| ODUX | Duxetine 30mg | Duloxetine | X | X | 仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或拆開膠囊。 |
| OEFE7 | Effexor XR 75mg | Venlafaxine | O | X | 本藥為持續性藥效膠囊應整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。若有管灌需求可拆開膠囊後使用，但不可將膠囊內微粒壓碎或磨粉。 |
| OEND | Endoxan 50mg | Cyclophosphamide | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OEPC | Epclusa 400/100mg | Sofosbuvir + Velpatasvir | X | O | 由於本品帶有苦味，因此建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用。 |
| OEST | Estrade 2mg | Estradiol Valerate | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OEST6 | Estromon 0.625mg | Conjugated Estrogen | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OEUR | Eurodin 2mg | Estazolam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|---|---------------------------------|----|----|---|
| OEVI6 | Evista 60mg | Raloxifene | O | O | 仿單無相關註記，詢問廠商不建議破壞劑型因無相關試驗可供參考。 |
| OFAL | Fallep 2mg | Flunitrazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OFEM | Femara 2.5mg | Letrozole | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OFLUP | FluPINE 0.25mg | Fludiazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OFYC | Fycompa 2mg | Perampanel | X | X | 仿單建議應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎 |
| OGES | Gestrin 2.5mg (8 capsules/box) | Gestrinone | O | X | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OGIK | GI Klean Powder | Polyethylene Glycol 3350 | O | X | 本品為粉劑，每包須以1000毫升冷開水配製成溶液後，調勻後口服使用。 |
| OHAR4 | Harnalidge OCAS 0.4mg prolonged release | Tamsulosin | X | X | 本藥為持續性藥效膜衣錠應整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。 |
| OIBR | IBRANCE 125mg | Palbociclib | X | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整顆吞服，勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。 |
| OIMI5 | Imigran FDT 50mg | Sumatriptan | O | X | 本藥為速溶錠，仿單建議須整粒以水吞服，不要咀嚼。 |
| OIMOV | Imovane 7.5mg | Zopiclone | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OIMU | Imuran 50mg | Azathioprine | O | O | 本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OINF | Infloran 250mg (20 capsules/box) | Lactobacillus + Bifidobacterium | O | X | 本藥成份不宜遇熱，故不宜使用磨粉分包機。可自行拆膠囊使用。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|-----------------------------|---|----|----|---|
| OINV | Invega 3mg extended release | Paliperidone | X | X | 本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OIRE | Iressa 250mg | Gefitinib | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OISO2 | Isoptin SR 240mg | Verapamil | X | X | 本藥為持續性膜衣錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OJOH | Johnlax 5mg | Bisacodyl | X | X | 本藥為腸溶糖衣錠。須整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。 |
| OKCIT | K-citrate granules 5gm | Potassium Citrate Monohydrate + Citric Acid | O | X | 本品為顆粒粉劑，每包請以180毫升以上冷開水或果汁調勻後再服用。 |
| OKEP | Keppra 500mg | Levetiracetam | X | O | 仿單建議無法吞服藥錠之病人，應使用Levetiracetam口服液劑。本院臨採清單包含Keppra solution。 |
| OKES | Ketosteril | Amino Acids + Ketoanalogues | O | O | 由於本品帶有臭味，若使用磨粉分包機會汙染難以清潔。廠商亦無相關資料。因此建議不要將藥錠磨粉使用。 |
| OKET | Keto 10mg | Ketorolac | O | X | 本藥為腸溶膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的腸溶微粒研磨或壓碎。 |
| OKIS | Kisqali 200mg | Ribociclib | X | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整顆吞服，勿咬嚼或壓碎。 |
| OKLA5X | Klaricid XL 500mg | Clarithromycin | X | X | 本藥為持續性藥效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。本藥建議隨餐使用。 |
| OKLU | Kludone MR 60mg | Gliclazide | X | X | 本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OLAMC | Lamictal 50mg | Lamotrigine | X | O | 仿單建議須整粒吞服，不要咀嚼。因廠商無相關安定性測試。 |
| OLEEV | Leevk 100mg | Imatinib | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|-------------------------------|--------------------------------|----|----|---|
| OLEN | Lendormin 0.25mg | Brotizolam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OLEV7 | Levofloxacin 750mg (政府提供) | Levofloxacin | O | O | 仿單建議須整粒吞服，可剝半但不要咀嚼或壓碎。因廠商未有相關安定性及療效數據，若有磨粉需求請密切監測病患臨床反應。 |
| OLEX3 | Lexotan 3mg | Bromazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OLINI | Linicor F.C.T. 500/20mg | Niacin + Lovastatin | X | X | 本藥為Lovastatin加緩釋劑型Niacin，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。無法吞服病患可改用院內同成份一般劑型藥物。 |
| OLIV | Livial 2.5mg (28 tablets/box) | Tibolone | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。 |
| OLONS | Lonsurf 20mg | Trifluridine + Tipiracil | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OLOR | Lorapseudo SR 10/240mg | Loratadine + Pseudoephedrine | X | X | 本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OLOW | Lowen 0.5mg | Lorazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OLOX | Loxol SR 75mg | Ambroxol | X | X | 本藥為長效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。院內另有同成份Musco solution可使用。 |
| OMACA | Macalol 0.25mcg | 1, 25-Dihydroxycholecalciferol | O | X | 本藥為軟膠囊應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎，無法吞服患者可以溫水溶解後服用。 |
| OMELE | Meletin 100mg | Mexiletine | X | X | 仿單建議本藥應併用足量液體且整粒吞服。 |
| OMERC | Mercilon (21 tablets/box) | Desogestrel + Ethinylestradiol | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OMET1 | apo-Methylphenidate 10mg | Methylphenidate | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|--------------------------------------|-----------------|----|----|--|
| OMEZA | MezaVant XL 1200mg prolonged release | Mesalazine | X | X | 本藥為長效腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可咬碎或咀嚼。無法吞服患者可考慮使用同成份Colasa enema 2gm/100mL。 |
| OMIN6 | Minirin Melt 60mcg | Desmopressin | O | X | 本藥為凍晶口溶錠。可溶水崩解後管灌。 |
| OMIRA | MiraPex 0.375mg prolonged-release | Pramipexole | X | X | 本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| OMIRT | MirTapine 30mg orally disintegrating | Mirtazapine | O | X | 本藥為口溶錠，可溶水崩散後服用。 |
| OMIRT3 | Apa-Mirtazapine O.D.T. 30mg | Mirtazapine | O | X | 本藥為口溶錠。可溶水崩解後管灌。 |
| OMOR1 | Morphine 15mg | Morphine | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OMTD22 | Methydur 22mg sustained release | Methylphenidate | X | X | 本藥為長效錠，請整粒吞服，不可剝半或磨粉。 |
| OMTX | Methotrexate 2.5mg | Methotrexate | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| ONAT | Natrilix SR 1.5mg | Indapamide | X | X | 本藥為持續性藥效膜衣錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| ONAV2 | Navelbine 20mg (臨採) | Vinorelbine | X | X | 本藥為軟膠囊需以水整顆吞服。 |
| ONAV3 | NAVELBINE 30mg | Vinorelbine | X | X | 本藥為軟膠囊需以水整顆吞服。 |
| ONEOT | Neotigason 10mg | Acitretin | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。 |
| ONER | Nerlynx 40 mg (180 tablets/bot) | Neratinib | X | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或撥半。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|----|----|---|
| ONEX | Nexium 40mg (耐適恩) | Esomeprazole | O | X | 本錠劑應整粒以液體吞服，不可嚼破或壓破本錠劑。無法吞服的病人，可將藥錠置入半杯非碳酸類的水中，攪拌直到藥錠崩散，將水連同小藥球喝下或管灌。再將半杯水加入杯中沖洗並服用，但小藥球不可咬碎或壓碎。 |
| ONIF | Nifedipine S.R.F.C. 30mg | Nifedipine | X | X | 本藥為持續性膜衣錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。 |
| ONTG6 | Nitrostat (NTG) 0.6mg | Nitroglycerin | O | X | 本藥為舌下錠，可直接置於舌下使用。 |
| ONUB | Nubeqa F.C. 300mg | Darolutamide | X | X | 本藥為癌症用藥，藥錠需整顆吞服，不可破壞原劑型。 |
| ONUM | Numient 48.75/195mg extended-release | Carbidopa + Levodopa | O | X | 本藥為緩釋膠囊，請整粒吞服，不可剝半或磨粉。1. 針對吞嚥膠囊有困難的患者，可以小心打開膠囊，將完整內容物撒在少量(例如2茶匙)軟性食物上，例如蘋果醬、優格或布丁，藥品/食物混合物應立即全部吞嚥完畢，不經咀嚼，混和後應立刻服用。2. 高脂高熱量飲食會使吸收延緩兩小時。服用時不應同時攝取高蛋白質飲食，因其可能降低 levodopa 吸收而削弱臨床反應。3. 藥品不應經過加熱或加入熱食服用。4. 含有硫酸亞鐵的藥品應與 levodopa/carbidopa 分開服用，並且盡可能拉長服藥的間隔時間。 |
| OOFÉ | Ofev 150mg | Nintedanib | X | X | 本藥為軟膠囊應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。另本藥味道極苦，且無咬嚼或壓碎軟膠囊的相關藥動學資料。 |
| OOKW | OKWE 20mg | Omeprazole | O | X | 本錠劑應整粒以液體吞服，不可嚼破或壓破。若需拆膠囊請勿將膠囊中的小藥球咬碎或壓碎。 |
| OOMA | Omacor Soft 1000mg | Omega-3- Acid Ethyl Esters 90 | O | X | 本藥為軟膠囊，請整粒吞服，不可切開。 |
| OOXB | Oxbu 5mg extended-release | Oxybutynin | X | X | 本藥為緩釋錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。 |
| OPAXS1 | Paxlovid (絕對自費) 300/100mg · 10 doses | Nirmatrelvir + Ritonavir | O | X | 仿單建議應整粒吞服。不得咀嚼、破壞或壓碎錠劑。 |
| OPHE | Phenobarbital 30mg | Phenobarbital | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OPHY | Phyllocontin 225mg | Aminophylline | X | X | 本藥為持續性藥效錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。院內另有 Theophylline 成份藥水 Centertheo 60mL (5.34mg/mL) liquid 及持續性藥效膠囊 Xanthium 200mg。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|-------------------------------|-----------------------------|----|----|---|
| OPRAD | Pradaxa 110mg | Dabigatran | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼或打開膠囊。若破壞劑型會造成生體可用率增加1.4倍而增加出血風險。 |
| OPRI | Priligy 30mg (3 tablets/box) | Dapoxetine | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼或剝半。廠商亦無相關的安定性及療效數據。 |
| OPRO5 | Provera 5mg | Medroxyprogesterone | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OPROP | Propecia 1mg (28 tablets/box) | Finasteride | X | X | 本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎。本藥僅用於男性，具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。錠劑覆有膜衣，若無破損可防止平常觸摸時直接接觸有效成份。 |
| OPROT | Protase 280mg enteric coated | Pancrelipase | O | X | 本藥為腸溶微粒膠囊，應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。無法吞服病患可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的腸溶微粒研磨或壓碎。 |
| OPRS | Proscar 5mg | Finasteride | O | O | 本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。錠劑覆有膜衣，若無破損可防止平常觸摸時直接接觸有效成份。 |
| OQTE | Qtern 5/10mg | Saxagliptin + Dapagliflozin | X | X | 仿單建議不可剝半磨粉。(經詢問廠商本藥無特殊控釋或緩釋劑型，但無相關試驗佐證磨粉的藥動或安全性。2022/01/02) |
| ORANC | Rancad 500mg extended release | Ranolazine | X | X | 本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。 |
| ORIF5 | Rifampicin 300mg (立汎黴素) | Rifampicin | O | X | 本藥膠囊內藥粉易汙染磨粉分包機，請自行磨粉。 |
| ORIT2 | Ritalin LA 20mg | Methylphenidate | X | X | 本藥為持續性藥效膠囊，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。 |
| ORIV5 | Rivotril 0.5mg | Clonazepam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OROA | Roaccutane 10mg | Isotretinoin | X | X | 本藥為軟膠囊應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。 |
| ORYB | Rybelsus 7mg | Semaglutide | X | X | 仿單建議整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼，因為尚不清楚是否會影響 semaglutide 的吸收。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|-------|-------------------------------|---------------------------------|----|----|---|
| OSAL5 | Salazine 500mg | Sulfasalazine | X | X | 本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可咬碎或咀嚼。 |
| OSAN1 | Sandimmun Neoral 100mg | Ciclosporin | X | X | 本藥軟膠囊，應整粒吞服，切勿咀嚼或壓碎。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。 |
| OSERO | Seroxat 20mg | Paroxetine | X | O | 本品錠劑應直接吞服，請勿咀嚼。建議一天投予一次，於晨間與食物併服。 |
| OSIN | Singulair Chewable 5mg | Montelukast | O | O | 本藥為咀嚼錠，咬碎後吞服即可。 |
| OSINM | Sinemet 25/100mg | Carbidopa + Levodopa | O | O | 本藥錠劑上的刻痕，是便於剝半吞嚥，而非用於分成相等的劑量。錠劑經剝半後，應服用完整劑量。 |
| OSQL2 | Smokquit 2mg (24 tablets/box) | Nicotine | X | X | 本藥為口含錠，不可咀嚼或吞服。服藥後將口含錠含在口腔兩側移動，持續20-30分鐘直到完全溶解。 |
| OSQL4 | SMOKQUIT 4mg (24 tablets/box) | Nicotine | X | X | 本藥為口含錠，不可咀嚼或吞服。服藥後將口含錠含在口腔兩側移動，持續20-30分鐘直到完全溶解。 |
| OSTI | Stilnox 10mg | Zolpidem | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OSTV | Stivarga 40mg (28#/Bot) | Regorafenib | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OSUB | Suboxone 8/2mg | Buprenorphine + Naloxone | O | X | 本藥為舌下錠，可直接置於病患舌下。 |
| OSYN3 | Syndoman 30mg | Flurazepam | O | X | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OSYNS | Synseq (28 tablets/box) | Estradiol + Medroxyprogesterone | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OTAI | Taigexyn 250mg | Nemonoxacin | X | X | 仿單建議本藥以水整粒吞服。1. 勿與鐵鹽、鈣片、制酸劑、含咖啡因及乳製品食物併服 2. 重症肌無力患者不建議使用 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|----|----|--|
| OTAK | Takepron OD 30mg | Lansoprazole | O | X | 本藥為口溶錠。可溶水崩解後管灌。 |
| OTAM | Nolvadex 10mg | Tamoxifen | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OTAR1 | Tarceva 150mg | Erlotinib | O | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OTEGCR | Tegretol CR 200mg | Carbamazepine | X | X | 本藥為長效錠，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。 |
| OTRCT | Traceton 37.5/325mg | Tramadol + Acetaminophen | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OTRO | Trokendi XR 50mg | Topiramate | O | X | 本藥為膠囊請整顆吞服，請勿灑於食物上、咀嚼或咬碎。本藥由三種不同釋放時間的控釋微粒組成，因此管灌者可以拆膠囊使用，但不建議拆膠囊後分次服藥。 |
| OTS1 | TS-1 20mg | Tegafur + Gimeracil + Oteracil K | O | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OUFU | UFUR 100/224mg | Tegafur + Uracil | O | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OUTRO | Utrogestan 100mg | Progesterone | X | X | 軟膠囊不可剝半或磨粉。無法吞服病患可以溫水溶解後服用。 |
| OVEN2 | Venina 1/2.5mg (28 tablets/pack) | Estradiol + Medroxyprogesterone | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |
| OVERZ | Verzenio 150mg | Abemaciclib | X | X | 仿單建議病人應吞服整顆錠劑，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。如果錠劑破裂、裂開或不完整，請病人不要服用。 |
| OVESI | Vesicare 5mg | Solifenacin | X | X | 仿單建議本藥需整顆以水吞服。 |
| OVGR1 | VIAGRA 100mg (4 tablets/box) | Sildenafil | X | O | 本藥不應用於管灌病患。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|--------|--|---------------------------------|----|----|---|
| OVGRO | Viagra ODT 50mg (4 tablets/box) | Sildenafil | X | X | 本藥為口溶錠，可置於舌上溶解後以水吞服或不以水直接吞服。本藥也不應用於管灌病患。 |
| OVIAS | Viartiril-S powder 1.5gm | Glucosamine Sulphate | O | X | 本品為粉劑，請以100毫升白開水，混和均勻後服用。 |
| OVIS2 | Visanne 2mg | Dienogest | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。 Oral: Administer preferably at the same time each day with liquid and without regard to meals. Tablets should be taken continuously regardless of any vaginal bleeding. If vomiting and/or diarrhea occur within 3 to 4 hours of administration, repeat dose. |
| OVOC | Vocinti 20mg | Vonoprazan | X | O | 仿單未有管灌磨粉相關註記，經詢問廠商不建議管灌磨粉，因未有相關試驗。(2022/10/11) |
| OWELX | Wellbutrin XL 150mg | Bupropion | X | X | 本藥為持續性藥效錠，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。 |
| OXAN | Xanax 0.5mg | Alprazolam | O | O | 為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 |
| OXANT | Xanthium 200mg | Theophylline | O | X | 本藥為腸溶膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的腸溶微粒研磨或壓碎。院內另有 Theophylline 成份藥水 Centertheo 60mL (5.34mg/mL) liquid。 |
| OXELJ | Xeljanz 5mg | Tofacitinib | O | O | 本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OXEN8 | Xenical 120mg (84 capsules/box) | Orlistat | X | X | 原廠英文仿單：搭配一杯白開水吞服膠囊，不可打開膠囊，或服用已破損的膠囊。 |
| OXIG | Xigduo XR 10mg/1000mg Extended-Release | Dapagliflozin + Metformin | X | X | 本藥為持續性藥效錠，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。無法吞服病患可改用院內同成份一般劑型藥物。 |
| OXTA | Xtandi 40mg (capsule) | Enzalutamide | X | X | 本藥為軟膠囊，需應整粒吞服，勿咀嚼、溶解或打開。 |
| OXTA40 | 膜衣錠 Xtandi 40mg (tablet) | Enzalutamide | X | O | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。 |
| OYAZ | YAZ 悅姿錠 (28 tablets/box) | Drospirenone + Ethinylestradiol | O | O | 本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。 |

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新：2024/08/06

| 藥品代碼 | 商品英文名稱 | 成份名 | 管灌 | 剝半 | 不可磨粉原因與建議 |
|------|--------------|-------------|----|----|--|
| OZCO | Zcough 100mg | Benzonatate | X | X | 本藥為軟膠囊，仿單建議應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。 |
| OZYT | Zytiga 250mg | Abiraterone | X | X | 本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或撥半。本藥需空腹服用，服用前2小時和後1小時不要進食。 |