

處方集附錄十 藥品開瓶後有效期限

通則

1. 住院單一劑量系統所調劑配送之藥品應依照藥劑科標示，以提供特定病人專用為原則，不可共用。
2. 多包裝、多次使用的藥品，開封後應儲存於原瓶，不得分裝儲存，並於瓶身標明開封日期及使用期限，固體製劑使用期限不可超過原廠標示效期的 25%，並以 6 個月 為限。
3. 安瓿 (ampoule) 包裝之單劑量注射劑，開封後須立即使用，不可保存。
4. 小瓶 (vial) 包裝之單劑量注射劑，除有特殊規定，應於開封或稀釋後 24 小時 內使用。(相關資訊，請參考處方集附錄十一：臺安醫院抗生素注射劑使用方法)。
5. 一般口服水劑開封後，若未特別規定保存期限者，於室溫下最多保存 14 天。
6. 室溫保存之眼藥水、眼藥膏及一般外用藥品，除有特殊規定，開封後最多保存 28 天。
7. 藥劑科自行配製、分裝之調製藥品，有效期限依照藥劑科標示。
8. 藥品須儲存於合適條件：室溫指 15-25°C；冷藏為 2~8°C。
9. 藥品使用前應檢視其外觀，若有變色、沉澱應丟棄，不可使用。
10. 外用消毒液開封後之儲存條件與效期規定，需依感染管制單位規定。

特定藥品

其它特定藥品開封後之儲存條件與效期規定，請依照以下表列：

一、 多包裝針劑

藥名		開瓶後 儲存條件	開瓶後 有效期限
疫苗	BCG vaccine inj 0.5mg/mL (卡介苗疫苗)	冷藏	2 小時
	JEV vaccine inj 0.5-1 mL/dose (日本腦炎疫苗)	冷藏	24 小時
胰島素	Levemir FlexPen 100 Unit/mL, 3mL	室溫	42 天
	NovoMix 30 FlexPen 100U/mL, 3mL	室溫	28 天
	NOVOMIX 50 FlexPen 100 Unit/mL, 3mL	室溫	28 天
	NovoRapid FlexPen 100U/mL, 3mL	室溫	28 天
	Toujeo inj 300 Unit/mL, 1.5mL Pen	室溫	28 天

藥名		開瓶後 儲存條件	開瓶後 有效期限
其他藥品	Addaven inj 10mL (trace elements, adults)	冷藏	14 天
	Alvosteo inj 20mcg/80microliters, 2.4mL	冷藏	28 天
	Botox 100U	冷藏	3 天
	Forteo 750mcg/3mL, 28 doses	冷藏	28 天
	Fragmin 10000 IU/4mL	冷藏	24 小時
	Hepac inj 25KIU/5mL	冷藏	14 天
	Ketalar inj 50mg/mL, 10mL	室溫	限當次使用。 未用完請丟棄
	Lidocaine inj 20mg/mL, 20mL	室溫	24 小時
	Lidophrine inj (2%+E) 20mL	室溫	2 天
	Lyo-Povigent inj 4mL (multivitamin)	冷藏	3 天
	Ozempic inj 2mg/1.5mL	室溫/冷藏	6 週
	OZEMPIC inj 4mg/3mL	室溫/冷藏	6 週
	Peditrace inj 10mL (trace elements, pediatric)	冷藏	14 天
	PPD 2TU/0.1mL/dose (Tuberculin) , 1.5mL	冷藏	24 小時
	Saxenda inj 18mg/3mL	室溫/冷藏	1 個月
	Xylocaine 2% inj 20mL	室溫	3 天

二、多包裝口服藥

藥名	開瓶後 儲存條件	開瓶後 有效期限
Amolin suspension 25mg/mL, 60mL	冷藏	7 天
Augmentin syrup 457mg/5mL, 35mL	冷藏	7 天
Depakin solution 200mg/mL, 40 mL	室溫	3 個月
Duphalac solution 500mL(667mg/mL)	室溫	30 天
Ferrum hausmann drops 30mL	室溫	30 天
Fumide solution 10mg/mL, 120mL	室溫	30 天

藥名	開瓶後 儲存條件	開瓶後 有效期限
Haldomin oral solution 2mg/mL, 15mL	室溫	3 個月
Megatus suspension 40mg/mL, 120mL	室溫	30 天
Mycostatin suspension 100000 IU/mL	室溫	7 天
Nitrostat (NTG) 0.6mg	室溫	6 個月
Oseltamivir Phosphate 6mg/mL, 60mL oral suspension	冷藏	17 天
	室溫	10 天
Piracetam soln 200mg/mL, 200mL	室溫	3 個月
Pushigon oral solution 2mg/mL, 60mL	冷藏	1 個月
Risperdal solution 1mg/mL, 30mL	室溫	3 個月
Soonmelt syrup 31.25mg/mL, 100mL	冷藏	7 天
Ulexin suspension 25mg/mL, 60mL	冷藏	7 天
Zithromax suspension 200mg/5mL, 15mL	室溫	5 天

三、 多包裝外用藥

藥名	開瓶後 儲存條件	開瓶後 有效期限
Alcaine Eye Drop 15mL (表面麻醉劑)	冷藏	28 天
	室溫	7 天
N/S irrigation (沖洗用生理食鹽水)	室溫	24 小時
Xylocaine spray 10%, 50mL	室溫	3 個月

參考資料

1. 藥劑科. (n.d.). 廠商提供的藥物資訊. KnowledgeBase @ Vitals ESP. Retrieved from <https://km.domain.tahsda.org.tw/KM/listfolders.aspx?uid=53995>