

處方集附錄七 小兒科藥水體重與劑量換算表

小兒體重/劑量關係表

| 藥名 | 頻率 | 單次劑量 (mL/kg) |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Athmin | BID | 1/4 |
| Amolin | Q8H | 1/4 ~ 1/1.5 |
| Anti-phen | Q4-6H PRN | 1/2 |
| Augmentin | BID | 1/8 ~ 1/2 |
| Bisolvon | TID | 1/10 |
| Cefaclor | TID | 1/4 ~ 1/2.5 |
| Centertheo | Q6H | 1/2 ~ 1 |
| Cetirizine | QD or HS | 1/3 |
| Cough mixture | TID | 1/3 |
| Curam | BID | 1/5 ~ 1/2.5 |
| Cypromin | BID-TID | 1/5 ~ 1/3 |
| Idofen | Q6-8H PRN | 1/4 ~ 1/2 |
| Kidsolone | TID-QID | 1/30 ~ 1/2 (range 大) |
| Meptin | BID | 1/4 |
| Musco | TID-QID | 1/10 ~ 1/5 |
| Peace | TID-QID | 1/5 |
| Pushingon | BID | 1/8 ~ 1/4 |
| Secorine | TID-QID | 1/3 |
| Soonmelt | TID | 1/4 ~ 1/2 |
| Strolin | BID-TID | 1/4 |
| Sulfacotrim | BID | 1/2 |
| Ulexin | QID | 1/4 ~ 1 |
| Wempty | TID | 1/5 ~ 1/2.5 |
| Zithromax | QD | 1/4 |
| Voren suppository | Q6-8H PRN | 1/12.5 |

小兒體重/劑量關係表

| 藥名 | 頻率 | 單次劑量 (mL/kg) |
|-------------------|-----------|-------------------------|
| Athmin | BID | 1/4 |
| Amolin | Q8H | 1/4 ~ 1/1.5 |
| Anti-phen | Q4-6H PRN | 1/2 |
| Augmentin | BID | 1/8 ~ 1/2 |
| Bisolvon | TID | 1/10 |
| Cefaclor | TID | 1/4 ~ 1/2.5 |
| Centertheo | Q6H | 1/2 ~ 1 |
| Cetirizine | QD or HS | 1/3 |
| Cough mixture | TID | 1/3 |
| Curam | BID | 1/5 ~ 1/2.5 |
| Cypromin | BID-TID | 1/5 ~ 1/3 |
| Idofen | Q6-8H PRN | 1/4 ~ 1/2 |
| Kidsolone | TID-QID | 1/30 ~ 1/2 (range 大) |
| Meptin | BID | 1/4 |
| Musco | TID-QID | 1/10 ~ 1/5 |
| Peace | TID-QID | 1/5 |
| Pushingon | BID | 1/8 ~ 1/4 |
| Secorine | TID-QID | 1/3 |
| Soonmelt | TID | 1/4 ~ 1/2 |
| Strolin | BID-TID | 1/4 |
| Sulfacotrim | BID | 1/2 |
| Ulexin | QID | 1/4 ~ 1 |
| Wempty | TID | 1/5 ~ 1/2.5 |
| Zithromax | QD | 1/4 |
| Voren suppository | Q6-8H PRN | 1/12.5 |

Oseltamivir Phosphate 6mg/mL, 60mL oral suspension

1 歲或以上兒童服用 Oseltamivir Phosphate 的建議劑量

| 體重 | 建議劑量(療程 5 天) | 調製後口服懸浮液的 容量 (6 mg/mL) |
|------------|-----------------|---------------------------|
| ≤ 15 kg | 30mg BID | 5.0mLBID |
| > 15-23 kg | 45mg BID | 7.5mLBID |
| > 23-40 kg | 60mg BID | 10.0mLBID |
| > 40 kg | 75mg BID | 12.5mLBID |

未滿 1 歲的兒童：3 mg/kg (0.5mL/kg) BID for 5 days

Oseltamivir Phosphate 6mg/mL, 60mL oral suspension

1 歲或以上兒童服用 Oseltamivir Phosphate 的建議劑量

| 體重 | 建議劑量(療程 5 天) | 調製後口服懸浮液的 容量 (6 mg/mL) |
|------------|-----------------|---------------------------|
| ≤ 15 kg | 30mg BID | 5.0mLBID |
| > 15-23 kg | 45mg BID | 7.5mLBID |
| > 23-40 kg | 60mg BID | 10.0mLBID |
| > 40 kg | 75mg BID | 12.5mLBID |

未滿 1 歲的兒童：3 mg/kg (0.5mL/kg) BID for 5 days