

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OAAS	Antiasth 225mg slow release	Aminophylline	X	X	本藥為持續性藥效錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。院內另有 Theophylline 成份藥水 Centertheo 60mL (5.34mg/mL) liquid 及持續性藥效膠囊 Xanthium 200mg。
OABIR	Abiratred 250mg	Abiraterone	X	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或撥半。1. 已懷孕或可能懷孕的婦女不可在沒有防護措施(如手套)的情況下碰觸。
OACZ	Acarizax 12 SQ-HDM (30 tablets/box)	Der pte extract + Der far extract	O	X	本藥為舌下錠，目前相關臨床研究皆以舌下給藥，未經由舌下給藥的療效與安全性無法證實。仿單建議用法：打開阿克立舌下錠的包裝泡殼，應立即用乾燥的手指將口服錠放入舌下令其溶解。應避免在大約 1分鐘內吞服。接下來5分鐘內不可以吃東西或喝飲料。
OAFI	Afinitor 5mg	Everolimus	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。不可咀嚼或咬碎錠劑。對無法吞服錠劑的病人，應將本藥以輕輕攪拌的方式完全溶散（約7分鐘）於一杯水（約30毫升）中，並立即喝下。再於杯中倒入等量的水洗滌，然後將洗滌液全部喝掉，以確保服下完整劑量。
OAKY	Akynzeo 300/0.5mg	Netupitant + Palonosetron	X	X	本藥膠囊中含有三片小藥錠及一粒小膠囊，若病患有需求可以拆開後依序吞服。但不建議再將小藥錠及小膠囊拆開或磨粉。
OALA	Alat 10mg	Nifedipine	O	X	本藥為微粒膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的微粒研磨或壓碎。管灌時建議分次使用，注意沾黏及堵塞管路。
OAMA	AmaRyl 2mg	Glimepiride	X	X	仿單建議不可咀嚼或壓碎。廠商亦無相關安定性試驗。
OAMIO	Cordarone 200mg	Amiodarone	O	X	本藥具有苦味，不建議磨粉口服。
OAND	Androcur 50mg	Cyproterone	O	X	本藥為抗雄性激素製劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於小孩及懷孕或準備懷孕婦女。
OARH1	Arheuma 10mg	Leflunomide	O	X	本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。1. 喝足夠量的白開水將Arheuma錠整顆吞服，食物不會影響Leflunomide吸收。
OARIE	Aricept 10mg orodispersible	Donepezil	O	X	本藥為口崩錠，可溶水崩散後管灌。
OARIM	Arimidex 1mg	Anastrozole	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OARO	Aromasin 25mg	Exemestane	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OATI5	Ativan 0.5mg	Lorazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OATM25	apo-ATOMOXETINE 25mg	Atomoxetine	X	X	本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。
OATM40	40mg APO-ATOMOXETINE	Atomoxetine	X	X	本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。
OATMX	APO-Atomoxetine 18mg	Atomoxetine	X	X	本藥請整顆膠囊吞服。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意本藥粉末具有眼部刺激性。
OATOZ	Atozet 10/20mg	Ezetimibe + Atorvastatin	X	X	仿單載應將 Atozet 錠劑整粒吞服。不可將錠劑研碎、溶解或咀嚼使用。詢問廠商後回覆無破壞劑型後的安定性及有效性資料，且有效成分會被破壞失效並影響吸收。(The active ingredients can break down in the mouth and lose efficacy. This could also impair absorption.) 1. 應提醒病患若有不明原因的肌肉痛，觸痛或無力，且併有發燒時，請立刻回
OAVE	Avelox 400mg	Moxifloxacin	X	X	仿單建議應與水整顆吞服。
OBET5	Betmiga 50mg prolonged-release	Mirabegron	X	X	本藥為持續性藥效錠，服用時應以水整粒吞服，不可嚼碎、切割或壓碎。
OBIN	Binosto effervescent 70mg	Alendronate	O	X	本藥為發泡錠，以 120mL 常溫白開水配製成溶液，發泡停止後，再攪拌 10 秒鐘後飲盡。但本藥飲用後需保持上半身直立至少 30 分鐘。
OBNGP	BNG-1 powder 3gm/pack	當歸, 黃芩, 紅耆, 天竺黃, 人參, 柴胡, 黃連, 甘草	O	X	本品為顆粒粉劑，請於飯前一小時或飯後兩小時以溫開水服用。
OBOW	Bowklean powder 16.2gm, 2pk/box	Picosulfate + MgO + Citric acid	O	X	本品為粉劑，每包須以 150 毫升常溫冷水配製成溶液，攪拌 5 分鐘溶解後口服投予，並飲用足量流質液體。
OBRO	Broen-C 20000IU/20mg	Bromelain + L-Cysteine	X	X	本藥為腸溶錠，請整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。對鳳梨過敏者禁用
OBRVA	Briviact 100mg	Brivaracetam	O	X	仿單不建議磨粉：因藥物磨粉後有苦味 (廠商回覆 2022.02.15)
OCAP5	Calveda 500mg	Capecitabine	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OCAS	Casodex 50mg	Bicalutamide	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OCELL	Cellcept 250mg	Mycophenolate mofetil	X	X	本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。
OCHEY	Micrsoy 4mL/bottle (14bottles/box)	Soybean and probiotics fermentation product	O	X	本品為藥水劑型，每 4 毫升，以 100 毫升溫開水稀釋後空腹服用。
OCHL5	Chlordiazepoxide 5mg	Chlordiazepoxide	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OCIA5	Cialis 5mg (28 tablets/box)	Tadalafil	X	X	仿單建議本藥需整顆服用。
OCLOM5	Clomiphene 50mg (PEILI)	Clomiphene	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。
OCOD	Co-Diovan 80/12.5mg	Valsartan + Hydrochlorothiazide	O	X	仿單建議本藥不可分割。
OCODI	Codeine 30mg	Codeine	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OCOF1	Cofarin 1mg	Warfarin	O	X	本藥與feeding nutrition有交互作用而影響吸收，可磨粉但需與 nutrition 間隔1小時，並密切監測 INR 值。
OCOF5	COFARIN 5mg	Warfarin	O	X	本藥與feeding nutrition有交互作用而影響吸收，可磨粉但需與 nutrition 間隔1小時，並密切監測 INR 值。
OCON2	Concerta ER 27mg	Methylphenidate	X	X	本藥為長效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。
OCON3	CONCERTA 36mg	Methylphenidate	X	X	本藥為長效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。
OCONT	Contrave 8/90mg extended-release	Naltrexone + Bupropion	X	X	仿單建議本藥應整顆吞服，勿剝半、咀嚼或壓碎。 1. 請提醒病患近兩週有使用類鴉片止痛藥或抗鬱藥物請主動告知醫師。 2. 不可搭配高脂餐點併用。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OCRA5	Cravit F.C. 500mg	Levofloxacin	O	X	仿單建議須整粒吞服，可剝半但不要咀嚼或壓碎。因廠商未有相關安定性及療效數據，若有磨粉需求請密切監測病患臨床反應。
ODEP2	Depakine 200mg	Valproate Sodium	X	X	仿單建議應整錠吞服，不可咬碎。院內備有同成份藥水 Depakin solution 可供無法吞服病患使用。
ODEP5	DEPAKINE 500mg	Valproate Sodium	X	X	本藥為持續性藥效錠應整錠吞服，不可咬碎。院內備有同成份藥水 Depakin solution 可供無法吞服病患使用。
ODET4	DETRUSITOL SR 4mg prolonged-release	Tolterodine	X	X	本藥為持續釋放膠囊，需整顆吞服，勿拆開膠囊、咬碎、壓碎、剝半或磨粉。廠商未能提供破壞劑型後的有效性與安定性。
ODEXI	Dexilant delay-release 60mg	Dexlansoprazole	O	X	本藥為緩釋膠囊，需整顆吞服，勿咬碎、壓碎、剝半或磨粉。廠商提供之建議：對於不會吞膠囊之患者，可打開緩釋膠囊，並將藥粒灑在一湯匙蘋果醬(果泥)上，立刻吞服，不可咀嚼藥粉顆粒。對於管灌的病人，可打開緩釋膠囊，並將藥粉顆粒加入 20 mL 冷開水中，輕搖並反抽至針筒，打入鼻胃管中。(不要使藥粒溶解)
ODIA2	當立平 Diapin 2mg	Diazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
ODIAN	Diane 35 (21 tablets/box)	Cyproterone Acetate + Ethinylestradiol	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
ODIC1	Diclofenac 100mg S.R. F.C.	Diclofenac	X	X	本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。若有磨粉管灌需求可改用院內同成分 Cataflam 25mg。
ODIL2	DiTELAN 120mg	Diltiazem	X	X	本藥為持續性膠囊應整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。若有磨粉管灌需求可改用院內同成分 Herbesser 30mg。
ODOX4	Doxaben XL 4mg	Doxazosin	X	X	本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。若有磨粉管灌需求可改用院內其它 Alpha-Blockers。
ODUO	Duodart 0.5/0.4mg	Dutasteride + Tamsulosin	X	X	本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。
ODUP1	Duphaston 10mg	Dydrogesterone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。
ODUX	Duxetine 30mg	Duloxetine	X	X	仿單建議應整錠吞服，不可咬碎或拆開膠囊。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OEFE7	Effexor XR 75mg	Venlafaxine	O	X	本藥為持續性藥效膠囊應整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。若有管灌需求可拆開膠囊後使用，但不可將膠囊內微粒壓碎或磨粉。
OEPC	Epclusa 400/100mg	Sofosbuvir + Velpatasvir	O	X	由於本品帶有苦味，因此建議不要將膜衣錠嚼碎或研碎使用。
OEST	Estrade 2mg	Estradiol Valerate	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OEST6	Estromon 0.625mg	Conjugated Estrogen	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OEUR	Eurodin 2mg	Estazolam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OEVI6	Evista 60mg	Raloxifene	O	X	仿單無相關註記，詢問廠商不建議破壞劑型因無相關試驗可供參考。1. 無法行走會增加靜脈血栓性栓塞危險性，應在至少 72 小時前或長時間無法行走時(如手術後恢復、長期臥床)停用本藥。一直到病人行動能力完全恢復後才可繼續使用。2. 應告知服用 EVISTA 的婦女，長期旅行之間應保持定期的活動。
OFAL	Fallep 2mg	Flunitrazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OFEM	Femara 2.5mg	Letrozole	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OFLUP	FluPINE 0.25mg	Fludiazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OFORL	Forlax 10gm/pack	Polyethylene Glycol 4000 (Macrogol 4000)	O	X	應以 50 mL 開水溶解後立刻服用。
OFYC	Fycompa 2mg	Perampanel	X	X	仿單建議應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎
OGES	Gestrin 2.5mg (8 capsules/box)	Gestrinone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OGIK	GI Klean Powder	Polyethylene Glycol 3350	O	X	本品為粉劑，每包須以 1000 毫升冷開水配製成溶液後，調勻後口服使用。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OHAR4	Harnalidge OCAS 0.4mg prolonged release	Tamsulosin	X	X	本藥為持續性藥效膜衣錠應整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。
OIBR	IBRANCE 125mg	Palbociclib	X	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整顆吞服，勿咀嚼、咬碎或打開膠囊。
OIMI5	Imigran FDT 50mg	Sumatriptan	O	X	本藥為速溶錠，仿單建議須整粒以水吞服，不要咀嚼。不宜做預防性使用。
OIMOV	Imovane 7.5mg	Zopiclone	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。 1. 藥物性迫害(具犯罪意圖的藥物使用)：醫療人員應根據臨床評估開立 IMOVANE 處方，並且僅在醫療需要的情況下開立 IMOVANE，因為它可能會被非法使用。
OIMU	Imuran 50mg	Azathioprine	O	X	本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OINF	Infloran 250mg (20 capsules/box)	Lactobacillus + Bifidobacterium	O	X	本藥成份不宜遇熱，故不宜使用磨粉分包機。可自行拆膠囊使用。
OIRE	Iressa 250mg	Gefitinib	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OISO2	Isoptin SR 240mg	Verapamil	X	X	本藥為持續性膜衣錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。
OJOH	Johnlax 5mg	Bisacodyl	X	X	本藥為腸溶糖衣錠。須整粒吞服，勿咬嚼或壓碎。
OKCIT	K-citrate granules 5gm	Potassium Citrate Monohydrate + Citric Acid	O	X	本品為顆粒粉劑，每包請以 180毫升以上冷開水或果汁調勻後再服用。
OKEP	Keppra 500mg	Levetiracetam	X	X	仿單建議無法吞服藥錠之病人，應使用 levetiracetam 口服液劑。本院臨採清單包含 Keppra solution。刻線只是便於剝半吞嚥，而不是分成相等的劑量。
OKES	Ketosteril	Amino Acids + Ketoanalogues	O	X	由於本品帶有臭味，若使用磨粉分包機會汙染難以清潔。廠商亦無相關資料。因此建議不要將藥錠磨粉使用。
OKET	Keto 10mg	Ketorolac	O	X	本藥為腸溶膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的腸溶微粒研磨或壓碎。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OKIS	Kisqali 200mg	Ribociclib	X	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。仿單建議應整顆吞服，勿咬嚼或壓碎。
OKLA5X	Klaricid XL 500mg	Clarithromycin	X	X	本藥為持續性藥效錠，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。本藥建議隨餐使用。
OKLU	Kludone MR 60mg	Gliclazide	X	X	本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。
OKREM	活性碳 Kremezin 500mg tablet (4 tablets/PK)	Spherical Absorptive Carbon	O	X	本藥為速崩錠，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求，可以少量水溶解後使用。
OLAMC	Lamictal 50mg	Lamotrigine	X	X	仿單建議須整粒吞服，不要咀嚼。因廠商無相關安定性測試。
OLEEV	Leevk 100mg	Imatinib	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OLEN	Lendormin 0.25mg	Brotizolam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OLEV7	Levofloxacin 750mg (政府提供)	Levofloxacin	O	X	仿單建議須整粒吞服，可剝半但不要咀嚼或壓碎。因廠商未有相關安定性及療效數據，若有磨粉需求請密切監測病患臨床反應。
OLEX3	Lexotan 3mg	Bromazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OLINI	Linicor F.C.T. 500/20mg	Niacin + Lovastatin	X	X	本藥為Lovastatin加緩釋劑型 Niacin，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。
OLIV	Livial 2.5mg (28 tablets/box)	Tibolone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。
OLOK	Lokelma 5gm	Sodium Zirconium Cyclosilicate	O	X	倒入盛有約45毫升水的水杯中，攪拌均勻，在不溶性粉末仍在懸浮狀態時飲用。
OLONS	Lonsurf 20mg	Trifluridine + Tipiracil	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OLOR	Lorapseudo SR 10/240mg	Loratadine + Pseudoephedrine	X	X	本藥為緩釋錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。
OLOX	Loxol SR 75mg	Ambroxol	X	X	本藥為長效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。院 內另有同成份 Musco solution 可使用。
OMACA	Macalol 0.25mcg	1, 25-Dihydroxycholecalciferol	O	X	本藥為軟膠囊應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎，無法吞服患者可以溫水溶解後服用。
OMELE	Meletin 100mg	Mexiletine	X	X	仿單建議本藥應併用足量液體且整粒吞服。
OMERC	Mercilon (21 tablets/box)	Desogestrel + Ethinylestradiol	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OMEZA	MezaVant XL 1200mg prolonged release	Mesalazine	X	X	本藥為長效腸溶膜衣錠，應整粒吞服，不可咬碎或咀嚼。無法吞服患者可考慮使用同成份 Colasa enema 2gm/100mL。
OMIN6	Minirin Melt 60mcg	Desmopressin	O	X	本藥為凍晶口溶錠。可溶水崩解後管灌。
OMIRA	Mirapex 0.375mg prolonged-release	Pramipexole	X	X	本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。
OMIRT3	Apa-Mirtazapine O.D.T. 30mg	Mirtazapine	O	X	本藥為口溶錠。可溶水崩解後管灌。
OMOR1	Morphine 15mg	Morphine	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OMTD22	Methydur 22mg sustained release	Methylphenidate	X	X	本藥為長效錠，請整粒吞服，不可剝半或磨粉。
OMTX	Methotrexate 2.5mg	Methotrexate	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
ONAT	Natrilix SR 1.5mg	Indapamide	X	X	本藥為持續性藥效膜衣錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
ONAV2	Navelbine 20mg (臨採小劑量)	Vinorelbine	X	X	溫諾平軟膠囊必須在用餐時以水整顆吞服 (不可嚼食或剝開膠囊)。
ONAV3	NAVELBINE 30mg	Vinorelbine	X	X	溫諾平軟膠囊必須在用餐時以水整顆吞服 (不可嚼食或剝開膠囊)。
ONEOT	Neotigason 10mg	Acitretin	X	X	本藥應整粒吞服, 切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性, 請注意相關暴露風險, 尤其是婦女及小孩。
ONER	Nerlynx 40 mg (180 tablets/bot)	Neratinib	X	X	本藥為癌症用藥, 不宜破壞原劑型。仿單建議應整錠吞服, 不可咬碎或撥半。
ONEX	Nexium 40mg (耐適恩)	Esomeprazole	O	X	本錠劑應整粒以液體吞服, 不可嚼破或壓破本錠劑。無法吞服的病人, 可將藥錠置入半杯非碳酸類的水中, 攪拌直到藥錠崩散, 將水連同小藥球喝下或管灌。再將半杯水加入杯中沖洗並服用, 但小藥球不可咬碎或壓碎。
ONIF	Nifedipine S.R.F.C. 30mg	Nifedipine	X	X	本藥為持續性膜衣錠整粒吞服, 不可咀嚼或磨碎。
ONTG6	Nitrostat (NTG) 0.6mg	Nitroglycerin	O	X	本藥為舌下錠, 可直接置於舌下使用。
ONUB	Nubeqa F.C. 300mg	Darolutamide	X	X	本藥為癌症用藥, 藥錠需整顆吞服, 不可破壞原劑型。
ONUM	Numient 48.75/195mg extended-release	Carbidopa + Levodopa	O	X	本藥為緩釋膠囊, 請整粒吞服, 不可剝半或磨粉。 1. 針對吞嚥膠囊有困難的患者, 可以小心打開膠囊, 將完整內容物撒在少量 (例如2茶匙) 軟性食物上, 例如蘋果醬、優格或布丁, 藥品 / 食物混合物應立即全部吞嚥完畢, 不經咀嚼, 混和後應立刻服用。 2. 高脂高熱量飲食會使吸收延緩兩小時。服用時不應同時攝取高蛋白質飲食, 因其可能降低 levodopa 吸收。
ONURT	Nurtec ODT 75mg	Rimegepant	O	X	本藥為口溶錠, 不宜破壞原劑型。若有磨粉需求, 可以少量水溶解後使用。
OOFEE	OFEV 150mg	Nintedanib	X	X	本藥為軟膠囊應整粒吞服, 切勿咬嚼或壓碎。另本藥味道極苦, 且無咬嚼或壓碎軟膠囊的相關藥動學資料。
OOKW	OKWE 20mg	Omeprazole	O	X	本錠劑應整粒以液體吞服, 不可嚼破或壓破。若需拆膠囊請勿將膠囊中的小藥球咬碎或壓碎。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OOMA	Omacor Soft 1000mg	Omega-3- Acid Ethyl Esters 90	O	X	本藥為軟膠囊，請整粒吞服，不可切開。
OOSE	Oseni 25/30mg	Alogliptin + Pioglitazone	X	X	仿單建議應整錠吞服，不可撥半。
OOXB	Oxbu 5mg extended-release	Oxybutynin	X	X	本藥為緩釋錠整粒吞服，不可咀嚼或磨碎。
OPAXS1	Paxlovid (絕對自費) 300/100mg, 10 doses	Nirmatrelvir + Ritonavir	O	X	仿單建議應整粒吞服。不得咀嚼、破壞或壓碎錠劑。
OPEN4	Pentop S.R. 400mg	Pentoxifylline	X	X	本藥為持續性糖衣錠，應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。
OPHE	Phenobarbital 30mg	Phenobarbital	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OPRAD	Pradaxa 110mg	Dabigatran	X	X	本藥應整粒吞服，切勿咬嚼或打開膠囊。若破壞劑型會造成生體可用率增加1.4倍而增加出血風險。
OPRO5	Provera 5mg	Medroxyprogesterone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OPROP	Propecia 1mg (28 tablets/box)	Finasteride	X	X	本藥應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎。本藥僅用於男性，具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。錠劑覆有膜衣，若無破損可防止平常觸摸時直接接觸有效成份。
OPRS	Proscar 5mg	Finasteride	O	X	本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。錠劑覆有膜衣，若無破損可防止平常觸摸時直接接觸有效成份。
OQTE	Qtern 5/10mg	Saxagliptin + Dapagliflozin	X	X	仿單建議不可剝半磨粉。(經詢問廠商本藥無特殊控釋或緩釋劑型，但無相關試驗佐證磨粉的藥動或安全性。2022/01/02)
ORANC	Rancad 500mg extended release	Ranolazine	X	X	本藥為持續性藥效錠，勿將此藥錠咬碎，壓碎，剝半或磨粉。
ORIF5	Rifampicin 300mg	Rifampicin	O	X	本藥膠囊內藥粉易汙染磨粉分包機，請自行磨粉。膠囊內容物可與蘋果漿或膠凍(jelly)混合。如果兒童或成年病人需要使用液體劑型時，可依下列法調製成1%(10mg/mL)之口服混懸劑：(1) 將300mg之膠囊4粒或150mg膠囊8粒的內容物移入120mL琥珀色處方調劑瓶。(2) 加入適量(20mL)之單糖漿至瓶中，激烈振搖之。(3) 再加足量之單糖漿至瓶中，使

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
ORIT2	RITALIN LA 20mg	Methylphenidate	X	X	本藥為持續性藥效膠囊，請整粒吞服，不可撥半或磨粉。
ORIV5	Rivotril 0.5mg	Clonazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OROA	Roaccutane 10mg	Isotretinoin	X	X	本藥為軟膠囊應整粒吞服，切勿咬嚼、壓碎或打開膠囊。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。
OROZE	Rozerem 8mg	Ramelteon	X	X	仿單建議請勿剝開藥錠，務必整顆吞服。
ORYB	Rybelsus 7mg	Semaglutide	X	X	仿單建議整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼，因為尚不清楚是否會影響 semaglutide 的吸收。
ORYB14	RYBELSUS 14mg	Semaglutide	X	X	仿單建議整顆吞服。錠劑不應剝開、壓碎或咀嚼，因為尚不清楚是否會影響 semaglutide 的吸收。
OSAL5	Salazine 500mg enteric coated	Sulfasalazine	X	X	本藥為腸溶錠，應整粒吞服，不可咬碎或咀嚼。
OSAN1	SANDIMMUN Neoral 100mg	Ciclosporin	X	X	本藥軟膠囊，應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。本藥具致畸胎性，請注意相關暴露風險，尤其是婦女及小孩。
OSERO	Seroxat 20mg	Paroxetine	X	X	本品錠劑應直接吞服，請勿咀嚼。建議一天投予一次，於晨間與食物併服。
OSPE	Spedra 200mg (4 tablets/box)	Avanafil	X	X	本藥不應用於管灌病患。 相較於空腹狀態，隨餐服用可能會延後賽倍達的藥效起始時間。
OSQL2	Smokquit 2mg (24 tablets/box)	Nicotine	X	X	本藥為口含錠，不可咀嚼或吞服。服藥後將口含錠含在口腔兩側移動，持續20-30分鐘直到完全溶解。
OSQL4	SMOKQUIT 4mg (24 tablets/box)	Nicotine	X	X	本藥為口含錠，不可咀嚼或吞服。服藥後將口含錠含在口腔兩側移動，持續20-30分鐘直到完全溶解。
OSTI	Stilnox 10mg	Zolpidem	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OSTV	Stivarga 40mg (28#/Bot)	Regorafenib	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OSUB	Suboxone 8/2mg	Buprenorphine + Naloxone	O	X	本藥為舌下錠，可直接置於病患舌下。
OSYN3	Syndoman 30mg	Flurazepam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OSYNS	Synseq (28 tablets/box)	Estradiol + Medroxyprogesterone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OTAI	Taigexyn 250mg	Nemonoxacin	X	X	仿單建議本藥以水整粒吞服。 1. 勿與鐵鹽、鈣片、制酸劑、含咖啡因及乳製品食物併服 2. 重症肌無力患者不建議使用
OTAK	Takepron OD 30mg	Lansoprazole	O	X	本藥為口溶錠。可溶水崩解後管灌。
OTAM	Nolvadex 10mg	Tamoxifen	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OTAR1	Tarceva 150mg	Erlotinib	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OTRCT	Traceton 37.5/325mg	Tramadol + Acetaminophen	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OTRO	Trokendi XR 50mg	Topiramate	O	X	本藥為膠囊請整顆吞服，請勿灑於食物上、咀嚼或咬碎。本藥由三種不同釋放時間的控釋微粒組成，因此管灌者可以拆膠囊使用，但不建議拆膠囊後分次服藥。
OTS1	TS-1 20mg	Tegafur + Gimeracil + Oteracil K	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OUFU	UFUR 100/224mg	Tegafur + Uracil	O	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OUTRO	Utrogestan 100mg	Progesterone	X	X	軟膠囊不可剝半或磨粉。無法吞服病患可以溫水溶解後服用。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OVEN2	Venina 1/2.5mg (28 tablets/pack)	Estradiol + Medroxyprogesterone	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OVERZ	Verzenio 150mg	Abemaciclib	X	X	仿單建議病人應吞服整顆錠劑，不可將錠劑咀嚼、壓碎或切半後吞服。如果錠劑破裂、裂開或不完整，請病人不要服用。
OVESI	Vesicare 5mg	Solifenacin	X	X	仿單建議本藥需整顆以水吞服。
OVGR1	VIAGRA 100mg (4 tablets/box)	Sildenafil	X	X	本藥不應用於管灌病患。
OVGRF	Viagra ODF 50mg (7 Strips/Box)	Sildenafil	X	X	本品為口溶膜劑型，置於舌面上，待溶散後再用水送服，或不用水直接吞服即可。
OVIAS	Viartril-S powder 1.5gm (自費)	Glucosamine Sulphate	O	X	本品為粉劑，請以 100 毫升白開水，混和均勻後服用。
OVIS2	Visanne 2mg	Dienogest	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉。
OVOC	Vocinti 20mg	Vonoprazan	X	X	仿單未有管灌磨粉相關註記，經詢問廠商不建議管灌磨粉，因未有相關試驗。(2022/10/11)
OWELX	Wellbutrin XL 150mg	Bupropion	X	X	本藥為持續性藥效錠，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。
OXAN	Xanax 0.5mg	Alprazolam	O	X	為避免管制藥品汙染分包機，管制藥品不磨粉，請使用前自行研磨。
OXANT	Xanthium 200mg	Theophylline	O	X	本藥為腸溶膠囊，可拆膠囊後服用。但不可將膠囊內的腸溶微粒研磨或壓碎。院內另有 Theophylline 成份藥水 Centertheo 60mL (5.34mg/mL) liquid。
OXELJ	Xeljanz 5mg	Tofacitinib	O	X	本藥為免疫抑制劑，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OXELJXR	11mg Xeljanz XR	Tofacitinib	X	X	仿單建議應完整吞服錠劑，不可壓碎、剝半或咀嚼。

處方集附錄九 本院註記「不可磨粉」口服藥品一覽表

(欄位代表"醫師不可開立磨粉分包")

最後更新: 2026/02/24

藥品代碼	商品英文名稱	成份名	管灌	磨粉	不可磨粉原因與建議
OXIG	Xigduo XR 10mg/1000mg Extended-Release	Dapagliflozin + Metformin	X	X	本藥為持續性藥效錠，需整顆吞服勿咀嚼、剝半或磨粉。無法吞服病患可改用院內同成份一般劑型藥物。
OXTA40	膜衣錠 Xtandi 40mg (tablet)	Enzalutamide	X	X	本藥為癌症用藥，不宜破壞原劑型。若有磨粉需求請使用前自行磨粉，並注意相關風險。
OYAZ	YAZ 悅姿錠 (28 tablets/box)	Drospirenone + Ethinylestradiol	O	X	本藥為賀爾蒙用藥，勿放入磨粉機分包。若有磨粉需求請使用前自行磨粉並注意相關風險，尤其避免暴露於懷孕或準備懷孕婦女。
OZCO	Zcough 100mg	Benzonatate	X	X	本藥為軟膠囊，仿單建議應整粒吞服，切勿咬嚼或壓碎。