

附錄十一、臺安醫院抗生素注射劑使用方法

注射藥品稀釋後保存期限:數據代表該藥品維持物理化學安定之期限，實際使用期限請遵照無菌操作規範。

2025.08.07 修訂

商品名		Acemycin inj 500mg/2mL ¹						
學名		Amikacin						
劑量規格		500mg/2mL/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM							1.須避開神經行走之部位。 2.如需反覆投藥時，勿注射於相同的部位。	室溫: 24hr
IV infusion			N/S, D5W, L/R, L/R with 5% Dextrose		2.5 ~ 5 mg/mL	成人: 每 500 mg 滴注時間大於 30 ~ 60 分鐘。 Neonates: 滴注時間約 20 分鐘 ² 。 Pediatrics: 滴注時間應大於 30 ~ 60 分鐘 ² 。	1. 監測腎功能、全血球計數及聽覺功能，並監測藥物血中濃度 ² 。 2. 避免與 penicillins 或 cephalosporins 類抗生素混合以免藥效降低 ² 。 3. 特殊族群: 腎功能受損者需調整劑量 ² 。	

商品名		Ampicillin inj 0.5gm (勵達專案進口) ¹						
學名		Ampicillin						
劑量規格		0.5gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	1.8 mL D/W	250mg/mL					1. 對 PCN 過敏史禁用。 2. 稀釋後儘快使用，安定性與 稀釋濃度與保存條件有關。 3. 特殊族群：腎功能受損者需 調整劑量 ² 。	室溫：1hr
IV bolus	5 mL D/W	100mg/mL				推注時間至少 3 ~ 5 分鐘		冷藏： 5 天 ³ 室溫： 1 天 ³
IV infusion			N/S	50~100 mL	< 30 mg / mL 新生兒靜脈輸 注的最大濃度 為 100 mg/mL	每 1gm 劑量以至少 10 ~ 15 分鐘緩慢滴注，兒童的滴注 速率建議超過 30 分鐘。		冷藏： 4 小時 ³ 室溫： 2 小時 ³
			D5W					

商品名		Bicillin L-A inj ¹						
學名		Penicillin G						
劑量規格		2.4 MIU/4mL						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM							1. 僅限深層肌肉注射使用，注射臀部的外上側（背側臀肌區）或腹側臀肌區。 2. 請勿注射動脈或神經內或其周圍，或經由靜脈途徑注射或與其他藥品摻混。	立即使用

商品名		Burotam inj ¹						
學名		Cefoperazone + Sulbactam						
劑量規格		1gm/1gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV bolus	6~10mL D/W, D5W, N/S					推注時間至少 3 分鐘	1. 對 penicillin 系抗生素有過敏史的病人，為預防發生休克，請詳細問診。 2. 因有可能會分泌到母乳，因此正在哺乳婦女於注射時請停止哺乳。 3. 天冷時請回溫到與體溫相同後再使用。 4. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 6hr 冷藏: 48hr
IV infusion	6~10mL D/W, D5W, N/S		D5W, N/S		Cefoperazone 10 ~ 250 mg/mL Sulbactam 5 ~ 125 mg/mL ²	輸注時間 15 ~ 60 分鐘 ²		

商品名		Cefa inj ¹						
學名		Cefazolin						
劑量規格		1 gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限

IM	3.5 mL D/W; 4.5 mL N/S; 4.5mL D5W	1gm/3.5mL, 1gm/4.5mL				Inject deep IM into large muscle mass.	1. 監測體溫、CBC、肝腎功能、PT 值。 2. 注意是否發生抗生素引起的腹瀉。 3. 特殊族群: 腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 避光 48hr 冷藏: 避光 96hr
IV bolus	10mL D/W, N/S, D5W	1g/10mL				推注時間至少 5 分鐘 ³		室溫: 避光 24hr 冷藏: 避光 96hr
IV infusion	10mL D/W, N/S, D5W	1g/10mL	N/S, D5W		1gm/ 50-100mL	以 30~60 分鐘		

商品名		Cefin inj¹						
學名		Ceftriaxone						
劑量規格		2 gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV bolus	20mL D/W	100mg/mL				推注時間至少 2~4 分鐘	1. 勿與 aminoglycoside 類抗生素混合或同時注射。 2. IV 有可能發生靜脈炎。 3. 本藥品勿與含鈣溶液混合到 IV bag、IV line 或 Y site，會發生沉澱。 4. 注射前詢問病患是否有 β-醯胺類抗生素過敏史。監測體溫、CBC、肝腎功能。 5. 特殊族群: 肝、腎功能受損者，每日最大劑量不可超過 2gm ² 。	室溫: 6hr 冷藏: 24hr
IV infusion	20mL D/W	100mg/mL	不可使用含鈣溶液(如 Ringer's 溶液或 Hartmann's 溶液)		10~40mg/mL ²	輸注時間至少 30 分鐘		

商品名		Cetazine inj¹						
學名		Ceftazidime						
劑量規格		1gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	3 mL D/W	250 mg/mL				2 gm 劑量建議使用靜脈途徑緩慢給藥	1. 監測體溫、CBC、肝腎功能、PT 值。	室溫: 避光 18hr ⁴ 冷藏: 避光 7day ⁴
IV bolus	10mL N/S, D/W, D5W	100mg/mL				推注時間至少 3~5 分鐘 ³		

IV infusion	10mL D/W, N/S, D5W	100mg/mL	N/S, D5W		20mg/mL	以 20 ~ 30 分鐘緩慢滴注	2. 注意是否發生抗生素引起的腹瀉。 3. 勿與 aminoglycoside 類抗生素混合或同時注射。 4. 避光儲存。 5. 特殊族群: 腎功能受損者需調整劑量 ² 。	
-------------	--------------------	----------	----------	--	---------	------------------	--	--

商品名		Claforan inj ¹						
學名		Cefotaxime						
劑量規格		1gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	4mL D/W	250mg/mL					1. 注射前詢問病患是否有 β-醯胺類抗生素過敏史。 2. 監測體溫、CBC (使用超過 10 天)、腎功能、PT 值。 3. 注意是否發生抗生素引起的腹瀉。 4. 特殊族群: 腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 24hr ⁴ 冷藏: 24hr
IV bolus	10mL D/W	100mg/mL, 兒童濃度 < 50 mg/mL				推注時間至少 3 ~ 5 分鐘 ³		
IV infusion	10mL D/W	100mg/mL, 兒童 < 50 mg/mL	N/S, L/R, D5NS, D5W	40~100mL	10~50mg/mL	以 20~60 分鐘緩慢滴注		

商品名		Clicin inj ¹						
學名		Clindamycin						
劑量規格		300mg/2mL/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM							1. 一次劑量不可超過 600 mg，且必須深部注射。	室溫: 24hr ⁴ 冷藏: 10d ⁴
IV infusion			N/S, L/R, D5W	50 mL	≤ 12 mg/mL	10 分鐘 (300mg)	1. 靜脈給藥一定要稀釋。 2. 監測體溫、CBC、肝腎功能，注意是否發生腹瀉。 3. 特殊族群：輕中度腎功能受損者不需調整劑量 ² 。	
				50 mL		20 分鐘 (600mg)		
				100 mL		30 分鐘 (900mg)		
				100 mL		40 分鐘 (1200mg)		

商品名		Colimycin inj (臨採) ¹						
學名		Colistin Methanesulfonate						
劑量規格		2MU(66.8mg)/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	2mL D/W, N/S	33.4mg/mL						室溫: 24hr
IV bolus	2mL D/W, N/S	33.4mg/mL	N/S, L/R, D5W, D5NS			推注時間至少 3 ~ 5 分鐘	1. 輸注液需新鮮調配，稀釋後輸注液室溫下只能擺放 24 小時，腎功能不全病患需減慢注射速率。 2. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	
IV infusion	2mL D/W, N/S	33.4mg/mL	N/S, L/R, D5W, D5NS			開始的 1~2 小時緩慢滴注。		

商品名		Cravit inj ¹						
學名		Levofloxacin						
劑量規格		250mg/50mL/Bot						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	不需稀釋	不需稀釋	不需稀釋，與 N/S, D5W 相 容。		5mg/mL ⁴	250mg 靜脈緩慢滴注至少 30 分鐘；500mg 靜脈緩慢滴 注至少 60 分鐘緩慢滴注。	1. 需避光儲存，光照下藥效 只能維持 3 天。輸注時監 測 BP。 2. 不可與肝素或鹼性溶液混 合。 3. 特殊族群：腎功能受損者 需調整劑量 ² 。	室溫: 3hr 冷藏: 48hr

商品名		Cubicin inj ¹						
學名		Daptomycin						
劑量規格		500 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV bolus	10mL N/S	50 mg/mL				推注時間 2 分鐘		

IV infusion	10mL N/S	50 mg/mL	成人：50mL N/S 1 至 6 歲兒童：25mL N/S 7 至 17 歲兒童：50mL N/S			成人：30 分鐘 1 至 6 歲兒童：60 分鐘，輸液速率，應維持於 0.42 mL/分鐘。 7 至 17 歲兒童：30 分鐘，輸液速率，應維持於 1.67 mL/分鐘。	- 與含葡萄糖稀釋液不相容。 - 若使用相同的靜脈注射管連續注射不同的藥物，在注射 Cubicin 前後，需以可相容的靜脈注射溶液沖洗該靜脈注射管。 - 配製藥液時或之後，請避免劇烈震動或搖晃藥瓶，以減少泡沫形成。需靜置浸濕之內容物 10 分鐘。 - 建議使用 21 號或更小直徑之斜面針頭或免針設備。	(配置及稀釋時間合併) 室溫: 12hr 冷藏: 48hr
-------------	----------	----------	---	--	--	---	--	-------------------------------------

商品名		Eraxis inj (臨採) ¹						
學名		Anidulafungin						
劑量規格		100 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	30 mL D/W	3.33 mg/mL	N/S, D5W	100 mL	0.77 mg/mL	< 1.4 mL/min，> 90min。	果糖不耐症患者不可使用。	配置溶液: 室溫 24 小時 稀釋溶液: 室溫 48 小時

商品名		Ertapenem inj ¹						
學名		Ertapenem						
劑量規格		1 gm/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	3.2 mL 1% or 2% Lidocaine	280 mg/mL ²						室溫: 1 小時

IV infusion	10 mL D/W, N/S	100 mg/mL ²	50mL N/S			建議滴注時間 > 30 分鐘。 ²	1. 以 IM 方式調配好的溶液不可供作靜脈投與使用。 2. 對醃胺(amide)類局部麻醉劑過敏的病人及患有嚴重休克或心臟阻塞的病人，禁止肌肉注射投與。 3. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 6 小時 冷藏: 24 小時， 冷藏取出後 4 小時
-------------	-------------------	---------------------------	----------	--	--	------------------------------	--	--------------------------------------

商品名		Extencilline inj (專案進口) ¹						
學名		Penicillin G						
劑量規格		2.4 MIU/5mL						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	5 mL D/W, 5 mL 0.5% injectable Lidocaine solution	2.4MIU/5mL					1. 須充分搖晃至少 20 秒直到均勻，然後立即使用。 2. 僅限深層肌肉注射使用，建議注射於大腿內側肌肉(股四頭肌)或臀部外上側。 3. 針頭應盡量垂直於皮膚表面，每次注射應與上次位置保持間隔。 4. 如長期治療(超過 5 天)，建議監測血球數及腎功能。	立即使用

商品名		FLUcon inj ¹						
學名		Fluconazole						
劑量規格		200mg/100mL/Bot						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	不需稀釋	不需稀釋	不需稀釋		2mg/mL	10 mL/minute	1. 注意是否發生皮膚疹、腹痛症狀，監測肝腎功能及心電圖變化。	立即使用

							2. 與 N/S, Hartmann's solution, Ringer's, L/R, 氯化鉀葡萄糖液, 20% Dextrose 相容。 3. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

商品名		Flumarin inj¹						
學名		Flomoxef						
劑量規格		1 gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV bolus	4 mL D/W, D5W, N/S					推注時間 3 ~ 5 分鐘	1. 曾對 Penicillin 類抗生素過敏患者須慎重投與。 2. 投與本劑時，請定期進行肝功能、腎功能、血液等檢查。	室溫: 6hr 冷藏: 24hr
IV infusion	4 mL D/W, D5W, N/S		50 ~ 100 mL D5W, N/S			輸注時間 30 ~ 60 分鐘		

商品名		Furoxime inj¹						
學名		Cefuroxime						
劑量規格		1.5gm/ vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV bolus	15 mL D/W	100mg/mL				推注時間至少 3 ~ 5 分鐘 ²	1. 不可與 aminoglycoside 混合。監測體溫、CBC、腎功能、PT 值。 2. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 5hr 冷藏: 48hr
IV infusion	15 mL D/W	100mg/mL	N/S, D5W, D10W, D5NS, L/R	50~100mL	1~30mg/mL	> 15 ~ 60 分鐘		室溫: 24hr 冷藏: 7d ⁴

商品名		Gentamicin inj¹						
學名		Gentamicin						
劑量規格		80mg/2mL/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限

				體積				
IM							1. 監測體溫、CBC、肝腎功能、血鈣、血鉀、血鈉、血鎂、聽覺功能，藥物血中濃度。 2. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 24h ⁴
IV infusion			N/S, D5W	50 ~ 200 mL	< 1 mg/mL	建議滴注 0.5 ~ 2 小時。		

商品名		Invanz inj ¹						
學名		Ertapenem						
劑量規格		1gm/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	1%或 2%之 lidocaine HCl 注射液 3.2mL	1gm/3.2mL			-		1. 充分搖動溶解成溶液，以深部肌肉注射的方式將藥品注入到大肌肉部位(例如臀部肌肉或大腿側邊肌肉)。 2. 此溶液不可靜脈投。 3. 用於 3 個月至 12 歲:施打體積應為 15mg/公斤(不超過 1gm/天)的溶液。 4. 不可使用含有葡萄糖的稀釋液。	1 小時
IV infusion	10mLD/W, N/S	100mg/mL	N/S	50mL	20mg/mL	滴注時間 30 分鐘以上。	1. 3 個月至 12 歲:稀釋成濃度為 20mg/mL 或更稀，經稀釋的藥品必須在 6 小時內完成輸注。 2. 不可以使用含有葡萄糖的稀釋液。	室溫: 6 小時 冷藏(5°C): 24 小時內，自冷藏取出後須於 4 小時內使用。

商品名		Lofatin inj ¹						
學名		Cefoxitin						
劑量規格		2 gm/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限

學名		Metronidazole						
劑量規格		500mg /100mL/ Bot						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	不需稀釋	不需稀釋	不需稀釋		0.5mg/mL	以 5 mL/分鐘速率緩慢滴注	1. 監測體溫、CBC、血球分化計數，注意心智與神經功能變化。療程建議不超過 10 天。 2. 不可冷藏會有結晶析出。 3. 可以使用靜脈合併輸注〔(N/S, D5W, D5NS、林格氏液、氯化鉀溶液(20mmol、40mmol)〕 4. 特殊族群：嚴重肝功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 24hr ⁴

商品名		Myfungin inj (臨採) ¹						
學名		Micafungin						
劑量規格		50 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV Infusion	5 mL N/S, D5W	10 mg/mL	N/S, D5W	100mL	0.5 ~ 4 mg/mL	建議滴注 1 小時 以上。	1. 溶解時需減少泡沫形成，切勿劇烈振搖。 2. 稀釋液 須避光 ，不需遮蓋點滴腔與點滴管。 3. 輸注 Mycamine 前，原有的靜脈輸注管線應先用 0.9%N/S 注射液沖洗。 4. 給藥濃度大於 1.5 mg/mL 應由中央靜脈導管給藥。	室溫: 避光 24hr

商品名		Ocillina inj ¹						
學名		Oxacillin						
劑量規格		50 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋	每瓶稀釋液	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限

			液	體積				
IM	2.7 ml D/W	500mg/3mL					1. 需注射於大塊肌肉的深部	配製後室溫: 3 day ; 冷藏: 7 day
IV bolus	5 mL N/S, D/W	100mg/mL				推注速率 < 100 mg/分鐘，建議推注> 10 分鐘	1. 注射速率太快可能造成痙攣性癲癇。	室溫: 6hr (loss 10%)
IV infusion	5 mL N/S, D/W	100mg/mL	N/S, D5W, D5NS, L/R		0.5~40mg /mL ⁵	建議輸注>30 分鐘 ³	2. 老年人應減慢給藥速率，避免發生血栓性靜脈炎。 3. 監測體溫、CBC、血球分化計數、肝腎功能。	

商品名		Seforce inj ¹						
學名		Ciprofloxacin						
劑量規格		400mg/200mL/bag						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion		可不經稀釋給藥	N/S, L/R, D5W, D10W, 0.45%N/S		1~2mg/mL	以 > 60 分鐘緩慢滴注	1. 需避光儲存，光照下藥效只能維持 3 天。 2. 可直接給藥或與其它相容的輸注溶液混合後給藥。 3. 緩慢的將藥打入大靜脈，可以減少病人的不適及降低靜脈刺激的危險性。 4. 特殊族群: 腎功能受損者需調整劑量 ² 。	本藥具光敏感性，需在最短時間使用完。

商品名		Sevatrim inj (臨採) ¹						
學名		Sulfamethoxazole + Trimethoprim						
劑量規格		400mg/80mg/vial						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV Infusion			N/S, D5W	125mL		建議滴注 1.5 小時。	1. 嚴重感染之劑量(>3 vial) 不要連續使用超過 3 天 2. 給藥前必須稀釋配製， 3. 在 G-6-PD 缺乏的病人可能會發生溶血症，投與本品應謹慎。	立即使用

							4. 特殊族群：腎功能受損者需調降劑量 ² 。	
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--

商品名	Soonmelt inj ¹							
學名	Amoxicillin + Clavulanic Acid							
劑量規格	Amoxycillin 500mg + Clavulanic acid 100mg /vial 乾粉							
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV	10 mL D/W					推注時間至少 3 ~ 4 分鐘	1. 不可以血液製劑、其他蛋白液或靜脈注射用脂肪乳劑混合使用。 2. 特殊族群：腎功能受損者需調降劑量 ² 。	泡製後： 室溫 20 分鐘 稀釋後： 室溫：4hr (D/W, N/S) 室溫：3hr (L/R, Hartmann's solution) 冷藏(<5°C)：8hr (D/W, N/S)
IV infusion	10 mL D/W		N/S, L/R, D/W, Hartmann's solution	50mL		以 30 ~ 40 分鐘緩慢滴注		

商品名	Subacillin inj ¹							
學名	Ampicillin + Sulbactam							
劑量規格	Ampicillin 1 gm+ Subactam 0.5 gm /vial 乾粉							
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	3.2 mL D/W, N/S	250+125mg /mL	250+125mg /mL			如出現疼痛，可用 0.5%無菌 lidocaine 注射溶液稀釋	1. 本品在含有葡萄糖或其他醣類溶液中較不穩定，也不可應與血液製品、蛋白質水解物混合。 2. 勿與 aminoglycoside 類抗生素混合或同時注射，為配伍禁忌。 3. IV 有可能發生靜脈炎。 4. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫：1hr
IV bolus	3.2 mL D/W, N/S	250+125mg /mL	D/W,			注射>3 分鐘		室溫：1hr
IV infusion	3.2 mL D/W, N/S	250+125mg /mL	N/S, D/W		3~45mg/mL	輸注 15~30 分鐘		室溫 45mg/ml: 8hr 冷藏 45mg/ml: 48hr 冷藏 30mg/ml: 72hr
	3.2 mL D/W, N/S	250+125mg /mL	D5W		3~45mg/mL	輸注 15~30 分鐘		室溫 15-30mg/ml: 2hr 室溫 3mg/ml: 4hr

								冷藏 30mg/ml: 4hr
	3.2 mL D/W, N/S	250+125mg /mL	L/R		3~45mg/ mL	輸注 15~30 分鐘		室溫 45mg/ml: 8hr 冷藏 45mg/ml: 24hr

商品名		Tapimycin inj ¹						
學名		Piperacillin + Tazobactam						
劑量規格		Piperacillin 2 g + Tazobactam 250 mg /vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	10 mL D/W	2000+250 mg/10mL	N/S, D5W	50 ~ 150 mL	2000mg+250mg / 50~150mL	以 > 30 分鐘速率緩慢滴 注。(給本藥輸液時，需暫停 原有之輸液給藥。)	1. 監測體溫、CBC、血球分 化數、血鉀、肝腎功能。 2. 特殊族群：腎功能受損者 需調整劑量 ² 。	室溫: 24hr 冷藏: 48hr

商品名		Targocid inj (臨採) ¹						
學名		Teicoplanin						
劑量規格		200 mg/vial 乾粉，以所附 D/W 稀釋						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液 體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IM	3mL D/W	200mg/3mL					1. 勿用力搖晃，若出現泡沫 可靜置 15 分鐘。 2. 本品與 aminoglycoside 類抗 生素不相容，不可混合或 同時注射。 3. 對 Vancomycine 過敏者應 小心使用。 4. 稀釋後應於 24 小時內使 用。監測體溫、CBC，長 期使用需注意聽力變化。 5. 特殊族群：腎功能受損者， 治療初期前 3 天不需調整 劑量，第四天起依 creatinine clearance 調整劑	室溫：立即使用 冷藏：24hr
IV bolus	3mL D/W	200mg/3mL				推注時間至少 5 分鐘 ²		
IV infusion	3mL D/W	200mg/3mL	N/S, D5W, L/R			以 30 分鐘緩慢滴注		

							量 CrCl：40-60 mL/min:每日投予半量; CrCl<40 及血液透析者: 每日投予減為每日三分之一的劑量。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

商品名		Tienam inj ¹						
學名		Imipenem + Cilastatin Sodium						
劑量規格		Imipenem 500 mg + Cilastatin 500 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	20mL N/S, D5W, D10W, D5NS	25mg/mL	N/S, D5W, D10W, D5NS	100mL	5mg/mL	劑量小於等於 500 mg 時，滴注時間約 20～30 分鐘，更大劑量的滴注時間約 40～60 分鐘。	1.若病患有意識感時應減慢滴注速率。監測體溫、CBC、肝腎功能，注意肌肉震顫或癲癇發作徵狀。 2.特殊族群：肝、腎功能受損者需調整劑量 ² 。	配製溶液室溫：4hr 配製溶液冷藏：24h 輸注溶液室溫：4hr 輸注溶液冷藏：24h

商品名		Tygacil inj 50mg (臨採) ¹						
學名		Tigecycline						
劑量規格		50mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	5.3mL N/S, D5W	10mg/mL	N/S, L/R, D5W	≥ 50mL	≤ 1mg/mL	> 30~60 分鐘	1.監測 CBC、肝功能，注意抗生素引起的腹瀉。 2.稀釋後若變色不可使用。 3.特殊族群：肝功能受損者需調整劑量 ² 。	配製溶液冷藏：48hr 配製溶液室溫：6hr 輸注之稀釋液室溫：小於 24hr (6 小時存於藥瓶內，剩餘時間存於靜脈輸注溶液袋中)

商品名	Vanco inj (臨採) ¹							
學名	Vancomycin							
劑量規格	1 gm/vial 乾粉							
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	20mL D/W	1000mg/20mL	N/S, D5W, D5NS, L/R	≥ 200mL	2.5~5mg/mL ³	1. 速率 < 10 mg/分鐘。 ³ 2. 至少以超過 60 分鐘以上時間緩慢滴注。	1. 腎衰竭和超過六十歲之患者，必須連續做聽力和血中濃度試驗。所有使用本藥之患者應定期做尿分析和血液、肝腎機能檢查。 2. 對組織有刺激性，務必採安全的靜脈注射投與途徑。肌肉注射或是不慎溢出血管外，會發生疼痛、腫痛及壞死現象。 3. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	配製溶液：冷藏 96 小時

商品名	Vancomycin inj ¹							
學名	Vancomycin							
劑量規格	1000 mg/vial 乾粉							
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	20mL D/W	1000mg/20mL	N/S, D5W, 林格乳糖注射液	≥ 200mL	2.5~5mg/mL	1. 速率 < 10 mg/分鐘 2. 兒童至少以超過 60 分鐘以上時間緩慢滴注。	4. 監測體溫、CBC、腎功能、聽覺功能，藥物血中濃度。注意輸注過快可能發生低血壓、呼吸困難、蕁麻疹。 5. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	配製溶液冷藏：14d 輸注之稀釋液室溫：17hr (D5W ⁴); 24hr (N/S ⁴) 輸注之稀釋液冷藏：96hr

商品名	Vfend inj (臨採) ¹							
學名	Voriconazole							
劑量規格	200 mg/vial 乾粉							
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限

				體積				
IV infusion	19 mL D/W	10 mg/mL	N/S, 0.45%NS, D5NS, D5W, D5 0.45%NS, D5W, Hartmann's solution, 20 mEq KCl in D5W,		0.5 ~ 5 mg/mL	給藥速度最大每小時 3mg/kg，1-2 小時內完成。	1. 不可與任何血液製劑或任何短期濃縮電解質輸液同時輸注，即使是讓兩種輸液透過不同的靜脈導管(或插管)輸注也不建議。 2. 治療之前，應先矯正電解質障礙的問題。 3. 可與全靜脈營養輸液同時輸注，但必須透過不同的導管輸注。	冷藏: 24 小時

商品名		Virless inj ¹						
學名		Acyclovir						
劑量規格		250 mg/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	10 mL D/W, N/S	25 mg/mL	N/S, 0.45%N/S, D5W, D5NS, Hartmann's solution		< 5mg/mL	慢速率輸注大於 1 小時。	1. 本品不含抗菌劑，應在使用前才配置及稀釋。 2. 使用較高劑量的患者(如疱疹性腦炎)，或患者有脫水情況時，應特別注意腎功能。 3. 特殊族群：腎功能受損者需調整劑量 ² 。	室溫: 12 小時

商品名		Zavicefta inj (臨採) ¹						
學名		Ceftazidime + Avibactam						
劑量規格		2g/0.5g/vial 乾粉						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion	10mL D/W	167.3 mg/mL 的 Ceftazidime	輸注袋：N/S, D5W, L/R		Ceftazidime 的最終濃度必須為 8-40 mg/mL	> 120 分鐘以上時間緩慢滴注。	1.劑量僅根據 Ceftazidime 成分含量。 2.調配後的溶液為淺黃色溶液，不含顆粒物質。	ceftazidime 最終濃度為 8 mg/mL：冷藏 12 小時；室溫 4 小時。

							3.待藥品溶解後，以氣體釋放針插入小瓶封口以釋放內部壓力（這對於保持藥品的無菌性很重要）。 4.從開始調配到完成製備靜脈輸注之間所經過的時間總長度不應超過 30 分鐘。 5.特殊族群：腎功能受損者需調整劑量。	其他 ceftazidime 濃度 (>8 mg/mL 至 40 mg/mL): 室溫 4 小時。
			輸液注射針筒：N/S, D5W					室溫：6 小時

商品名		Zyvox inj (臨採) ¹						
學名		Linezolid						
劑量規格		600mg/300mL/bag						
途徑	配製溶液	配製濃度	輸注之稀釋液	每瓶稀釋液體積	給藥濃度	給藥速率	注意事項	稀釋後保存期限
IV infusion						輸注時間 30 ~ 120 分鐘。	1.可能會呈現黃色，顏色會隨時間而加深，但對藥效並無不良的影響。 2.不得使用此靜脈輸注袋作一系列的聯結。 3.不得注入任何添加物。 4.如果使用相同的輸注管線連續輸注一些不同藥品時，在輸注之前及之後，應該用一與本藥及其他經由此管線輸注之藥品相容的輸注液沖洗管線。(N/S, D5W, L/R)	

縮寫定義：

時間單位	hr ：小時	day (d) ：天		
給藥方式：	IM ： intramuscular injection	IVP ： IV push		
溶液：	D/W: Distilled Water for injection	N/S: Normal Saline or 0.9% NaCl	L/R: Lactated Ringer's injection	D5W: 5 % Dextrose in Water
	D5NS: 5% Dextrose in Normal Saline	D10W: 10 % Dextrose in Water	D5 0.45%NS: 5% Dextrose in 0.45% Normal Saline	0.45%NS: Half Saline

參考資料：

1. 藥品仿單
2. Lexidrug
3. ASHP. Injectable drug information 2021 edition

配製：將原為乾粉之藥品，以**配製溶液**溶解。可直接給藥或須再進一步稀釋。

稀釋：將藥品原液或已配製溶解之藥品，加入**輸注之稀釋液**調整為適當的給藥濃度。

特殊族群：註記肝、腎功能受損、年長者需調整劑量。

參考資料：(以藥品仿單為主要參考依據)