

习题一

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每题只有一个正确答案, 答对一题得 2 分, 共 20 分)

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = m$, $\begin{vmatrix} a_{13} & a_{11} \\ a_{23} & a_{21} \end{vmatrix} = n$, 则行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} + a_{13} \\ a_{21} & a_{22} + a_{23} \end{vmatrix}$ 等于 【 】
- A. $m+n$ B. $-(m+n)$ C. $n-m$ D. $m-n$
2. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 则 A^* 中位于 (1, 2) 的元素是 【 】
- A. -6 B. 6 C. 2 D. -2
3. 设 A 是方阵, 如有矩阵关系式 $AB=AC$, 则必有 【 】
- A. $A=0$ B. $B \neq C$ 时 $A=0$ C. $A \neq 0$ 时 $B=C$ D. $|A| \neq 0$ 时 $B=C$
4. 已知 3×4 矩阵 A 的行向量组线性无关, 则秩 (A^T) 等于 【 】
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 设矩阵 A 的秩为 r , 则 A 中 【 】
- A. 所有 $r-1$ 阶子式都不为 0 B. 所有 $r-1$ 阶子式全为 0
C. 至少有一个 r 阶子式不等于 0 D. 所有 r 阶子式都不为 0
6. 设 $Ax=b$ 是一非齐次线性方程组, η_1, η_2 是其任意 2 个解, 则下列结论错误的是 【 】
- A. $\eta_1 + \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解 B. $\frac{1}{2}\eta_1 + \frac{1}{2}\eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解
C. $\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=0$ 的一个解 D. $2\eta_1 - \eta_2$ 是 $Ax=b$ 的一个解
7. 设 n 阶方阵 A 不可逆, 则必有 【 】
- A. 秩 $(A) < n$ B. 秩 $(A) = n-1$ C. $A=0$ D. 方程组 $Ax=0$ 只有零解
8. 设 A 是 n 阶方阵, 则 A 能与 n 阶对角阵相似的充要条件是 【 】.
- A. A 是对角阵 B. A 有 n 个互不相同的特征向量
C. A 有 n 个线性无关的特征向量 D. A 有 n 个互不相同的特征值
9. 设 A 是正交矩阵, 则下列结论错误的是 【 】
- A. $|A|^2$ 必为 1 B. $|A|$ 必为 1 C. $A^{-1}=A^T$ D. A 的行 (列) 向量组是正交单位向量组
10. 设 A 是实对称矩阵, C 是实可逆矩阵, $B=C^TAC$. 则 【 】
- A. A 与 B 相似 B. A 与 B 不等价 C. A 与 B 有相同的特征值 D. A 与 B 合同
- 二、填空题 (本大题共 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分。)

11. 行列式 $D = \begin{vmatrix} k & 2 & 0 \\ 1 & k+1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{vmatrix}$ 中, $k = \underline{\hspace{2cm}}$ 时, $D=0$ 。

12. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 A^{-1} 等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $|\mathbf{A}|=2$, \mathbf{A}_{ij} 表示 $|\mathbf{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式 ($i, j=1, 2, 3$), 则

$$(a_{11}A_{21}+a_{12}A_{22}+a_{13}A_{23})^2+(a_{21}A_{21}+a_{22}A_{22}+a_{23}A_{23})^2+(a_{31}A_{21}+a_{32}A_{22}+a_{33}A_{23})^2=$$

14. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价, 其中 $\beta_1=(1, 0, 0, 0)^T$, $\beta_2=(0, 1, 0, 0)^T$,

$\beta_3=(1, 1, 0, 0)^T$, 则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩为_____。

15. 设向量 $(2, -3, 5)$ 与向量 $(-4, 6, a)$ 线性相关, 则 $a=$ _____。

16. 设 \mathbf{A} 是 3×4 矩阵, 其秩为 3, 若 η_1, η_2 为 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的 2 个不同的解, 则它的通解为_____。

17. 设 \mathbf{A} 是 $m \times n$ 矩阵, \mathbf{A} 的秩为 $r(<n)$, 则 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系中含有解的个数为_____。

18. 设向量 α, β 都是单位向量, 则向量 $\alpha + \beta$ 与 $\alpha - \beta$ 的内积 $(\alpha + \beta, \alpha - \beta) =$ _____。

19. 设 3 阶矩阵 \mathbf{A} 的行列式 $|\mathbf{A}|=8$, 已知 \mathbf{A} 有 2 个特征值 -1 和 4 , 则另一特征值为_____。

20. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 6 \\ 1 & -3 & -3 \\ -2 & 10 & 8 \end{pmatrix}$, 已知 $\alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 是它的一个特征向量, 则 α 所对应的特征值为_____。

三、计算题 (本大题共 4 小题, 共 42 分)

21. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$, 求 $(\mathbf{A}^*)^{-1}$ 。(8 分)

22. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求矩阵 \mathbf{B} 使其满足矩阵方程 $\mathbf{AB}=\mathbf{A}+2\mathbf{B}$ 。(8 分)

23. 求方程组 $\begin{cases} x_1 + x_3 = -3 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = -4 \\ x_1 - x_2 + 3x_3 = -1 \end{cases}$ 的通解。(12 分)

24. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$, 求正交变换 $\mathbf{X}=\mathbf{PY}$ 化该二次型为标准形。(14 分)

四、证明题:

25. 设 η_0 是非齐次线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的一个特解, ξ_1, ξ_2 是其导出组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 的一个基础解系。试证明: $\eta_0, \eta_0+\xi_1, \eta_0+\xi_2$ 线性无关。(8 分)

26. 已知 \mathbf{A} 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明: $\mathbf{A}^T\mathbf{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件为 秩 $(\mathbf{A}) = n$ 。(8 分)

习题二

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每题只有一个正确答案, 答对一题得 2 分, 共 20 分)

1. 设 A 是 4 阶矩阵, 则 $|-A| =$ 【 】

- A. $-4|A|$ B. $-|A|$ C. $|A|$ D. $4|A|$

2. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 下列运算中正确的是 【 】

- A. $(2A)^T = 2A^T$ B. $(3A)^{-1} = 3A^{-1}$ C. $[(A^T)^T]^{-1} = [(A^{-1})^{-1}]^T$ D. $(A^T)^{-1} = A$

3. 设 2 阶方阵 A 可逆, 且 $A^{-1} = \begin{pmatrix} -3 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ 【 】

- A. $\begin{pmatrix} -2 & 7 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & -7 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则下列向量组线性无关的是 【 】

- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 + \alpha_2$ B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2$
C. $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$ D. $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

5. 向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 0), \alpha_2 = (0, 0, 1)$, 下列向量中可以由 α_1, α_2 线性表出的是 【 】

- A. $(2, 0, 0)$ B. $(-3, 2, 4)$ C. $(1, 1, 0)$ D. $(0, -1, 0)$

6. 设 A, B 均为 3 阶矩阵, 若 A 可逆, 秩 $(B) = 2$, 那么秩 $(AB) =$ 【 】

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

7. 设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 与 n 阶单位矩阵等价, 那么方程组 $Ax = b$ 【 】

- A. 无解 B. 有唯一解 C. 有无穷多解 D. 解的情况不能确定

8. 在 \mathbb{R}^3 中, 与向量 $\alpha_1 = (1, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, 1)$ 都正交的单位向量是 【 】

- A. $(-1, 0, 1)$ B. $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)$ C. $(1, 0, -1)$ D. $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)$

9. 下列矩阵中, 为正定矩阵的是 【 】

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

10. 已知 A 是 n 阶实对称矩阵, $A^2 = A$, 秩 $(A) = n$, 则 $x^T A x$ 是 【 】

- A. 正定二次型 B. 负定二次型 C. 既不正定也不负定 D. 无法判断

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每题 3 分, 共 30 分。)

11. 行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} =$ _____。

12. 设行矩阵 $A = (a_1 \ a_2 \ a_3)$, $B = (b_1 \ b_2 \ b_3)$, 且 $A^T B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB^T =$ _____。

13. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|2A^*| =$ _____。

14. 当向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)$, $\alpha_2 = (2, 2, 2)$, $\alpha_3 = (3, 0, t)$ 线性相关时, $t =$ _____。

15. 若 3 元齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含 2 个解向量, 则矩阵 A 的秩等于_____。

16. 矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的秩等于_____。

17. 设 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解, 又已知 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2$ 也是 $Ax=b$ 的解, 则 $k_1+k_2 =$ _____。

18. 已知 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则矩阵 A 的属于特征值 $\lambda = -1$ 的特征向量是_____。

19. 设 A 为 n 阶方阵, 已知矩阵 $E-A$ 不可逆, 那么矩阵 A 必有一个特征值为_____。

20. 实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ 所对应的二次型 $x^T Ax =$ _____。

三、计算题 (本大题共 4 小题, 共计 42 分)

21. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $AB=A+2B$, 求 B 。(8 分)

22. 设向量 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T$ 和 $\alpha_2 = (1, 1, 2)^T$ 都是方阵 A 的属于特征值 $\lambda = 2$ 的特征向量, 又向量 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2$, 求 $A^2\beta$ 。(8 分)

23. 给定向量组 $\alpha_1 = (-2, 1, 0, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, -3, 2, 4)^T$, $\alpha_3 = (3, 0, 2, -1)^T$, $\alpha_4 = (0, -1, 4, 9)^T$.
试判断 α_4 是否为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合; 若是, 则求出组合系数。(12 分)

24. 设已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 求正交矩阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。(14 分)

四、证明题

25. 设 η_0 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的一个特解, $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是其导出组 $Ax=0$ 的一个基础解系。

试证明: $\eta_0, \eta_0 + \xi_1, \eta_0 + \xi_2, \dots, \eta_0 + \xi_r$ 线性无关。(8 分)

26. 已知 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明: $A^T A$ 是正定矩阵的充分必要条件为 秩 $(A) = n$ 。

习题三:

一、单项选择题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。)

1. 设 A 是 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, 则 $|-A|$ = 【 】

- A. -6 B. -2 C. 2 D. 6

2. 设 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, 则 A 的伴随矩阵 $A^* =$ 【 】

- A. $\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} -d & c \\ b & -a \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} -d & b \\ c & -a \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}$

3. A 是 n 阶方阵, 且 A 的第一行可由其余 $n-1$ 个行向量线性表示, 则下列结论中错误的是 【 】

- A. $r(A) \leq n-1$ B. A 有一个列向量可由其余列向量线性表示
C. $|A|=0$ D. A 的 $n-1$ 阶余子式全为零

4. 设 A 为 n 阶方阵, $AB=0$, 且 $B \neq 0$, 则 【 】

- A. A 的列向量组线性无关 B. $A=0$
C. A 的列向量组线性相关 D. A 的行向量组线性无关

5. 设 α_1, α_2 是非齐次线性方程组 $Ax=b$ 的解, β 是对应齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解, 则 $Ax=b$ 必有一个解是 【 】

- A. $\alpha_1 + \alpha_2$ B. $\alpha_1 - \alpha_2$ C. $\beta + \alpha_1 + \alpha_2$ D. $\beta + \frac{1}{3}\alpha_1 + \frac{2}{3}\alpha_2$

6. 设齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系含有一个解向量, 当 A 是 3 阶方阵时, 【 】

- A. $r(A)=0$ B. $r(A)=1$ C. $r(A)=2$ D. $r(A)=3$

7. 设 A 与 B 等价, 则 【 】

- A. A 与 B 合同 B. A 与 B 相似 C. $|A|=|B|$ D. $r(A)=r(B)$

8. 已知 A 相似于 $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ 【 】

- A. -2 B. -1 C. 0 D. 2

9. 设 λ_0 是可逆阵 A 的一个特征值, 则 A^{-2} 必有一个特征值是 【 】

- A. $\frac{\lambda_0}{2}$ B. $\frac{1}{2\lambda_0}$ C. $\frac{1}{\lambda_0^2}$ D. $\frac{2}{\lambda_0}$

10. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值分别为 1, 0, -1 , 则 【 】

- A. $|A| \neq 0$ B. $|A|=0$ C. A 负定 D. A 正定

二、填空题 (本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。)

1. 按自然数从小到大为标准次序, 则排列 54123 的逆序数 = _____。

2. $\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 0 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$ 3. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 4)$, $\alpha_2 = (-1, -2, y)$ 且 α_1 与 α_2 线性相关, 则 $y = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 且可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 则 $s \underline{\hspace{1cm}} t$.
(填 \geq 或 \leq)

6. 若 A 是秩为 1 的三阶方阵, η_1, η_2, η_3 是 $Ax=b$ 的解, 且 $\eta_1 - \eta_2$ 与 $\eta_2 - \eta_3$ 无关,

则 $Ax=b$ 的通解可表示为 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}.$

8. 若向量 $\alpha = (1, -2, 1)$ 与 $\beta = (2, 3, t)$ 正交, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

9. 已知三阶实对称矩阵 A 有三个特征值 2, 1, -2, $B = A^2 + 2E$, 则 B 的特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_1x_2 + 3x_1x_4 - 5x_4^2$ 的对称矩阵是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、计算题 (本大题共 50 分)

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 且 $AB = A + 2B$, 求 B . (10 分)

2. 讨论 p 取何值时, 下列线性方程组无解? 有解? 并在有解时求其通解.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = p \end{cases} \quad (14 \text{ 分})$$

3. 已知 $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{bmatrix}$ 的一个特征向量是 $\zeta = (1, 1, -1)^T$, 确定 a, b 以及 ζ 的特征值.

(10 分)

4. 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ 为标准型, 并写出所用的正交变换. (16 分)

四、证明题

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3$ 也线性无关.

2. 设 A 与 B 都是 n 阶正定矩阵, 证明: $A+B$ 也是正定矩阵.

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。）

A. $k \neq -1$ B. $k \neq 3$ C. $k \neq -1$ 且 $k \neq 3$ D. $k \neq -1$ 或 $k \neq 3$

A. a B. a^2 C. a^3 D. a^4

A. $|AB|=|BA|$
B. $|A+B|=|A|+|B|$
C. $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$
D. $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$

A. 存在 B 使 AB=E
B. |A|≠0
C. A 相似于对角阵
D. A 的 n 个列向量线性无关

A. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$

A. 秩(A)>k B. 秩(A)≥k C. 秩(A)=k D. 秩(A)≤k

则 $Ax=b$ 必有一个解是【 】

8. 若 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x \end{bmatrix}$ 与 $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$ 相似, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

A. $|A| \neq 0$ B. $|A| = 0$ C. A 负定 D. A 正定

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分。)

11. 设 A, B 均为三阶可逆阵, $|A|=2$, 则 $|2B^{-1}A^2B|$ = _____。

12. 在五阶行列式中, 项 $a_{21} a_{32} a_{45} a_{14} a_{53}$ 的符号为 _____。

13. 向量空间 $V = \{x = (x_1, x_2, 0) \mid x_1, x_2 \text{ 为实数}\}$ 的维数为 _____。

14. 设三阶方阵 A 等价于 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $R(A)$ = _____。

15. 设 $\alpha_1 = [1, 2, x], \alpha_2 = [-2, -4, 1]$ 线性相关, 则 x = _____。

16. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} [1 \quad -1 \quad 1]$ 的秩为 _____。

17. 设 λ_0 是可逆阵 A 的一个特征值, 则 A^{-2} 必有一个特征值是 _____。

18. 已知齐次方程组 $A_{4 \times 5} x = 0$ 的基础解系含有 2 个向量, 则 A 的秩 = _____。

19. 若向量 $\alpha = (1, -2, 1)$ 与 $\beta = (2, 3, t)$ 正交, 则 t = _____。

20. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2x_3$ 的矩阵是 _____。

三、计算题 (本大题共 50 分)

1. 设 $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$, 求 $(A+2E)^{-1}(A^2-4E)$ 。(10 分)

2. 讨论 a 为何值时下列方程组无解? 有无穷解? 并在有解时求其通解。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 + x_2 + x_3 + 4x_4 = a \\ x_1 - x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 1 \end{cases} \quad (14 \text{ 分})$$

3. 设 $A = \begin{bmatrix} x & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ 的特征值是 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 4$ 。

(1) 求 x 的值; (2) A 是否相似于对角阵, 为什么? (10 分)

4. 用正交变换化二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_2x_3$ 为标准型,

并写出所用的正交变换。(16 分)

四、证明题 (每题 5 分, 共 10 分)

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 证明 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_2, \alpha_3$ 也线性无关。

2. 设 A 与 B 都是 n 阶正定矩阵, 证明: $A+B$ 也是正定矩阵。