

# 《信号检测与估计》作业二\*

施念 1120161302

April 12, 2019

## 一 第 2 章 检测基本理论

1. 根据  $N$  个独立样本, 设计一个似然比检验, 对下列假设进行选择

$$H_0 : z(t) = n(t)$$

$$H_1 : z(t) = 1 + n(t)$$

$$H_2 : z(t) = -1 + n(t)$$

其中  $n(t)$  是零均值、方差  $\sigma^2$  的高斯过程。假定各假设的先验概率相等, 正确判断无代价, 任何错误的代价相同。证明检验统计量可选为  $l(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$ 。求  $l(z)$  的判决区域。

解:

根据各假设的先验概率相等以及代价因子的特性, 三元假设检验可按照最大似然准则来设计。

$N$  维观测矢量的似然函数为

$$\begin{aligned} p(\mathbf{z}|H_i) &= \prod_{k=1}^N P(z_k|H_i) \\ &= \left( \frac{1}{2\pi\sigma_n^2} \right)^{\frac{N}{2}} \exp \left[ -\sum_{k=1}^N \frac{(z_k - s_i)^2}{2\sigma_n^2} \right], s_i(i) = 0(0), 1(1), -1(2) \end{aligned}$$

似然比为

$$\Lambda(x) = \frac{p(x|H_i)}{p(x|H_j)} \underset{H_i}{\overset{H_j}{\geq}} 1$$

因此三元假设判决规则等价于选择最大的

$$\frac{2s_i}{N} \sum_{k=1}^N z_k - s_i^2 \quad i = 0, 1, 2$$

故对检验统计量  $\hat{z} = l(z) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N z_i$ , 判决区域为:

$$\begin{aligned} l(z) &\leq -0.5, \text{ 判断 } H_2 \text{ 成立} \\ -0.5 &\leq l(z) \leq 0.5, \text{ 判断 } H_0 \text{ 成立} \\ l(z) &\geq 0.5, \text{ 判断 } H_1 \text{ 成立} \end{aligned}$$

---

\*习题 2.1 2.2 2.3 2.4

2. 根据一次观测，用极大极小化检验来对下面两个假设做出判断。

$$H_0 : z(t) = 1 + n(t)$$

$$H_1 : z(t) = n(t)$$

假定  $n(t)$  是具有零均值和功率  $\sigma^2$  的高斯过程，以及  $C_{00} = C_{11} = 0$ ,  $C_{01} = C_{10} = 1$ 。根据观测结果给出的门限是什么？答案意味着每一个假设的先验概率是多少？

解：

因为  $C_{00} = C_{11} = 0$ ,  $C_{01} = C_{10} = 1$ ，所以对代价函数有

$$C(P_1, P_{1g}) = (1 - P_1)P_F(P_{1g}) + P_M(P_{1g})P_1$$

求导并令结果为 0 得

$$P_F(P_{1g}) = P_M(P_{1g})$$

由题目可知，当  $P_F(P_{1g}) = P_M(P_{1g})$  时，门限  $\lambda = (1 + 0)/2 = 0.5$ 。此时意味着每一个假设的先验概率相等都为  $1/2$

3. 若题 2.2 假定  $C_{10} = 3, C_{01} = 6$ 。

(1) 每个假设的先验概率为何值时达到最大的可能代价？

解：

根据 2.2，可知，当  $C_{10} = 3, C_{01} = 6$  时，欲使代价最小，有

$$P_F(P_{1g}) = 2P_M(P_{1g})$$

即

$$P(H_1|H_0) = 2P(H_0|H_1)$$

结合

$$P(H_1|H_0) = \frac{P(H_0|H_1)P(H_1)}{P(H_0)}$$

$$P(H_1) + P(H_0) = 1$$

可知先验概率为

$$\begin{cases} P(H_1) = \frac{2}{3} \\ P(H_0) = \frac{1}{3} \end{cases}$$

此时达到最大的可能代价

(2) 根据一次观测的判决区域如何？

根据上式可知

$$\frac{p(x|H_1)}{p(x|H_0)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \frac{(C_{10} - C_{00})P(H_0)}{(C_{01} - C_{11})P(H_1)} = \frac{3 \times \frac{1}{3}}{6 \times \frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$$

因为

$$\frac{p(x|H_1)}{p(x|H_0)} = e^{[-\frac{x^2 - (x-1)^2}{2\sigma^2}]} = e^{(-2x+1)/(2\sigma^2)}$$

所以，有

$$e^{(-2x+1)/(2\sigma^2)} \underset{H_0}{\overset{H_1}{\geq}} \frac{1}{4}$$

化简得

$$x \underset{H_1}{\overset{H_0}{\geq}} \frac{1}{2} + \sigma^2 \ln 4$$

判决区域为 ( $z$  为一次观测量):

$$z \leq \frac{1}{2} + \sigma^2 \ln 4, \text{ 判断 } H_1 \text{ 成立}$$

$$z \geq \frac{1}{2} + \sigma^2 \ln 4, \text{ 判断 } H_0 \text{ 成立}$$

4. 证明二元假设检验贝叶斯平均代价  $\bar{C}$  可表示为

$$\begin{aligned} \bar{C} = & C_{00} + (C_{10} - C_{00})P(H_1|H_0) + P(H_1)[(C_{11} - C_{00}) + \\ & (C_{01} - C_{11})P(H_0|H_1) - (C_{10} - C_{00})P(H_1|H_0)] \end{aligned}$$

解:

对于二元假设检验, 有

$$P(H_1) = 1 - P(H_0) \quad P(H_0) = 1 - P(H_1)$$

$$P(H_0|H_0) = 1 - P(H_1|H_0) = 1 - P_F$$

$$P(H_1|H_1) = 1 - P(H_0|H_1) = 1 - P_M$$

所以对贝叶斯平均代价  $\bar{C}$ , 有

$$\begin{aligned} \bar{C} = & C_{00}P(H_0)P(H_0|H_0) + C_{01}P(H_1)P(H_0|H_1) + \\ & C_{10}P(H_0)P(H_1|H_0) + C_{11}P(H_1)P(H_1|H_1) \\ = & C_{00}[1 - P(H_1)](1 - P_F) + C_{01}P(H_1)P_M + \\ & C_{10}[1 - P(H_1)]P_F + C_{11}P(H_1)(1 - P_M) \\ = & C_{00} + (C_{10} - C_{00})P_F + P(H_1)(P_F C_{00} - C_{00} \\ & + C_{01}P_M - C_{10}P_F + C_{11} - C_{11}P_M) \\ = & C_{00} + (C_{10} - C_{00})P_F + P(H_1)[(C_{11} - C_{00}) \\ & + (C_{01} - C_{11})P_M - (C_{10} - C_{00})P_F] \\ = & C_{00} + (C_{10} - C_{00})P(H_1|H_0) + P(H_1)[(C_{11} - C_{00}) + \\ & (C_{01} - C_{11})P(H_0|H_1) - (C_{10} - C_{00})P(H_1|H_0)] \end{aligned}$$

证毕