



黄曲条跳甲幼虫危害萝卜肉质根 3

生活习性：南方1年发生7～8代，浙江、上海6～7代，华中5～7代，北方3～5代。在华南及福建漳州等地无越冬现象，可终年繁殖。以成虫在田间与沟边的残株落叶、杂草及土缝中越冬。越冬成虫于3月中下旬开始出蛰活动，4月上旬开始产卵，以后每月发生1代。因成虫寿命长，致使世代重叠。春季第一、二代和秋季第五、六代为主害代，秋季重于春季。成虫具趋光、趋黄、趋绿性，耐饥力很强，夜间隐蔽。偏嗜十字花科蔬菜，十字花科蔬菜连作受害重。

防治方法：①十字花科蔬菜和其他类蔬菜轮作，可减轻危害。②清除菜地残株落叶，铲除杂草，消除其越冬场所和食料基地，以减少虫源。③秋、冬季深翻，消灭越冬成虫。④土壤处理。在播种或定植前后用撒毒土、淋施药液法处理土壤，毒杀土壤中的幼虫和蛹。每亩可用5%辛硫磷颗粒剂2～3千克，或1%联苯·噻虫胺颗粒剂4～5千克，撒施或穴施；也可用30%氯虫·噻虫嗪悬浮剂1500～2000倍液，或25%噻虫嗪水分散粒剂3000～5000倍液，或70%吡虫啉可湿性粉剂10000倍液，在苗床进行灌根或喷淋。⑤生长期叶面喷施抓住春夏季的发生始盛期和秋冬季的发生盛期两个重要时期，掌握苗期早治。在成虫开始活动尚未产卵时，重点在苗期，幼苗出土后发现被害，每株菜有成虫2～3头时立即用药。药剂可选用5%氯虫苯甲酰胺悬浮剂1500倍液，或10%溴氰虫酰胺可分散油悬浮剂1500～2000倍液，或28%杀虫·啉虫脒可湿性粉剂1200～1500倍液，或20%啉虫·啉虫脒微乳剂2000～3000倍液，或22.5%氯氟·啉虫脒乳油1500～2000倍液，或10%氯氰菊酯乳油1500倍液。成虫善跳跃，活动性强，应在成虫活动盛期（春秋季节在中午前后，夏季在早晨和傍晚）用药。

采用包围式喷药，即应从田四周向中央喷，防止成虫逃走。喷药作业时动作宜轻，勿惊扰成虫。

小猿叶甲与大猿叶甲²



小猿叶甲与大猿叶甲均属鞘翅目叶甲科，是寡食性害虫，主要危害十字花科蔬菜，嗜食白菜、萝卜、花椰菜、芥菜等。小猿叶甲与大猿叶甲常混合发生。

形态特征：见下表。⁵

小猿叶甲与大猿叶甲形态特征比较⁶

	小猿叶甲	大猿叶甲
成虫	体近圆形，蓝黑色，有明显金属光泽，小盾片近圆形，有小刻点；鞘翅上有细密点刻，排成11行，后翅退化，不能飞翔	体椭圆形，暗蓝黑色，略有金属光泽，小盾片三角形，光滑无刻点；前胸背板及鞘翅上有刻点，后翅发达，能飞翔
卵	长椭圆形，一端较钝，暗黄色	长椭圆形，橙黄色
幼虫	初孵幼虫淡黄色，后变褐色，头黑色有光泽，各体节具黑色肉瘤8个，其上有刚毛。沿亚背线的一行肉瘤最大，越向下越小	头黑色，体灰黑带黄色，各体节有大小不等的黑色肉瘤20个左右，气门下线及基线上肉瘤最显著
蛹	近半球形，淡黄色。体上生褐色短毛，尾端不分叉	近半球形，黄色至黄褐色。体略大，被刚毛，尾端分叉，淡紫色



小猿叶甲成虫⁹



小猿叶甲低龄幼虫¹¹



小猿叶甲幼虫及危害状 2



小猿叶甲高龄幼虫 4



大猿叶甲成虫 6



大猿叶甲幼虫 8

危害状：成虫和幼虫均食叶片，并且群聚危害，把叶吃成许多圆孔，虫口多时，致使叶片千疮百孔，严重时吃成网状，仅留叶脉，残留的叶脉成扫把状。虫粪污染叶片，降低品质。



小猿叶甲幼虫危害萝卜 11



小猿叶甲低龄幼虫危害白菜 13