

采用包围式喷药，即应从田四周向中央喷，防止成虫逃走。喷药作业时动作宜轻，勿惊扰成虫。

小猿叶甲与大猿叶甲²



小猿叶甲与大猿叶甲均属鞘翅目叶甲科，是寡食性害虫，主要危害十字花科蔬菜，嗜食白菜、萝卜、花椰菜、芥菜等。小猿叶甲与大猿叶甲常混合发生。

形态特征：见下表。⁵

小猿叶甲与大猿叶甲形态特征比较⁶

	小猿叶甲	大猿叶甲
成虫	体近圆形，蓝黑色，有明显金属光泽，小盾片近圆形，有小刻点；鞘翅上有细密点刻，排成11行，后翅退化，不能飞翔	体椭圆形，暗蓝黑色，略有金属光泽，小盾片三角形，光滑无刻点；前胸背板及鞘翅上有刻点，后翅发达，能飞翔
卵	长椭圆形，一端较钝，暗黄色	长椭圆形，橙黄色
幼虫	初孵幼虫淡黄色，后变褐色，头黑色有光泽，各体节具黑色肉瘤8个，其上有刚毛。沿亚背线的一行肉瘤最大，越向下越小	头黑色，体灰黑带黄色，各体节有大小不等的黑色肉瘤20个左右，气门下线及基线上肉瘤最显著
蛹	近半球形，淡黄色。体上生褐色短毛，尾端不分叉	近半球形，黄色至黄褐色。体略大，被刚毛，尾端分叉，淡紫色



小猿叶甲成虫⁹



小猿叶甲低龄幼虫¹¹