

数学クォータ科目「応用解析」第 5 回 / ベクトル解析 (5)

# 面積分

佐藤 弘康 / 日本工業大学 共通教育学群

# 前回のキーワードと今回の授業で理解してほしいこと

## 前回のキーワード

- 空間曲線の線素
- 曲線に沿ったスカラー場とベクトル場の線積分

## 今回の授業で理解してほしいこと


- **曲面**（2変数ベクトル関数）の**法単位ベクトル**と**面積素**
- スカラー場の**面積分**
- ベクトル場の**面積分**

## 2変数ベクトル関数


- 変数  $u, v$  の値を決めると、その値に応じてベクトル  $r(u, v)$  がただ一つ定まるとき、 $r(u, v)$  を独立変数  $u, v$  の（2変数）ベクトル関数という；

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v) = x(u, v) \mathbf{i} + y(u, v) \mathbf{j} + z(u, v) \mathbf{k}$$

- $\mathbf{r}(u, v)$  の始点を原点  $O$  に固定すると、 $\mathbf{r}(u, v)$  の終点  $P$  は一般に1つの曲面を描く（今後は、2変数ベクトル関数と曲面を同一視して扱う）。




ベクトル関数  $\mathbf{r}(u, v)$




曲面  $\mathbf{r}(u, v)$

# 曲面の座標曲線

- 曲面  $r(u, v) = x(u, v) \mathbf{i} + y(u, v) \mathbf{j} + z(u, v) \mathbf{k}$  に対し,  $v = b$  を固定すると 1 変数ベクトル関数  $u \mapsto r(u, b) = x(u, b) \mathbf{i} + y(u, b) \mathbf{j} + z(u, b) \mathbf{k}$  が定まる. このようにして定まる曲線を  $u$  曲線という.
- 同様に,  $v$  曲線も定まる.
- $r(u, v)$  を偏微分した  $\frac{\partial r}{\partial u}(a, b)$ ,  $\frac{\partial r}{\partial v}(a, b)$  は座標曲線の接ベクトル.




曲面の座標曲線




各座標曲線の接ベクトル

# 曲面の法単位ベクトル

- 2変数ベクトル関数  $r(u, v)$  を曲面というときは,  $\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \neq 0$  を仮定.
- $n = \frac{1}{\left| \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right|} \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v}$  を曲面の法単位ベクトルという.



各座標曲線の接ベクトル



曲面の法単位ベクトル

# 曲面の例 (1) 球面

例題)  $r(u, v) = \cos u \cos v \mathbf{i} + \sin u \cos v \mathbf{j} + \sin v \mathbf{k}$ , ( $0 \leq u \leq 2\pi$ ,  $-\pi/2 \leq v \leq \pi/2$ )

の法単位ベクトル  $n(u, v)$  を求めよ. (答え)  $n(u, v) = r(u, v)$

(解)

- $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = -\sin u \cos v \mathbf{i} + \cos u \cos v \mathbf{j}$
- $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = -\cos u \sin v \mathbf{i} - \sin u \sin v \mathbf{j} + \cos v \mathbf{k}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -\sin u \cos v & \cos u \cos v & 0 \\ -\cos u \sin v & -\sin u \sin v & \cos v \end{vmatrix} \\ &= \cos u \cos^2 v \mathbf{i} - (-\sin u \cos^2 v) \mathbf{j} \\ &\quad + (\sin^2 u \cos v \sin v - (-\cos^2 u \cos v \sin v)) \mathbf{k} \\ &= \cos u \cos^2 v \mathbf{i} + \sin u \cos^2 v \mathbf{j} + \cos v \sin v \mathbf{k} \end{aligned}$$

$$\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| = \sqrt{\cos^2 u \cos^4 v + \sin^2 u \cos^4 v + \cos^2 v \sin^2 v} = \cos v$$

## 曲面の例 (2) 2変数関数のグラフ曲面 $z = f(x, y)$

- 2変数関数  $f(x, y)$  に対し, 曲面  $\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + f(u, v) \mathbf{k}$  が定まる.
- これは,  $z = f(x, y)$  のグラフである.

- $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \mathbf{i} + f_u(u, v) \mathbf{k}, \quad \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \mathbf{j} + f_v(u, v) \mathbf{k}.$

- $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_u(u, v) \\ 0 & 1 & f_v(u, v) \end{vmatrix} = -f_u(u, v) \mathbf{i} - f_v(u, v) \mathbf{j} + \mathbf{k}$

- $\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| = \sqrt{f_u(u, v)^2 + f_v(u, v)^2 + 1}$

- 法単位ベクトルは,  $\mathbf{n}(u, v) = \frac{1}{\sqrt{f_u(u, v)^2 + f_v(u, v)^2 + 1}} (-f_u(u, v) \mathbf{i} - f_v(u, v) \mathbf{j} + \mathbf{k}) .$

## 曲面の例 (3) 平面

例題)  $x + y + z = 1$  ( $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ ) を満たす点の全体を考える. (1) この図形を  $z = f(x, y)$  のグラフ曲面とみて, 法単位ベクトルを求めよ. また, (2) どのような図形であるか考察せよ.

(1) ○  $z = 1 - x - y$  より, 曲面  $r(u, v) = u i + v j + (1 - u - v) k$  とみる.

○  $\left| \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right| = \sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{3}$

○ 法単位ベクトルは  $n(u, v) = \frac{1}{\sqrt{3}}(i + j + k)$  である.

(2) ○ 法単位ベクトルが定ベクトルである.

このような性質を満たす曲面は平面である.

○ 各座標軸との交点は  $(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)$  である.

○  $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$  なので, 3点を頂点とする三角形領域である.





# 曲面の面積素

- 曲面  $S : \mathbf{r}(u, v)$  に対し,  $dS := \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$  を面積素という.

- 面積素の意味：

曲面上の4点  $\mathbf{r}(u, v)$ ,  $\mathbf{r}(u + du, v)$ ,  $\mathbf{r}(u + du, v + dv)$ ,  $\mathbf{r}(u, v + dv)$  を頂点とする矩形領域の面積を  $S$  とすると,

$$S \doteq \left( \begin{array}{l} \mathbf{r}(u + du, v) - \mathbf{r}(u, v) \text{ と } \mathbf{r}(u, v + dv) - \mathbf{r}(u, v) \text{ を} \\ 2 \text{ 辺とする平行四辺形の面積} \end{array} \right)$$



# 曲面の面積素

- 曲面  $S : \mathbf{r}(u, v)$  に対し,  $dS := \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$  を面積素という.

- 面積素の意味:

曲面上の4点  $\mathbf{r}(u, v)$ ,  $\mathbf{r}(u + du, v)$ ,  $\mathbf{r}(u + du, v + dv)$ ,  $\mathbf{r}(u, v + dv)$  を頂点とする矩形領域の面積を  $S$  とすると,

$$\begin{aligned} S &\doteq \left( \begin{array}{l} \mathbf{r}(u + du, v) - \mathbf{r}(u, v) \text{ と } \mathbf{r}(u, v + dv) - \mathbf{r}(u, v) \text{ を} \\ 2 \text{ 辺とする平行四辺形の面積} \end{array} \right) \\ &= |(\mathbf{r}(u + du, v) - \mathbf{r}(u, v)) \times (\mathbf{r}(u, v + dv) - \mathbf{r}(u, v))| \\ &= \left| \frac{\mathbf{r}(u + du, v) - \mathbf{r}(u, v)}{du} \times \frac{\mathbf{r}(u, v + dv) - \mathbf{r}(u, v)}{dv} \right| du dv \\ &\doteq \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv \end{aligned}$$

# 曲面の面積素

- 曲面  $S : \mathbf{r}(u, v)$  に対し,  $dS := \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$  を面積素という.
  - $\mathbf{r}(u, v)$  の定義域が  $uv$  平面内の領域  $D$  であるとき,

$$\iint_D dS = \iint_D \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$$

は曲面の面積を与える.

- 一方,  $d\mathbf{S} := \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} du dv$  をベクトル面積素という.

$$d\mathbf{S} = \frac{1}{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|} \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv = \mathbf{n} dS$$

# スカラー場の面積分

## 定義

$uv$  平面内の領域  $D$  で定義された曲面  $S : \mathbf{r}(u, v)$  と, 曲面  $S$  を含む空間内の領域で定義されたスカラー場  $\varphi(x, y, z)$  に対し,

$$\int_S \varphi dS := \iint_D \varphi(\mathbf{r}(u, v)) \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv$$

を「曲面  $S$  上での  $\varphi$  の面積分」と言う.

# スカラー場の面積分の計算手順

$$\int_S \varphi dS := \iint_{\substack{(2) \\ D}} \underbrace{\varphi(\mathbf{r}(u, v))}_{(4)} \underbrace{\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|}_{(3)} du dv$$

- 1) 曲面  $S$  を表すベクトル関数  $\mathbf{r}(u, v)$  を定める.
- 2)  $\mathbf{r}(u, v)$  の定義域  $D$  を表す不等式を求める (累次積分の式にするため) .
- 3) 偏微分の外積  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$  を計算し, その大きさ  $\left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right|$  を求める.
- 4) スカラー場  $\varphi$  に  $\mathbf{r}$  を代入した式  $\varphi(\mathbf{r}(u, v))$  を求める.
- 5) 3) と 4) の積を  $D$  上で 2重積分 する.

# スカラー場の面積分の計算例

- 教科書 p.100 問題 3. (1)

- スカラー場  $\varphi(x, y, z) = x + y + z$

- 曲面  $S : 2x + 2y + z = 4 \ (x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0)$

1)  $S$  の式は  $z = 4 - 2x - 2y$  と書けるので, グラフ曲面のベクトル関数

$$\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + (4 - 2u - 2v) \mathbf{k}$$

として考える.

2) これまでの議論から, この曲面は平面である. 各座標軸との交点 (2つの座標を 0 としたときの残りの座標の値) を求めると,  $(2, 0, 0)$ ,  $(0, 2, 0)$ ,  $(0, 0, 4)$  であるから,  $S$  はこれら 3 点を頂点とする三角形領域である.  $\mathbf{r}(u, v)$  の定義域は,  $uv$  平面内の原点,  $(2, 0)$ ,  $(0, 2)$  を頂点とする三角形領域なので,  $D : 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 2 - u$  と表すことができる.

# スカラー場の面積分の計算例

$$3) \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = i - 2k, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = j - 2k \text{ より, } \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 2i + 2j + k.$$

$$\text{よって, } \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1} = \sqrt{9} = 3.$$

$$4) \varphi(\mathbf{r}(u, v)) = \varphi(u, v, 4 - 2u - 2v) = u + v + (4 - 2u - 2v) = 4 - u - v.$$

5) 以上のことから, 面積分を計算すると,

$$\begin{aligned} \int_S \varphi dS &= \iint_D \varphi(\mathbf{r}(u, v)) \left| \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right| du dv = \int_0^2 \left( \int_0^{2-u} 3(4 - u - v) dv \right) du \\ &= 3 \int_0^2 \left[ (4 - u)v - \frac{v^2}{2} \right]_0^{2-u} du = 3 \int_0^2 \left( 6 - 4u + \frac{u^2}{2} \right) du \\ &= 3 \left[ 6u - 2u^2 + \frac{u^3}{6} \right]_0^2 = 16. \end{aligned}$$

# ベクトル場の面積分

## 定義

$uv$  平面内の領域  $D$  で定義された曲面  $S : \mathbf{r}(u, v)$  と, 曲面  $S$  を含む空間内の領域で定義されたベクトル場  $\mathbf{A}(x, y, z)$  に対し,

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} := \int_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_D \mathbf{A}(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) du dv$$

を「曲面  $S$  上での  $\mathbf{A}$  の面積分」と言う.

**注** ベクトル場  $\mathbf{A}$  を流体の速度ベクトルとみるとき, 面積分  $\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$  の値は「単位時間に曲面  $S$  を通過する流体の量」と解釈することができる.



# ベクトル場の面積分の計算手順

$$\int_S A \cdot dS = \iint_{\substack{(2) \\ D}} \underbrace{A(r(u, v))}_{(4)} \cdot \underbrace{\left( \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right)}_{(3)} dudu$$

- 1) 曲面  $S$  を表すベクトル関数  $\mathbf{r}(u, v)$  を定める.
- 2)  $\mathbf{r}(u, v)$  の定義域  $D$  を表す不等式を求める (累次積分の式にするため) .
- 3) 偏微分の外積  $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}$  を計算する.
- 4) ベクトル場  $A$  に  $r$  を代入したベクトル  $\mathbf{A}(\mathbf{r}(u, v))$  を求める.
- 5) 3) と 4) の内積を求める.
- 6) 5) を  $D$  上で 2重積分 する.

# ベクトル場の面積分の計算例

- 教科書 p.102 演習問題 II-3 [A] 15(1)

- ベクトル場  $A(x, y, z) = 2x\mathbf{i} - y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

- 曲面  $S : z = 1 - x - y$  ( $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ )

1)  $S$  の式より  $\mathbf{r}(u, v) = u\mathbf{i} + v\mathbf{j} + (1 - u - v)\mathbf{k}$  として考える.

2) これまでの議論から, この曲面は平面である. 各座標軸との交点 (2つの座標を 0 としたときの残りの座標の値) を求めると,  $(1, 0, 0)$ ,  $(0, 1, 0)$ ,  $(0, 0, 1)$  であるから,  $S$  はこれら 3 点を頂点とする三角形領域である.  $\mathbf{r}(u, v)$  の定義域は,  $uv$  平面内の原点,  $(1, 0)$ ,  $(0, 1)$  を頂点とする三角形領域なので,  $D : 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 - u$  と表すことができる.

$$3) \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \mathbf{i} - \mathbf{k}, \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \mathbf{j} - \mathbf{k} \text{ より, } \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

# ベクトル場の面積分の計算例

4)  $A(\mathbf{r}(u, v)) = A(u, v, 1 - u - v) = 2u \mathbf{i} - v \mathbf{j} + (1 - u - v) \mathbf{k}.$

5) 3) と 4) の内積を計算する.


$$\begin{aligned} A(\mathbf{r}(u, v)) \cdot \left( \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} \times \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} \right) &= (2u \mathbf{i} - v \mathbf{j} + (1 - u - v) \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}) \\ &= 2u \times 1 + (-v) \times 1 + (1 - u - v) \times 1 \\ &= 2u - v + 1 - u - v = 1 + u - 2v. \end{aligned}$$

6) (5) を  $D$  上で 2 重積分する.


$$\begin{aligned} \int_S A \cdot d\mathbf{S} &= \int_0^1 \left( \int_0^{1-u} (1 + u - 2v) dv \right) du = \int_0^1 \left( [(1 + u)v - v^2]_0^{1-u} \right) du \\ &= \int_0^1 (2u - 2u^2) du = \left[ u^2 - \frac{2}{3}u^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

# (付録 1) 曲面の接平面

- 点  $r(a, b)$  を通り, ベクトル  $\frac{\partial r}{\partial u}(a, b)$  と  $\frac{\partial r}{\partial v}(a, b)$  に平行な平面を「曲面  $r(u, v)$  の点  $r(a, b)$  における接平面」という.
- 接平面は, 点  $r(a, b)$  を通り, 法単位ベクトルに垂直な平面である.
- $z = f(x, y)$  のグラフは曲面である (グラフ曲面).  
 $f(x, y)$  の 1 次近似式が, この曲面の接平面の方程式である.



曲面の法単位ベクトル



曲面の接平面

## (付録 2) 曲面の面積の計算例

---

### (1) 半径 1 の球面

$$\boldsymbol{r}(u, v) = \cos u \cos v \boldsymbol{i} + \sin u \cos v \boldsymbol{j} + \sin v \boldsymbol{k}, \quad (0 \leq u \leq 2\pi, -\pi/2 \leq v \leq \pi/2)$$

- 面積素は  $dS = \cos v \, du \, dv$ . よって, 面積の値は

$$\begin{aligned} \int_S dS &= \iint_D \cos v \, du \, dv = \int_0^{2\pi} \left( \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos v \, dv \right) du \\ &= \int_0^{2\pi} [\sin v]_{-\pi/2}^{\pi/2} du = \int_0^{2\pi} 2 \, du = 2[u]_0^{2\pi} = 4\pi. \end{aligned}$$

## (付録 2) 曲面の面積の計算例

(2) 平面  $x + y + z = 1$  ( $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ )

$$\mathbf{r}(u, v) = u \mathbf{i} + v \mathbf{j} + (1 - u - v) \mathbf{k}, \quad (0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 1 - u)$$

- 面積素は  $dS = \sqrt{3} du dv$ . よって, 面積の値は

$$\begin{aligned} \int_S dS &= \iint_D \sqrt{3} du dv = \int_0^1 \left( \int_0^{1-u} \sqrt{3} dv \right) du \\ &= \sqrt{3} \int_0^1 [v]_0^{1-u} du = \sqrt{3} \int_0^1 (1 - u) du \\ &= \sqrt{3} \left[ u - \frac{u^2}{2} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

## (付録3) 積分公式 (1) ガウスの発散定理

### 定理

$V$  を空間内の閉領域とし, その表面を  $S$  とする (ただし, 曲面  $S$  の法単位ベクトル  $n$  は  $V$  の外側を向いているとする) .

このとき,  $V$  を含む領域で定義されたベクトル場  $A$  に対し,

$$\iiint_V \nabla \cdot A \, dx dy dz = \int_S A \cdot n \, dS$$

が成り立つ.

**注** ベクトル場  $A$  を流体の速度ベクトルとみるとき, 「単位時間に  $V$  の中で生じる流体の量」が「単位時間に  $V$  の外に流れ出る流体の量」に等しいことを表している.

## (付録 4) 積分公式 (2) ストークスの定理

### 定理

$S$  を境界をもつ曲面とし, その境界の曲線を  $C$  とする (ただし, 曲線  $C$  の向きは,  $S$  の法単位ベクトルと右ねじの関係にあるとする) .

このとき,  $S$  を含む空間内の領域で定義されたベクトル場  $A$  に対し,

$$\int_C A \cdot t \, ds = \int_S (\nabla \times A) \cdot n \, dS$$

が成り立つ.

**注** ベクトル場  $A$  を流体の速度ベクトルとみるとき, 「単位時間に  $S$  の表面において発生する渦の量」が「単位時間に  $S$  のふちを廻っている流体の量」に等しいことを表している.



# まとめと復習（と予習）

---

- 曲面の法単位ベクトルとは何ですか？
- 曲線の面積素, ベクトル面積素とは何ですか？
- スカラー場の 面積分の定義は？
- ベクトル場の 面積分の定義は？

**教科書** p.96～100, 103～113\*

**問題集** 204, 205, 206, 207, 208, 209\*, 210\*

※ 次回から「**複素関数論**」