LEFLOXIN

*Levofloxacin 750 mg / Tablets





Indication

ใช้สำหรับรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียในผู้ใหญ่ที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่ไวต่อยานี้ เช่น

1. โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน
2. หลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบแบบเฉียบพลัน
3. ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน
4. ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล
5. การติดเชื้อที่ผิวหนัง เช่น ฝี หนอง ตุ่มพุพอง ผิวหนังอักเสบ การติดเชื้อที่บาดแผล
6. การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่มีภาวะแทรกซ้อน
7. การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่มีภาวะแทรกซ้อน
8. ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
9. กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน
10. ปอดอักเสบที่ไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ
11. Third-line therapy สำหรับการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นที่มีสาเหตุมาจากเชื้อ Helicobacter pylori.



Dosage Regimen

สำหรับโรคปอดอักเสบที่ไม่ทราบเชื้อที่เป็นสาเหตุ : รับประทานครั้งละ 750 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง [5]


ผู้ใหญ่หรือผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตปกติ [2, 3, 5]


โรคติดเชื้อ	ขนาดที่ใช้	ระยะเวลาที่ใช้รักษา	ขนาดที่ใช้ต่อวัน
โพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	5 วัน	750 มก.
หลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบเฉียบพลัน	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	5 วัน	750 มก.
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	5 วัน	750 มก.
ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	7 - 14 วัน	750 มก.
การติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่มีภาวะแทรกซ้อน	750มก. วันละ 1 ครั้ง	7 - 14 วัน	750 มก.
การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่มีภาวะแทรกซ้อน	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	5 วัน	750 มก.
กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน	750 มก. วันละ 1 ครั้ง	5 วัน	750 มก.

Dosage Regimen in Renal/Hepatic Impaired Patient

ผู้ป่วยที่มีการทำงานของไตบกพร่อง [2, 3, 5]

การทำงานของไต	ขนาดการใช้ยาครั้งแรก	ขนาดการใช้ยาครั้งต่อไป
สำหรับโรคโพรงจมูกอักเสบเฉียบพลัน/ หลอดลมอักเสบเรื้อรังกำเริบแบบเฉียบพลัน/ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน/ การติดเชื้อที่ผิวหนัง/ ต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังจากการติดเชื้อแบคทีเรีย		
อัตราการขจัดครีเอตินีน 50 – 80 มล./นาที	ไม่ต้องมีการปรับขนาดของการให้ยา	
อัตราการขจัดครีเอตินีน 20 – 49 มล./นาที	500 มก.	250 มก. ทุก 24 ชั่วโมง
อัตราการขจัดครีเอตินีน 10 – 19 มล./นาที	500 มก.	250 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่อยู่ในขบวนการ hemodialysis	500 มก.	250 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่อยู่ในขบวนการ peritoneal dialysis	500 มก.	250 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
สำหรับการติดเชื้อที่ผิวหนังและโครงสร้างของผิวหนังที่มีภาวะแทรกซ้อน/ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล/ ปอดอักเสบจากการติดเชื้อในชุมชน		
อัตราการขจัดครีเอตินีน 50 – 80 มล./นาที	ไม่ต้องมีการปรับขนาดของการให้ยา	
อัตราการขจัดครีเอตินีน 20 – 49 มล./นาที	750 มก.	750 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
อัตราการขจัดครีเอตินีน 10 – 19 มล./นาที	750 มก.	500 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่อยู่ในขบวนการ hemodialysis	750 มก.	500 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
ผู้ป่วยที่อยู่ในขบวนการ peritoneal dialysis	750 มก.	500 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่มีภาวะแทรกซ้อน/ กรวยไตอักเสบเฉียบพลัน		
อัตราการขจัดครีเอตินีนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 มล./นาที	ไม่ต้องมีการปรับขนาดของการให้ยา	
อัตราการขจัดครีเอตินีน 10 – 19 มล./นาที	250 มก.	250 มก. ทุก 48 ชั่วโมง
การติดเชื้อของระบบทางเดินปัสสาวะที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ไม่ต้องมีการปรับขนาดของการให้ยา		





ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง

ไม่ต้องมีการปรับขนาดของการให้ยาเนื่องจาก levofloxacin ไม่ถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับ แต่ยาจะถูกขับถ่ายทางไตเป็นหลัก [2, 5]

Side Effect



อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อย คือ

ระบบทางเดินอาหาร: ท้องเสีย (5%), คลื่นไส้ (7%)

ระบบประสาท: เวียนศีรษะ (3%), ปวดศีรษะ (6% - 10%), นอนไม่หลับ (4%)

อาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรง คือ

ระบบหลอดเลือดและหัวใจ: โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง หรือโรคหลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาด, ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน (0.1% – 1%), คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้น, Torsades de pointes, หัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติ (0.1% - 1%)

ระบบผิวหนัง: ผื่นแพ้ยา, Stevens-Johnson syndrome

ระบบต่อมไร้ท่อ: ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง (0.1% - 1%)

ระบบเลือด: โลหิตจางจากไขกระดูกฝ่อ, Pancytopenia, Thrombocytopenia purpura

ตับ: ตับอักเสบ, ตับล้มเหลว

ระบบภูมิคุ้มกัน: กลุ่มอาการแพ้ Anaphylactoid reaction, ภาวะภูมิไวเกิน (0.1% - 1%)


ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก: โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการกำเริบ, เอ็นฉีกขาด, เอ็นอักเสบ (0.1% - 1%)

ระบบประสาท: สับสน, ผิดปกติในความตั้งใจ, กลุ่มอาการ Guillain-Barre syndrome, ความจำผิดปกติ, ปลายประสาทอักเสบ, ภาวะความดันในโพรงกะโหลกศีรษะสูง, ความดันในกะโหลกศีรษะสูง, ชัก (0.1% - 1%)

จักษุ: จอประสาทหลุดลอก

จิตเวช: อาการเพ้อ, ซึมเศร้า (0.1% – 1%), ภาพหลอน (0.1% – 1%), หวาดระแวง, โรคจิต, การฆ่าตัวตาย

ไต: ไตวาย (0.1% - 1%)



Contraindication

1. ห้ามใช้ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา levofloxacin หรือยากลุ่ม quinolones ตัวอื่นๆ
2. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา levofloxacin ในผู้ป่วยที่มีประวัติเส้นเอ็นผิดปกติ หรือเอ็นอักเสบ หรือเอ็นบาดเจ็บ
3. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา levofloxacin ในผู้ป่วยที่มีประวัติปลายประสาทอักเสบ
4. ควรใช้ยา levofloxacin ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่ทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งมีแนวโน้มให้เกิดอาการชักหรือ seizure threshold ต่ำลง เช่น โรคหลอดเลือดสมองตีบรุนแรง โรคลมชัก หรือปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่จูงใจให้เกิดอาการชักหรือ seizure threshold ต่ำลง เช่น ยาบางชนิด การทำงานของไตบกพร่อง
5. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยา levofloxacin ในผู้ป่วยที่มีประวัติโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันทีหากมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง รวมทั้งหายใจลำบาก



Pregnancy and Lactation

สตรีมีครรภ์จัดเป็น Pregnancy Category C ยังไม่มีการศึกษาที่มีการควบคุมที่ดีและเพียงพอในสตรีมีครรภ์

สตรีระหว่างให้นมบุตร : ยา levofloxacin กระจายตัวเข้าสู่น้ำนมได้ เนื่องจากมีผลของอาการไม่พึงประสงค์ที่ร้ายแรงในทารกที่ได้รับน้ำนม

Precaution

1. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่นขึ้น ปวดเมื่อย ปวดกล้ามเนื้อ ปวดเอ็นข้อมือหรือข้อเท้า ให้รีบหยุดยาและปรึกษาแพทย์ทันที
2. ยานี้อาจทำให้เกิดอันตรายต่อตับและไตได้
3. ไม่ควรใช้ยานี้ หรือหากจำเป็นให้ใช้ด้วยความระมัดระวังในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง ซึ่งง่ายต่อการเกิดอาการชักโดยสัมพันธ์กับขนาดยาที่ให้
4. ยานี้อาจทำให้เกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังการใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะดังกล่าว เช่น ผู้ป่วยสูงอายุ ผู้ป่วยโรคหัวใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ ความดันโลหิตสู งผู้ป่วยที่มีระดับโปแตสเซียมในเลือดต่ำกว่าปกติ
5. หลีกเลี่ยงการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่ทำให้คลื่นไฟฟ้าหัวใจ QT ยาวขึ้น เช่น ยากลุ่ม antiarrhythmic class IA (เช่น quinidine, procainamide), class III (เช่น amiodarone) ยา cisapride, ยา erythromycin, ยากลุ่ม antipsychotics, tricyclic antidepressants .
6. ยานี้อาจทำให้ผื่นแพ้แสงแดด (phototoxicity reaction) หรือผื่นชนิดรุนแรง เช่น Toxic Epidermal Necrolysis, Steven-Johnson syndrome, Erythema Multiforme
7. ยานี้อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำตาลในเลือด ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยเบาหวาน
8. การใช้ยานี้ร่วมกับ warfarin อาจจะเพิ่มฤทธิ์ของ warfarin