MERCK



MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)
คู่มือสำหรับผู้ป่วย

Version 3.1 [10 Sep 2024]
TH Version 1.0 [27 Nov 2024]
TH-MAV-00088 | Feb 2025

MAVENCLAD®
cladribine tablets

ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่เริ่มการรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)

เนื้อหา

แนะนำเกี่ยวกับ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) 4

การรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) เป็นอย่างไร? 5

ผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น 6

- ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (Lymphopenia) 6
- ปัญหาเกี่ยวกับตับ (Liver problems) 6
- โรคงูสวัด (Herpes zoster) 7
- การติดเชื้อรุนแรงรวมถึงวัณโรค (Severe infections including tuberculosis) 8
- โรคสมองที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมองหลายตำแหน่งของสมองพร้อม ๆ กัน (Progressive multifocal leukoencephalopathy) 9
- เนื้องอกร้าย (Malignancies) 9

การป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) 10

- ผู้ป่วยหญิง 10
- ผู้ป่วยชาย 10


แนะนำเกี่ยวกับ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)



แพทย์ของคุณได้สั่งจ่ายยาเพื่อการรักษาโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) ชื่อว่า MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) คู่มือนี้จัดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับคุณและมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)

โดยการอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียด คุณจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นบางประการ

คู่มือที่อยู่ตอนท้ายของเอกสารกำกับยา จะอธิบายวิธีการกินยา MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ที่คุณควรปฏิบัติตาม



การรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) เป็นอย่างไร?


- จำนวนเม็ดยา MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ที่คุณต้องกินขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของคุณ แพทย์ของคุณจะให้คำแนะนำที่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนเม็ดและเวลาที่คุณควรกิน

- คุณควรกิน MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) **ในสัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 5 ของปีการรักษาที่หนึ่งและปีการรักษาที่สอง (รวมเป็น 4 สัปดาห์ในการรักษาตลอด 2 ปีแรกของการรักษา)** แพทย์ของคุณจะจัดทำตารางที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับจำนวนเม็ดที่ต้องกินและวันที่แน่นอนสำหรับการใช้ยา

- เมื่อการรักษาสำหรับปีการรักษาที่ 1 และ 2 เสร็จสิ้น จะ**ไม่มีความจำเป็น**ต้องรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) เพิ่มเติม**ในปีที่ 3 และ 4**

- หากคุณลืมกินยา MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) และนึกขึ้นได้ในวันเดียวกันกับที่กำหนดไว้ ให้กินยาตามแผนในวันนั้น

- หากคุณลืมกินยา MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) และนึกขึ้นได้ในวันถัดไป ให้กินยาตามปกติในครั้งถัดไป โดย**ห้ามเพิ่มขนาดยา** แต่ให้ขยายจำนวนวันที่ต้องกินยาในสัปดาห์การรักษานั้นเพิ่มไปอีก 1 วัน




ผลข้างเคียงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) อาจมีผลข้างเคียง และรายละเอียดทั้งหมดมีอธิบายในเอกสารกำกับยาที่คุณจะได้รับพร้อมกับยาเม็ดของคุณ

ผลข้างเคียงที่สำคัญที่คุณควรทราบมีดังต่อไปนี้



ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (Lymphopenia)



MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดที่เรียกว่า **ลิมฟ์เซลล์**มีจำนวนลดลงชั่วคราว เนื่องจากลิมฟ์เซลล์เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย (การป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย) การลดลงอย่างมากของลิมฟ์เซลล์ที่ไหลเวียนอยู่ในเลือด ซึ่งเรียกว่า**ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (lymphopenia)** อาจทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การติดเชื้อที่สำคัญดังแสดงในเนื้อหาส่วนถัดไปของเอกสารนี้ แพทย์ของคุณจะตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนลิมฟ์เซลล์ไม่ลดต่ำเกินไป

ปัญหาเกี่ยวกับตับ (Liver problems)

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) อาจสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาเกี่ยวกับตับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตับมาก่อน แจ้งแพทย์ของคุณหากคุณเคยมีปัญหาเกี่ยวกับตับเมื่อใช้ยาชนิดอื่นหรือหากคุณมีโรคตับอยู่ก่อนแล้ว แพทย์ของคุณจะตรวจเลือดก่อนการรักษา เพื่อให้แน่ใจว่าตับของคุณทำงานได้เป็นปกติ




อาการบาดเจ็บของตับอาจรวมถึง:

- รู้สึกไม่สบาย (คลื่นไส้)
- อาเจียน ปวดท้อง
- อ่อนเพลีย (เหนื่อยล้า)
- เบื่ออาหาร
- ตัวเหลือง ตาเหลือง (ดีซ่าน)
- ปัสสาวะมีสีเข้ม

หากคุณสังเกตเห็นอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น ให้ติดต่อแพทย์ของคุณทันที

แพทย์ของคุณจะตัดสินใจว่าการรักษาของคุณด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) จำเป็นต้อง **หยุดชั่วคราวหรือคุณไม่ควรได้รับ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ต่อไป**

โรคงูสวัด (Herpes zoster)



ไวรัสวาริเซลล่า โซสเตอร์ (Varicella zoster) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคอีสุกอีใส (Chickenpox) ไวรัสนี้สามารถซ่อนตัวอยู่ในเส้นประสาทในร่างกายและสามารถกลับมาก่อโรคอีกครั้งเป็นโรคงูสวัดได้



โรคงูสวัดสามารถเกิดขึ้นบริเวณส่วนใดของร่างกายก็ได้ รวมถึงใบหน้าและดวงตา แม้ว่าส่วนที่พบได้บ่อยที่สุดคือบริเวณหน้าอกและท้อง

ในบางกรณี โรคงูสวัดอาจทำให้เกิดอาการนำบางอย่าง ซึ่งอาจมีอาการหลายวันก่อนที่จะมีผื่นงูสวัดที่เจ็บปวดเกิดขึ้น อาการเริ่มต้นเหล่านี้อาจรวมถึง:

- ปวดศีรษะ
- รู้สึกแสบร้อน ชา หรือคันที่ผิวหนังในบริเวณที่เป็น
- รู้สึกไม่ค่อยสบาย
- ไข้

ผู้ที่เป็นโรคงูสวัดส่วนใหญ่จะมีผื่นตุ่มน้ำขึ้นเฉพาะที่ในลักษณะเป็นแนว มีอาการปวดรุนแรง และบริเวณผิวหนังที่เป็นมักจะบอบบาง

ผื่นงูสวัดมักปรากฏอยู่ด้านหนึ่งของร่างกายและขยายไปที่บริเวณผิวหนังที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทที่ได้รับผลกระทบ ในระยะเริ่มต้น ผื่นงูสวัดจะแสดงให้เห็นเป็นจุดแดงบนผิวหนัง ก่อนที่จะพัฒนาเป็นตุ่มน้ำคัน ตุ่มน้ำใหม่อาจปรากฏขึ้นได้นานถึงหนึ่งสัปดาห์ แต่หลังจากปรากฏขึ้น 2-3 วัน ตุ่มน้ำจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง แบนราบ และแห้งลง หากคุณสังเกตเห็นอาการหรืออาการแสดงใด ๆ ข้างต้น คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณทันที แพทย์ของคุณสามารถสั่งจ่ายยาเพื่อรักษาการติดเชื้อได้ และการได้รับการรักษาในระยะแรก ๆ จะทำให้ลดความรุนแรงหรือลดระยะเวลาการเป็นโรคงูสวัดให้สั้นลงได้



การติดเชื้อรุนแรงรวมถึงวัณโรค (Severe infections including tuberculosis)

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) อาจทำให้จำนวนลิมฟ์เซลล์ในเลือดของคุณลดลงชั่วคราว การติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ รวมถึงวัณโรค อาจถูกกระตุ้นเมื่อจำนวนลิมฟ์เซลล์ลดลงอย่างมาก ในบางรายอาจเกิดการติดเชื้อที่พบเฉพาะในผู้ที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแออย่างรุนแรงซึ่งเรียกว่า**การติดเชื้อฉวยโอกาส (Opportunistic infections)** ซึ่งพบได้ยาก แพทย์ของคุณจะตรวจเลือดเพื่อให้แน่ใจว่าจำนวนเซลล์ในเลือดที่ทำหน้าที่ต่อสู้กับการติดเชื้อไม่ลดต่ำจนเกินไป

นอกจากนี้ คุณจะต้องเฝ้าระวังต่ออาการหรืออาการแสดงใด ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการติดเชื้อ



อาการของการติดเชื้ออาจรวมถึง:


- ไข้
- เจ็บหรือปวดกล้ามเนื้อ
- ปวดศีรษะ
- รู้สึกไม่ค่อยสบาย
- ตาเหลือง

อาจมีอาการอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงกับบริเวณที่ติดเชื้อ เช่น ไอ อาเจียน หรือปวดขณะปัสสาวะ

หากคุณมีอาการที่รุนแรง ควรไปพบแพทย์ซึ่งสามารถตัดสินใจว่าคุณต้องการการรักษาเฉพาะหรือไม่

โรคสมองที่มีความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมองหลายตำแหน่งของสมองพร้อม ๆ กัน (Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)


PML (Progressive Multifocal Leukoencephalopathy) เป็นการติดเชื้อในสมองที่หายากซึ่งเกิดจากไวรัส (ไวรัส JC) ที่อาจเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ใช้ยาที่ลดการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน PML เป็นภาวะที่รุนแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความพิการรุนแรงหรือเสียชีวิต แม้ว่ายังไม่พบกรณีของ PML ในผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง (Multiple Sclerosis) ที่ใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) แต่ก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นในอนาคตได้



อาการของ PML อาจคล้ายกับอาการของโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง อาการอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือพฤติกรรม การหลงลืม และมีความยากลำบากในการพูดและการสื่อสาร

หากคุณรู้สึกว่าภาวะโรคของคุณกำลังแย่ลงหรือหากคุณสังเกตเห็นอาการใหม่หรืออาการที่ไม่ปกติใด ๆ ให้ปรึกษาแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุด

เนื้องอกร้าย (Malignancies)



เนื่องจากกลไกการทำงานของ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ที่ไปกดภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งอาจทำให้ระบบภูมิคุ้มกันไม่สามารถกำจัดเซลล์มะเร็งหรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงไม่สามารถตัดความเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดมะเร็งได้

จากผลการศึกษาทางคลินิกสังเกตพบว่ามีการเกิดมะเร็งแบบชนิดเดี่ยวในผู้ป่วยที่ได้รับยาคลาไดรบีน คุณควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งตามมาตรฐานหลังจากใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) แพทย์ของคุณสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการตรวจคัดกรองมะเร็งที่คุณอาจพิจารณาเลือกตรวจ หากคุณมีเนื้องอกร้ายอยู่ในขณะนี้ **คุณไม่ควรใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)**

การป้องกันการตั้งครรภ์ระหว่างการรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) (Prevention of pregnancy during treatment with MAVENCLAD®)

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อสารทางพันธุกรรมได้ ประสบการณ์จากการศึกษาในสัตว์แสดงให้เห็นว่า MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ทำให้เกิดการตายและความผิดปกติในทารกที่กำลังพัฒนา ดังนั้น หากใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ในระยะเวลา 6 เดือนก่อนตั้งครรภ์หรือระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้เกิดการแท้งหรือความพิการแต่กำเนิดในทารก แพทย์ของคุณอาจให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ**หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ก่อนที่จะสั่งจ่าย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด)**



ผู้ป่วยหญิง

การใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ถูกห้ามในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ออันตรายร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ ควรต้องตรวจสอบการตั้งครรภ์ก่อนเริ่มการรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) หากมีการตั้งครรภ์ คุณต้องไม่เริ่มการรักษาด้วย MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) สำหรับผู้หญิงที่สามารถตั้งครรภ์ได้ ต้องใช้มาตรการป้องกันเพื่อ**หลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ในระหว่างที่ใช้ MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) และอย่างน้อยอีก 6 เดือนหลังจากการใช้ยาครั้งสุดท้ายในแต่ละปีการรักษา** โดยใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ (เช่น วิธีการที่มีอัตราความล้มเหลวน้อยกว่า 1% ต่อปีเมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง) แพทย์ของคุณจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของยาคุมกำเนิดแบบรับประทานที่ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์

หากคุณตั้งครรภ์ คุณควรติดต่อแพทย์ของคุณโดยเร็วที่สุดเพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์



ผู้ป่วยชาย

MAVENCLAD® (เมเว็นคลัด) อาจเป็นอันตรายต่อสเปิร์มของคุณและสามารถถูกถ่ายทอดไปยังคู่ของคุณผ่านทางสเปิร์มได้ ดังนั้นจึงอาจทำให้เกิดอันตรายต่อทารกในครรภ์ คุณต้อง**ใช้มาตรการป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คู่ของคุณตั้งครรภ์ในระหว่างที่คุณใช้ยาและอย่างน้อยอีก 6 เดือน หลังจากการใช้ยาครั้งสุดท้ายในแต่ละปีการรักษา** โดยใช้วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพ (เช่น วิธีการที่มีอัตราความล้มเหลวน้อยกว่า 1% ต่อปีเมื่อใช้อย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง) แพทย์ของคุณจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสม

หากคู่ของคุณตั้งครรภ์ เธอควรติดต่อแพทย์โดยเร็วที่สุดเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับการตั้งครรภ์

MAVENCLAD®
cladribine tablets