

1-1.9-4

ai24btech11030 - Shiven Bajpai

Question: If $\|\mathbf{a}\| = 4$ and $-3 \leq \lambda \leq 2$, then $\|\lambda\mathbf{a}\|$ lies in

- 1) $[0, 12]$
- 2) $[2, 3]$
- 3) $[8, 12]$
- 4) $[-12, 8]$

Solution: 1) $[0, 12]$

$$\begin{aligned}\|\mathbf{a}\| &= \sqrt{\mathbf{a}\mathbf{a}^T} \\ \|\lambda\mathbf{a}\| &= \sqrt{(\lambda\mathbf{a})(\lambda\mathbf{a})^T} \\ &= \sqrt{\lambda^2\mathbf{a}\mathbf{a}^T} \\ &= |\lambda| \sqrt{\mathbf{a}\mathbf{a}^T}\end{aligned}$$

$$\|\lambda\mathbf{a}\| = |\lambda| \|\mathbf{a}\|$$

Now, since

$$\begin{aligned}-3 &\leq \lambda \leq 2 \\ 0 &\leq |\lambda| \leq 3 \\ 0\|\mathbf{a}\| &\leq |\lambda| \|\mathbf{a}\| \leq 3\|\mathbf{a}\| \\ 0 &\leq \|\lambda\mathbf{a}\| \leq 12\end{aligned}$$




Fig. 4: Norms of 100 randomly scaled vectors, clearly $\|\lambda \mathbf{a}\| \leq 12$

Code for this plot can be found at:

```
Codes/main.py  
Codes/main.c
```