

命题：可以判断真假的陈述句。通常，我们用 T 表示真，用 F 表示假。

例.

1. 对任意的自然数 a, b, c , $(a + b) + c = a + (b + c)$ 。(真命题)
2. $\sqrt{2}$ 是无理数。(真命题)
3. $\sqrt{2}$ 是有理数。(假命题)
4. 设 $f : [a, b] \rightarrow R$ 为一个Riemann可积函数, $F : [a, b] \rightarrow R$ 在 $[a, b]$ 上满足 $F'(x) = f(x)$, 那么 $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$ 。(真命题)

谓词：命题的谓语部分。

例.

$P(x) : x \text{ 是偶数}$ 这里 P 为一元谓词，表示“是偶数”。当 x 为某个确定的数字时， $P(x)$ 则对应一个命题。例如 $P(2)$ 为真命题， $P(1)$ 为假命题。这里， P 之所以被称为一元谓词，是因为 $P(x)$ 只包含一个变量 x 。

$P(x, y) : x > y$ 这里 P 为二元谓词，表示 $>$ 。当 x 和 y 为确定的数字时， $P(x, y)$ 则对应一个命题。例如 $1 > 0$ 为真命题， $0 > 1$ 为假命题。这里， P 之所以被称为二元谓词，是因为 $P(x, y)$ 包含两个变量 x 和 y 。

相应的，有三元谓词，四元谓词，……

我们还可以用如下方式由谓词得到命题：

$\forall x P(x)$ ：对任意的 x , $P(x)$ 。For All中的 A 上下颠倒可以得到 \forall 。

$\exists x P(x)$ ：存在 x , $P(x)$ 。There Exists中的 E 左右颠倒可以得到 \exists 。

命题可以由联结词 \neg , \wedge , \vee , \rightarrow , \leftrightarrow 联结而构成复合命题。

设 p 为命题，则 $\neg p$ 表示“ p 不成立”。

p	$\neg p$
T	F
F	T

设 p 和 q 为两个命题，则 $p \wedge q$ 表示“ p 成立，并且 q 成立”。

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

设 p 和 q 为两个命题，则 $p \vee q$ 表示“ p 成立，或者 q 成立”。

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

设 p 和 q 为两个命题，则 $p \rightarrow q$ 表示“如果 p 成立，那么 q 成立”。

p	q	$p \rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

这里需要注意的是，当 p 为假时，则 $p \rightarrow q$ 一定为真，这是所有数学家共同的约定。下面的例子可以帮助大家更好的理解其实我们已经用到了这个约定。

对任意的实数 x ，当 $x > 1$ 时， $x^2 > 1$ 。该命题显然是真命题，可以符号化为 $\forall x x > 1 \rightarrow x^2 > 1$ 。那么，既然对于任意的 x ， $x > 1 \rightarrow x^2 > 1$ 成立，则

- 1) 当 $x = 2$ 时， $2 > 1 \rightarrow 2^2 > 1$ 成立，这对应于以上真值表的第一行；
- 2) 当 $x = 0$ 时， $0 > 1 \rightarrow 0^2 > 1$ 成立，这对应于以上真值表的第四行；
- 3) 当 $x = -2$ 时， $-2 > 1 \rightarrow (-2)^2 > 1$ 成立，这对应于以上真值表的第三行。

设 p 和 q 为两个命题，则 $p \leftrightarrow q$ 表示“ p 等价于 q ”。

p	q	$p \leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T