

社会 演習問題集

第3回 地理 — 気候区分と農業

2026年5月25日

高校3年

地理

Trillion

第1問 [25 点]

次の文章を読み、表を参照して後の問いに答えよ。

地球上の気候は、(A) ケッペンの気候区分によって分類されている。気温と降水量の年変化に基づき、熱帯・乾燥帯・温帯・冷帯 (亜寒帯)・寒帯の 5 つに大別され、さらに細分化される。

下の表は、世界の主要都市の気候データを示している。

都市	1月平均気温 (°C)	7月平均気温 (°C)	年降水量 (mm)	気候区分
シンガポール	26.0	27.6	2,166	Af (熱帯雨林)
カイロ (エジプト)	13.7	28.1	25	BWh (砂漠)
東京 (日本)	5.2	26.4	1,529	Cfa (温暖湿潤)
ロンドン (英国)	5.2	18.7	601	Cfb (西岸海洋性)
モスクワ (ロシア)	-7.5	19.7	707	Dfb (亜寒帯湿潤)
バロー (アラスカ)	-25.1	4.1	115	ET (ツンドラ)

(表) 世界の主要都市の気候データ (1991-2020 平均)

問1 下線部A「ケッペンの気候区分」は何を基準として気候を分類しているか。\$30\$ 字程度で説明せよ。

(答えを記入)

問2 表中の都市のうち、夏に乾燥し冬に降雨がある地中海性気候 (Cs) に分類される都市は含まれていない。地中海性気候の地域で広く栽培される作物として最も適当なものを、次の①～④から一つ選べ。

- ① コーヒー豆・カカオ
- ② オリーブ・ぶどう・オレンジ
- ③ 米・小麦
- ④ ジャガイモ・てんさい

問3 シンガポール (Af 熱帯雨林) で広く行われている農業形態として最も適当なものを、次の①～④から一つ選べ。

- ① 焼畑農業を中心とした自給的農業
- ② プランテーション農業 (天然ゴム・パーム油等)
- ③ オアシス農業 (ナツメヤシ栽培)
- ④ 酪農・混合農業

問4 ロンドン (Cfb 西岸海洋性) では、年較差 (最暖月-最寒月) が約 13.5°C と小さい。この温和な気候の原因として最も適当なものを、次の①～④から一つ選べ。

- ① 高緯度のため日射量が少ないこと
- ② 偏西風と北大西洋海流 (暖流) の影響
- ③ ヒマラヤ山脈による季節風の遮断
- ④ 極前線の南下

問5 東京 (Cfa 温暖湿潤) とロンドン (Cfb 西岸海洋性) は、どちらも温帯に属するが気候特性は大きく異なる。両者の気温の年較差と降水パターンの違いを、表を参照して 100 字以内で説明せよ。

(長文記述)



(オリジナル作成問題)