【2】研究計画 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です。

- (1) 研究の概要及び研究の位置づけ 本項目は1頁に収めてください。
- ・まず、研究課題名及び研究の概要を500字程度で記入してください。
- ・続けて、特別研究員として取り組む研究の位置づけについて、当該分野の状況や課題等の背景、並びに本研究計画の着想に至った経緯も含 めて記入してください。

研究課題名:ミューオン電子転換探索の感度向上に向けた解析手法の開発

背景

素粒子物理学における標準模型は、物質の最小構成要素である"素粒子"における基本的な相互作用を記 述する理論である。この理論は未だ十分に自然界を記述することはできず、新理論の発見が待ち望まれてい る。本研究で探索する荷電レプトンフレーバー非保存過程 (以下、charged Lepton Flavor Violation:cLFV) は標準模型では崩壊分岐比が 10⁻⁵⁴ 以下と非常に強く抑制されている。一方、多くの新理論内ではこの過 程が 10^{-15} 程度の確率で観測可能と示唆されている。従って、cLFV の発見は標準模型の寄与がなく、新 **物理の直接的な証拠**となる。 COMET 実験ではミューオン電子転換過程 $(\mu^- + N \to e^- + N)$ と呼ばれる cLFV の一種を探索する。COMET 実験では現状のミューオン電子転換過程に対する世界最高感度を二桁 ほど更新することが期待されている。

当該分野の状況

ミューオン電子転換探索の世界最高感度は、先行実験の SINDRUM-II での 7×10^{-13} で、発見には至らなかった [1]。 この測定では連続的なビームを使用したため、ビーム由来の 背景事象が常に存在し、ビーム強度に対する探索感度に制限 があった。そこで COMET 実験では、パルス状のビームを使 用することと標的にアルミニウムを使用することで背景事象 の問題を克服する。ビームのパルス間隔 1.17 μs に対し、原子 中のミューオン寿命が 0.86 μs と長いアルミニウムをミュー オン静止標的に採用し、陽子ビームのバンチタイミングから




図 1: ビームの時間構造

遅れてトリガーをかける。これにより、ビーム由来のバックグラウンドが大幅に低減する。同様の実験と して米国 Fermi 研究所にて建設中の Mu2e 実験 [2] があるが、COMET 実験が先行して、世界最高感度に到 達する計画である。

本研究計画の着想に至った経緯

COMET 実験における背景事象にはビーム由来のもの以外に、原子軌道上におけるミューオンの三体崩 壊 (Decay In Orbit:DIO) による電子があげられる。そこで検出された電子の運動量を用いて、DIO による 電子とミューオン電子転換による電子を見分ける。ミューオンビームのアルミニウムへのターゲットへの 照射は1Tのソレノイド磁場内で行う。そのため、荷電粒子が磁場中で螺旋運動する性質を用いて、運動 量を測定することができる。具体的にはガス飛跡検出器 (Cylindrical Drift Chamber:CDC) による電子の 飛跡の曲率と磁場の値よりその運動量を測定することができる。そこで、CDC で検出された背景事象を含 むヒットのうち信号電子の飛跡を見つけるアルゴリズムの開発が必要不可欠であり、DIO による信号と分 離するためには 200 keV/c の運動量分解能が要求されている。

COMET 実験は 2026 年に全ての装置のインストールが完了し、同年末には低強度ビームでの物理測定 を開始し、2028 年にはいよいよ COMET Phase-I が開始する予定である。従って 2026 年以降には CDC の 運動量較正や上述の物理解析手法の確立を行うことが優先順位の極めて高い項目である。そこで、申請者 の修士課程における**磁場分布に関する経験**やトラッキングアルゴリズムに対する理解を活かし、**世界最高** 感度でのミューオン電子転換過程探索を実現する。

- [1] SINDRUM-II Collaboration, Eur. Phys. J.C47 337-346 (2006)
- [2] Mu2e Collaboration, Universe, 9, 54. (2023)

【2】研究計画 (続き) 適宜概念図を用いるなどして、わかりやすく記入してください。様式の変更・追加は不可です

(2) 研究目的・内容等 本項目は2頁に収めてください。

- ① 特別研究員として取り組む研究計画における研究目的、研究方法、研究内容について記入してください。
- ② どのような計画で、何を、どこまで明らかにしようとするのか、特別研究員奨励費の応募区分(下記(※)参照)に応じて、年次計画を示 し、具体的に記入してください。研究計画が想定通り進まなかった場合の対応方法があれば、あわせて記入してください。
- ③ 研究の特色・独創的な点(先行研究等との比較、本研究の完成時に予想されるインパクト、将来の見通し等)にも触れて記入してくださ L1
- ④ 研究計画が所属研究室としての研究活動の一部と位置づけられる場合は申請者が担当する部分を明らかにしてください。
- ⑤ 研究計画の期間中に受入研究機関と異なる研究機関(外国の研究機関等を含む。)において研究に従事することも計画している場合は、具 体的に記入してください。
- (※) 特別研究員奨励費の研究期間が3年の場合の応募総額は(A区分)が240万円以下(B区分)が240万円超450万円以下(DC1のみ)。2年の場合は(A区分)が160万 円以下、(B 区分) が 160 万円超 300 万円以下。1 年の場合は(A 区分)が 80 万円以下、(B 区分) が 80 万円超 150 万円以下。(B 区分については研究計画上必要な場合のみ

1. 研究目的、研究方法、研究内容

本研究の目的はミューオン電子転換過程を世界最高感度で探索し、標準模型を破る新物理を実験的に観測すること である。そのため、茨城県の大強度陽子ビーム施設 J-PARC で計画している **COMET 実験**で測定および物理解析 を主導する。

アルミニウム原子核に捕獲されたミューオンのミューオン電子転 換によって生成される信号電子の運動量はミューオンの質量から原 子核の束縛エネルギーと反跳エネルギーを引いた **105** MeV/c であ る。一方、背景事象である原始軌道上でのミューオンの崩壊 (DIO) は三体崩壊であるため、ミューオン電子転換過程よりも小さい運動 量になる。そこで検出器全体をソレノイド磁場内に設置し、粒子 の飛跡より求められる**電子の螺旋運動の曲率**を用いて信号電子の 運動量を測定する。飛跡検出にはガス検出器 (CDC) を用い、CDC のデータ取得のトリガーにはシンチレーター検出器 CTH を用い る。図2のようにDIO電子と信号電子のスペクトルを分離するに は **200** keV/c **の運動量分解能**が CDC には要求されている。

信号電子が検出器内で複数周回転する multiple turn tracks が現

Signal and DIO (BR=3 × 10⁻¹⁵) 0.18 0.16 DIO電子の運動量 -オン電子転換電子の運動量 ₹0.14 0.12 0.08 0.06 0.04 0.02

図 2: 信号電子の運動量分布

在物理解析において問題視されている。その理由は三つあり、第一に、複数周 CDC にヒットを残すため、周回ごと にヒットを区別する必要があり、トラッキング精度が悪くなってしまう。第二に、CDC でのヒットが多い分、失う 運動量も大きくなり、DIO との区別が難しくなる。第三に、周回が多い分、無関係なノイズを拾いやすい。結果的に 検出器内で一周しかしない single turn tracks のアクセプタンスは 11 % であるのに対し、multiple turn tracks では 7.2 % になる。つまり、multiple turn track を判別できないと、最悪の場合 COMET 実験で期待できる**最高感度の** 2/3 ほどしか達成できない可能性がある。そこで、multiple turn tracks を判別できる解析法を開発し、SINDRUM-I $I^{[\dot{1}]}$ の感度を 100 倍更新する $3.0 imes 10^{-15}$ でのミューオン電子転換過程探索を実現する。

2. 研究計画

【磁場分布の運動量スペクトルへの寄与の評価 (採用まで)】

信号電子の運動量測定には磁場分布の情報が必要不可欠である。申請者は修士課程では COMET Phase-I における 検出器ソレノイド (Detector Solenoid:DS) の磁場測定に携わっており、物理ランを行う時のセットアップと同じ本番 環境における磁場測定システムの設計には運動量分解能 **200** keV/c を達成するために磁場測定の精度の要求値を決定 する必要がある。そのために、磁場測定の精度の情報を COMET 実験グループ内で独自に開発された $\mathrm{ICEDUST}^{[2]}$ という Geant4 ベースのフレームワークを用いて、シミュレーションを行い、要求されている運動量分解能を満たす 磁場測定精度を決定する。

【本番環境での磁場測定 (採用まで)】

2025 年に行われる DS および各種検出器のインストールを主導し、実験開始の準備を着実に進める。同時に、上述 で決定した磁場測定精度を満たす磁場測定システムを開発し、インストール後の 2025 年末に予定されている本番環 境での磁場測定を行う。申請者が修士課程1年時に行った DS の健全性確認のための磁場測定試験で得られたフィー ドバックを活かし、システマティックな誤差や揺らぎを最小限に抑えた測定システムを開発する。ここで測定された データはのちのトラッキングアルゴリズムに活用されるため、非常に重要である。

【CDC の運動量較正および宇宙線 Run(1 年目)】

最初に宇宙線を用いた検出器のテスト測定を行う。この測定では、2 GeV 程度の信号電子や DIO 電子と比べて大き なエネルギーを持つ宇宙線の直線的な飛跡が設計通りの位置分解能で再構成できることを確認する。これにより、ト ラッキング性能だけでなく、CTH によるトリガーが機能していること設計通りにデータ取得ができていることも同 時に確認できる。この測定ではハード、ソフト両面での様々なエラーが発生することが予想され、それらエラーの原 因特定およびデバッグ作業を献身的に行う。宇宙線でのテスト測定に成功した後は、 π から e へのビーム即発背景事 象 (運動量 70 MeV/c) と標準模型内でのミューオンの電子への崩壊 (運動量 52.5 MeV/c) を用いて、検出器の運動量 (【2】研究計画(2)研究目的・内容等の続き)

較正を行う。

【低強度ビームでの物理測定およびトラッキングアルゴリズム開発 (2年目)】

2026 年末に COMET Phase-I の 1/10 の強度でビーム供給を行い、物理測定を行う。現在 COMET 実験では、検出器内で複数周螺旋運動をする multiple turn tracks によるアクセプタンスの低下が問題視されている。実際に電子の螺旋運動を用いて運動量測定を行う MEG 実験でもこの事象は問題視されており、周回を判別できるようになったことで約 4% 検出効率がアップしたことが報告されている。ただ。実験セットアップが異なるため、COMET 実験でも同じ方法を踏襲することはできず、COMET 実験独自のアルゴリズムの開発が要求されている。実際のソレノイド磁場は鉄ヨークに格納されていても完全に一様ではない。%%(私の稚拙な考えかもしれませんが自分なりに考えてみました。)その非一様性を利用して、multiple turn tracks の各周回の分離が可能なアルゴリズムを開発する。

【Phase-I 測定および物理データ解析 (3 年目)】

2028年には予定強度のビームで COMET Phase-I の測定が開始する。2年目までに深めた検出器への理解を元にこの測定を主導する。2年目に開発したトラッキングアルゴリズムで実際に得られた物理データの解析を行い、飛跡の再構成の効率やアクセプタンスなどアルゴリズムの性能を評価する。このトラッキングアルゴリズムのブラッシュアップを行うことで世界最高感度でのミューオン電子転換過程探索を実現し、新物理の発見に貢献する。

3. 研究の特色、独創的な点

先行実験の SINDRUM-II^[1] は連続的な DC ビームを使用していたことでビームの強度に対して探索可能な感度に制限があった。一方、COMET では世界最高強度のパルスミューオンビームを用い、かつ高い背景事象除去率を持つトリガーシステムを用いることで 100 倍感度を改善できる。また、COMET は本研究における Phase-I からアップグレードを見据えており、さらに 100 倍感度を更新して、現在の上限値の 10^4 倍の感度で探索を行う予定である。また、関連実験として同じミューオン cLFV である $\mu \to e + \gamma$ を探索する MEG 実験 ${}^{[3]}$ がある。ガンマを放出するか否かの分岐比は理論依存が大きいため、本研究の結果と組み合わせることで、より詳細な新物理の検証が可能となる。従って、理論分野からも COMET の結果は期待されている

- [1] SINDRUM-II Collaboration, Eur. Phys. J.C47 337-346 (2006)
- [2] R. Derveni, Comparative analyses of sub-GeV physics in simulations and data for the COMET experiment, Ph.D. thesis, Imperial College London, April 2024. doi:10.25560/116399
- [3] A. M. Baldini et al., "Search for the lepton flavour violating decay $\mu^+ \to e^+ \gamma$ with the full dataset of the MEG experiment," European Physical Journal C, vol. 76, no. 8, p. 434, 2016.

【3】人権の保護及び法令等の遵守への対応 本項目は1頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

- ・本欄には、「【2】研究計画」を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、 生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究や安全保障貿易管理を必要とする研究など指針・法令等(国際共同研究を行う国・地域 の指針・法令等を含む)に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を記入してください。
- ・例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査(個人履歴・映像を含む)、国内外の文化遺産の調査等、提供を受け た試料の使用、侵襲性を伴う研究、インフォームド・コンセントが必要な研究、ヒト遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験、機微技 術に関わる研究など、研究機関内外の情報委員会や倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実験などが対象となりますの で手続の状況も具体的に記入してください。
- ・なお、該当しない場合には、その旨記入してください。

象の卵の ES 細胞の培養、象のクローンの生成などは行わない。 IPTEX の便利な機能については、egg_***.tex や sample_pdf/egg_***.pdf をご覧ください。

【4】研究遂行力の自己分析 本項目は2頁に収めてください。様式の変更・追加は不可です。

・日本学術振興会特別研究員制度は、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の養成・確保に資することを目的としています。この目的に鑑み、これまで携わった研究活動における経験などを踏まえ、研究遂行力について分析してください。

(1) 研究に関する自身の強み

応募者は過去 20 年間、7 つの海を隅から隅まで航海し、浅瀬から深海まで潜り、文字通り東西南北上下の3次元でシロナガスクジラの卵の探索を行ってきた (業績 1)。シロナガスクジラに飲み込まれそうになったり、海賊に捕まるなどの危険な目にもあったが、それにもめげず、研究を遂行してきた強靭な能力を有する。

- 1. "Search for whale eggs", H. Yukawa et al., Rev. Oceanic Mysteries 888, 99 (2017).
- 2. "Theory of Elephant Eggs", H. Yukawa, Kara Juzo et al., Phys. Rev. Lett. 800, 800-804 (2005).
- 3. "仔象は死んだ", Kobo Abe, 安部公房全集 26, 100-200 (2004).
- 4. "The Elephant's Child (象の鼻はなぜ長い)", R. Kipling, Nature 999, 777-799 (2003).
- "You can't Lay an Egg If You're an Elephant", F. Ehrlich, JofUR (www.universalrejection.org) N/A, 2002 (
).
- 6. "Egg of Elephant-Bird", A. Cooper, Nature, 409, 704-707 (2001).
- 7. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 8. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 9. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 10. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 11. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 12. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 13. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 14. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 15. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 16. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 17. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 18. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 19. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 20. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 21. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 22. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 23. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 24. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 25. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 26. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 27. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 28. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 29. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 30. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 31. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 32. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 33. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).
- 34. Jack Torrance, "All work and no play makes Jack a dull boy", The Shining (1980).

(2) 今後研究者として更なる発展のため必要と考えている要素

研究費を獲得する術。

(【4】研究遂行力の自己分析の続き)