




Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$M_{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)$^2$)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$M_{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)$^2$)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$M_{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
$\overline{P}_t^+, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)$^2$)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$M_{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
$\overline{P}_t^+, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)$^2$)