




Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$\overline{P}_t^{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
Regularized projector
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
$\text{MSE}_{\text{ref}} - \text{MSE}_{\text{B}}$ $((\text{mm/s})^2)$


Interval contains zero
$P_{\widehat{x}_t}$
$\overline{P}_t^{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
Regularized projector
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
$\text{MSE}_{\text{ref}} - \text{MSE}_{\text{B}}$ $((\text{mm/s})^2)$


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$\overline{P}_t^{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
$\text{MSE}_{\text{ref}} - \text{MSE}_{\text{B}}$ $((\text{mm/s})^2)$


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$\overline{P}_t^{\text{iso}}$
GREAT
GREAT EW
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
$\text{MSE}_{\text{ref}} - \text{MSE}_{\text{B}}$ $((\text{mm/s})^2)$