




Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
1
4
16
32
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
1
4
16
32
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$