






175
150
125
100
75
50
25
0
$\mathcal{E}_t(D_t)$ ((mm/s)^2)
0
10
20
30
Measurement index t
Regularized projector
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\text{iso}}$
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Posterior mean $\overline{P}_t^{+}$
10
12
Time-averaged $\mathcal{E}_t(D_t)$ ((mm/s)^2)
Posterior mean $\overline{P}_t^{+}$
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Regularized projector
GREAT



(a)
Regularized projector
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ ($(\mathrm{mm/s})^2$)



Aggregation discrepancy
10^{-10}
10^{-12}
10^{-15}
parameter
mean
mode
0
20
Block length L
Response MSE ((mm/s)^2)
Delayed action
Common endpoint
Block likelihood
35
30
25
20
15
10
5
0
20
Block length L
Action delay (s)
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
20
Block length L



Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
1
4
16
32
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ ((mm/s)^2)


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
1
4
16
32
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


Interval contains zero
Mode $P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
Isotropic mean $\overline{P}_t^{\mathrm{iso}}$
GREAT
GREAT (exponential weighting)
Regularized projector
$\overline{P}_t^{+}, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Measurement index t
100
50
0
−50
−100
$\mathcal{E}_{\mathrm{ref}} - \mathcal{E}_{\mathrm{B}}$ $((\mathrm{mm/s})^2)$


n_3
n_1
n_2
$q([n])$
10^1
10^0
10^{-2}
$r_t(v(\theta))/v_0^2$
θ (rad)
$\overline{P}_t^+$
$\overline{P}_t^{\text{iso}}$
0.14
0.12
0.10
0
$\pi/2$
π
$3\pi/2$
2π


n_1
n_2
n_3
$q([n])$
10^1
10^0
10^{-2}
Cumulative probability
d_c
$q_{A^{(1)}}$
$q_{A^{(2)}}$
$v^\top(\overline{P} - \overline{P}^2)v$
θ (rad)