






(a)
Response MSE ((mm/s)^2)
160
140
120
100
80
60
40
20
0
5
10
15
20
25
30
Number of observations
(b)
$\widetilde{M}_t$
M_{iso}
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Reference minus mean MSE ((mm/s)^2)
$\overline{P}_t^+$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
$\widetilde{M}_t$
GREAT



(a)
Aggregation discrepancy
10^{-10}
10^{-12}
10^{-15}
parameter
mean
mode
0
10
20
30
Observations per block
(b)
Response MSE ((mm/s)^2)
Delayed action
Common endpoint
Block likelihood
5
10
15
20
25
30
35
0
10
20
30
Observations per block
(c)
Action delay (s)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
0
10
20
30
Observations per block



Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
M_{iso}
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)^2)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
M_{iso}
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
1
4
16
32
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)^2)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
M_{iso}
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
$\overline{P}_t^+, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)^2)


Interval contains zero
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}$
M_{iso}
GREAT
GREAT EW
$\widetilde{M}_t$
$\overline{P}_t^+, G_t = I$
$P_{\widehat{\mathcal{X}}_t}, G_t = I$
4
16
32
64
128
192
Number of observations
100
50
0
−50
−100
Reference minus mean MSE ((mm/s)^2)


(a)
(b)
(c)
n_1
n_2
n_3
$q([n])$
10^{1}
10^{0}
10^{-2}
Normalized response risk
Query angle (deg)
$\overline{P}_t^+$
M_{iso}


(a)
(b)
(c)
(d)
n_1
n_2
n_3
$q([n])$
10^1
10^0
10^{-2}
Cumulative probability
Chordal distance
Projected-response risk
Query angle (deg)
$q_{A^{(1)}}$
$q_{A^{(2)}}$