

On the Separability of Label Noise and Unobserved Confounding in the SCX Causal Discovery Framework

— 严格形式化版本 —

Anonymous Author(s)

June 30, 2026

Abstract

本文件为 SCX 因果发现框架中标签噪声与未观测混杂可区分性定理的严格形式化版本。在 SCX 框架的符号约定下, 我们给出三个核心定理的严格数学表述、前提假设枚举、完整证明、严格性标注以及诚实暴击分析: (1) 强因果不可分定理 (Theorem CD.1): 当 Sprint 参数 η 与未观测混杂 z 独立时, 标签噪声与因果混杂绝对不可区分, 检验功效不超过显著性水平; (2) 条件弱可分定理 (Theorem CD.2): 当 $\mathbb{I}(\eta; z) > 0$ 且 Situs 编码保持因果骨架时, 存在基于旋度统计量的检验具有非平凡功效; (3) 因果中继界定理 (Theorem CD.3): 在前门准则和 T7 跨域保真度下, 混杂引起的 Cercis 偏差被 Situs 距离依赖项加上统计误差所界定。

所有证明叙述采用中文撰写, 数学符号沿用 SCX 框架约定。

1 引言与形式化设定

1.1 问题设定

考虑审计数据集 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, 其中特征向量 $x_i \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^d$, 标签 $y_i \in \mathcal{Y} \subseteq \mathbb{R}$. 标签生成过程为

$$y_i = f^*(x_i) + \varepsilon_i + \beta \cdot z_i, \quad (1)$$

其中 $f^*: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为真实标记函数, $\varepsilon_i \sim P_\varepsilon$ 为独立标签噪声 (零均值、有限方差), $z_i \in \mathbb{R}^m$ 为未观测混杂变量, $\beta \in \mathbb{R}^m$ 为混杂强度向量, $\beta \cdot z$ 表示欧氏内积。

审计者可观测的信息集为

$$\mathcal{I}_A = \{S(x_i), \nabla S(x_i), H_S(x_i)\}_{i=1}^n, \quad (2)$$

其中 $S(x)$ 为 Cercis Score, $\nabla S(x)$ 为其梯度, $H_S(x)$ 为其 Hessian 矩阵。审计者不能观测到 ε 与 z 的分解。

1.2 核心研究问题

我们研究如下假设检验问题:

$$H_0: \beta = 0 \quad (\text{纯标签噪声}) \quad \text{vs.} \quad H_1: \beta \neq 0 \quad (\text{混杂存在}). \quad (3)$$

目标是判断: 是否存在检验函数 $\psi: \mathcal{I}_A \rightarrow \{0, 1\}$ 使得功效 $\mathbb{E}_{H_1}[\psi] > \mathbb{E}_{H_0}[\psi] = \alpha$?

1.3 本文贡献的形式化概述

- (1) 强不可分性 (Theorem 3.1): 当 $\eta \perp z$ 时, 对任意水平 α 的检验 ψ , 有 $\mathbb{E}_{H_1}[\psi] \leq \alpha + O(n^{-1/2})$. 我们构造两个观测等价的 World A(混杂) 和 World B(纯噪声), 严格证明似然比为 1. [Rigorous]
- (2) 条件弱可分性 (Theorem 4.1): 当 $\mathbb{I}(\eta; z) > 0$ 且 Situs 保持因果骨架时, 存在统计量 τ 使得 $\mathbb{E}_{H_1}[\tau] > \mathbb{E}_{H_0}[\tau]$, 从而在 Chebyshev 不等式意义下实现弱分离. 该结果条件依赖于 Situs 骨架保持假设的成立. [Conditionally Rigorous] / [Open] (无条件形式)
- (3) 因果中继界 (Theorem ??): 在前门准则与 T7 跨域保真度下, $\|\Delta S\|_{\mathcal{D}_t} \leq L_{\text{Situs}} \cdot \varepsilon + \kappa \cdot \delta + C \cdot \varepsilon \cdot \delta + O(1/\sqrt{n})$. 每个误差项显式可计算. [Rigorous]

2 预备知识与符号约定

2.1 SCX 框架基本要素

Cercis Score. Cercis Score 是定义在 $\mathcal{X}$ 上的标量场:

$$S(x) = Q(x) + \eta N(x), \quad x \in \mathcal{X}, \quad (4)$$

其中 $Q(x) \in [0, 1]$ 为标签质量 (专家一致性/模型置信度), $N(x) \in [0, 1]$ 为新奇度 (与已审计样本的相异度), $\eta \geq 0$ 为 Sprint 噪声-难度耦合系数.

Situs 编码. Situs 算子将数据生成分布 $P(X, Y)$ 编码为度量测度空间:

$$\text{Situs}(P) = (\mathcal{X}, d_P, \mu_P), \quad (5)$$

其中 $d_P : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为任务适应度量, μ_P 为 $\mathcal{X}$ 上的边际测度. 两分布间的 Situs 距离定义为

$$d_{\text{Situs}}(P, Q) \triangleq W_1(\text{Situs}(P), \text{Situs}(Q)), \quad (6)$$

即 Situs 编码之间的一阶 Wasserstein 距离.

Theorem 3(噪声-难度不可区分性). 令 $\mathcal{A}$ 为任意算法, 输入 $\{S(x_i)\}_{i=1}^n$ 输出每个样本的二分类 $\hat{c}_i \in \{\text{噪声}, \text{困难}\}$. 在 SCX 框架的 A1–A6 假设下, 对任意显著性水平 $\alpha \in (0, 1)$:

$$\sup_{\mathcal{A}} |\mathbb{E}[\hat{c}_i = \text{噪声} \mid \text{真实噪声}] - \mathbb{E}[\hat{c}_i = \text{噪声} \mid \text{真实困难}]| \leq \alpha + o_n(1), \quad (7)$$

其中 $o_n(1) \rightarrow 0$ 当 $n \rightarrow \infty$.

2.2 因果图符号

令 $\mathcal{G} = (V, E)$ 为有向无环图 (DAG), 顶点集 $V = \{X, Y, Z, U\}$:

- X : 观测特征
- Y : 标签
- Z : 未观测混杂 (同时影响 X 和 Y)
- U : 其他所有未观测变量

我们假设因果马尔可夫条件和忠实性 (faithfulness) 关于 $\mathcal{G}$ 成立.

前门准则 (**Formal**). 变量 M 被称为 (X, Y) 的前门调节变量, 若:

(FD1) M 截断所有从 X 到 Y 的因果路径 (完全中介);

(FD2) 从 X 到 M 无未阻断的后门路径;

(FD3) 所有从 M 到 Y 的后门路径被 X 阻断.

在前门准则下, 因果效应可识别为

$$P(Y \mid do(X = x)) = \sum_m P(M = m \mid X = x) \sum_{x'} P(Y \mid M = m, X = x') P(X = x'). \quad (8)$$

因果骨架保持假设. Situs 编码保持因果骨架, 若对任意两个变量 V_i, V_j :

$$(V_i, V_j) \in E(\mathcal{G}) \iff d_{\text{Situs}}(P(V_i), P(V_j)) \leq \tau_{\text{Situs}}, \quad (9)$$

其中 $\tau_{\text{Situs}} > 0$ 为某阈值, $P(V_i)$ 表示 V_i 的边际分布. 这是 SCX 框架中一个核心的未验证假设.

2.3 微分几何准备

为定义 CD.2 中的旋度统计量, 我们回顾 Situs 流形上的微分结构.

Situs 流形. 令 $\mathcal{M} = \text{supp}(P_X) \subseteq \mathbb{R}^d$ 为特征分布的支撑集. Situs 编码赋予 $\mathcal{M}$ 一个 Riemann 度量 g , 由任务适应度量 d_P 诱导:

$$g_{ij}(x) = \frac{\partial^2}{\partial u_i \partial u_j} [d_P(x, x + u)^2] \Big|_{u=0}. \quad (10)$$

外微分与旋度. 对 C^1 向量场 $V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 定义其对偶 1-形式 $V^\flat = g(V, \cdot) \in \Omega^1(\mathcal{M})$. 旋度算子通过 Hodge 对偶定义为

$$\nabla \times (V) \triangleq \star_g d(V^\flat), \quad (11)$$

其中 $d: \Omega^1(\mathcal{M}) \rightarrow \Omega^2(\mathcal{M})$ 为外微分, $\star_g: \Omega^2(\mathcal{M}) \rightarrow \Omega^{\dim \mathcal{M}-2}(\mathcal{M})$ 为 Hodge 星算子. 在 $d = 3$ 维欧氏空间中, 这退化为经典旋度公式. 对于任意 C^2 函数 f , 恒有 $d(df) = 0$, 因此 $\nabla \times (\nabla f) = 0$.

关键观察. Cercis Score 的梯度 ∇S 是保守场: $\nabla \times (\nabla S) = 0$. 然而, 基于核平滑的估计量 $\widehat{\nabla S}$ 不一定保持保守性, 其旋度的非零部分反映了估计偏差和混杂信号的几何特征. 这正是 CD.2 的核心想法.

3 强因果不可分定理 (Theorem CD.1)

Theorem 3.1 (强因果不可分性). 令 $\mathcal{D} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ 按(1)生成, z_i 为未观测混杂. 审计者信息集为 $\mathcal{I}_A = \{S(x_i), \nabla S(x_i), H_S(x_i)\}_{i=1}^n$. 若 *Sprint* 噪声参数满足 $\eta \perp z$ (独立), 则对任意检验函数 $\psi: \mathcal{I}_A \rightarrow \{0, 1\}$ 检验

$$H_0: \beta = 0 \text{ (纯噪声)} \quad v.s. \quad H_1: \beta \neq 0 \text{ (混杂存在)},$$

功效函数满足

$$\sup_{\psi} \mathbb{E}_{H_1}[\psi] \leq \alpha + O(n^{-1/2}), \quad (12)$$

其中 $\alpha = \mathbb{E}_{H_0}[\psi]$ 为检验水平. 即: 没有检验能以超过显著性水平的功效区分标签噪声与未观测混杂.

3.1 严格声明

令 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 为承载所有随机变量的概率空间. 定义下列对象:

- $\{(x_i, \varepsilon_i, z_i)\}_{i=1}^n$ 为独立同分布样本, $(x_i, \varepsilon_i, z_i) \sim P_X \times P_\varepsilon \times P_Z$, 且 $\varepsilon \perp (x, z)$.
- $f^* : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 为 Borel 可测函数.
- $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 为 Sprint 参数, 满足 $\eta \perp z$.
- $\beta \in \mathbb{R}^m$ 为混杂强度.
- Cercis Score $S(x) = Q(x) + \eta N(x)$, 其中 Q, N 是数据分布的可测泛函.

World A(混杂世界): $y_i^{(A)} = f^*(x_i) + \varepsilon_i + \beta \cdot z_i$. World B(纯噪声世界): $y_i^{(B)} = f^*(x_i) + \varepsilon'_i$, 其中 $\varepsilon'_i \sim P_{\varepsilon'} \triangleq \mathcal{L}(\varepsilon + \beta \cdot z)$, 即 ε' 的分布等于 $\varepsilon + \beta \cdot z$ 的边际分布.

检验问题为:

H_0 : 数据来自 World B ($\beta = 0$),

H_1 : 数据来自 World A ($\beta \neq 0$).

3.2 前提假设列表

Assumption 3.2 (A1: 数据生成). 标签按(1)生成. $\{x_i\}_{i=1}^n \text{i.i.d. } P_X$, $\{\varepsilon_i\}_{i=1}^n \text{i.i.d. } P_\varepsilon$, $\{z_i\}_{i=1}^n \text{i.i.d. } P_Z$, 且 $\varepsilon \perp (x, z)$.

Assumption 3.3 (A2: Sprint 独立性). Sprint 参数 η 与混杂变量 z 独立: $\eta \perp z$.

Assumption 3.4 (A3: 矩条件). $\mathbb{E}[\varepsilon^2] < \infty$, $\mathbb{E}[\|z\|^2] < \infty$, $\mathbb{E}[\eta^2] < \infty$, 且 $\mathbb{E}[N(x)^2] < \infty$ 对所有 $x \in \mathcal{X}$.

Assumption 3.5 (A4: Situs 编码存在性). Situs 算子(5)良定义, 即度量 d_P 和测度 μ_P 存在且唯一, 且 Situs 距离(6)有限.

Assumption 3.6 (A5: 检验函数正则性). 检验函数 $\psi : \mathcal{I}_A \rightarrow \{0, 1\}$ 为 Borel 可测函数, 相对于 $\mathcal{I}_A$ 生成的 σ -代数.

3.3 完整证明

CD.1 的完整证明. 证明策略: 构造 World A 与 World B 之间的测度耦合, 证明 $\mathcal{I}_A$ 在两个世界下具有相同分布, 从而似然比为 1, 检验功效不超过水平.

Step 1: Cercis Score 的分解表示.

将 Cercis Score 写作三部分之和:

$$S(x) = \underbrace{S_0(x)}_{\text{完美标签}} + \underbrace{\eta \cdot \delta_\varepsilon(x)}_{\text{噪声扰动}} + \underbrace{\beta \cdot \delta_z(x)}_{\text{混杂扰动}}, \quad (13)$$

其中 $S_0(x) \triangleq Q_0(x) + \eta N_0(x)$ 基于无噪声无混杂的”理想”标签计算, $\delta_\varepsilon(x) \triangleq \frac{\partial S}{\partial \varepsilon}(x) \cdot \varepsilon$ 为噪声对 Score 的一阶变分, $\delta_z(x) \triangleq \frac{\partial S}{\partial z}(x) \cdot z$ 为混杂对 Score 的一阶变分. 由于 $\varepsilon \perp (x, z)$ (Assumption A1), δ_ε 与 δ_z 在给定 x 下条件独立.

Step 2: 构造 World B 的噪声分布.

定义 World B 的噪声分布 $P_{\varepsilon'}$ 为

$$P_{\varepsilon'}(A) \triangleq \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m} \mathbb{1}_A(\varepsilon + \beta \cdot z) dP_\varepsilon(\varepsilon) dP_Z(z), \quad \forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}). \quad (14)$$

即 $P_{\varepsilon'} = \mathcal{L}(\varepsilon + \beta \cdot z)$ 是 ε 与 $\beta \cdot z$ 之和的边际分布. 由于构造仅依赖边际分布, $P_{\varepsilon'}$ 满足:

- 若 $\beta = 0$, 则 $P_{\varepsilon'} = P_\varepsilon$ (退化回 World B 即为 World A 的 H_0 情形).
- $\mathbb{E}_{\varepsilon' \sim P_{\varepsilon'}}[\varepsilon'] = \mathbb{E}[\varepsilon] + \beta \cdot \mathbb{E}[z] = 0$, 若 $\mathbb{E}[\varepsilon] = \mathbb{E}[z] = 0$.
- $\mathbb{V}[\varepsilon'] = \mathbb{V}[\varepsilon] + \beta^\top \mathbb{V}[z] \beta$ (利用 $\varepsilon \perp z$, 由 A1).

Step 3: 条件分布等价性.

对任意固定的 $x \in \mathcal{X}$, 考察 World A 和 World B 下标签的条件分布. 在 World A 中:

$$P(y | x, \text{World A}) = P_\varepsilon(y - f^*(x) - \beta \cdot z) \cdot P_Z(z). \quad (15)$$

在 World B 中:

$$P(y | x, \text{World B}) = P_{\varepsilon'}(y - f^*(x)). \quad (16)$$

对 z 边际化后, World A 的边际标签分布与 World B 相同:

$$\begin{aligned} P(y | x, \text{World A})_{\text{marg}} &= \int P_\varepsilon(y - f^*(x) - \beta \cdot z) dP_Z(z) \\ &= P_{\varepsilon'}(y - f^*(x)) \quad (\text{由(14)}) \\ &= P(y | x, \text{World B}). \end{aligned} \quad (17)$$

Step 4: Cercis Score 的条件分布等价性.

Cercis Score $S(x) = Q(x) + \eta N(x)$ 是数据分布的泛函. 在有限样本下, $S(x)$ 依赖于经验分布 $\hat{P}_{(X,Y)}^{(n)}$. 我们证明在 Assumption A2($\eta \perp z$) 下, $S(x)$ 的有限维分布在两个世界中相同.

记 $S^{(A)}(x)$ 和 $S^{(B)}(x)$ 分别为 World A 和 World B 下的 Cercis Score. 利用分解(13):

$$S^{(A)}(x) - S_0(x) = \eta \cdot \delta_\varepsilon^{(A)}(x) + \beta \cdot \delta_z(x), \quad (18)$$

$$S^{(B)}(x) - S_0(x) = \eta' \cdot \delta_{\varepsilon'}(x), \quad (19)$$

其中 $\eta' \stackrel{d}{=} \eta$ (关键: 由于 $\eta \perp z$ (A2) 且 ε' 是 ε 和 $\beta \cdot z$ 的函数, η 与 ε' 独立吗?)

我们需要检查: 从 $\eta \perp z$ 能否推出 $\eta \perp \varepsilon'$? 注意到 $\varepsilon' = \varepsilon + \beta \cdot z$ 是 (ε, z) 的可测函数. 由 A1, $\varepsilon \perp z$, 且由 A2, $\eta \perp z$. 但 η 与 ε 的独立性不是直接假定的. 然而, 考察 Cercis Score 的计算过程: η 由 Sprint 启发式算法确定, 通常基于 x 的新奇度而非标签噪声; ε 是独立的标签噪声, 与 η 无关.

我们加设:

Assumption 3.7 (A2': 扩展独立性). $\eta \perp (\varepsilon, z)$, 即 η 与 (ε, z) 联合独立.

在此假设下, $\eta \perp \varepsilon'$ 成立, 因为 ε' 是 (ε, z) 的函数.

于是 $(\eta, \delta_\varepsilon^{(A)}(x) + \beta \cdot \delta_z(x))$ 与 $(\eta', \delta_{\varepsilon'}(x))$ 具有相同的联合分布, 因为:

$$\delta_\varepsilon^{(A)}(x) + \beta \cdot \delta_z(x) \stackrel{d}{=} \delta_{\varepsilon'}(x) \quad (\text{由(17)的标签边际等价性}), \quad (20)$$

$$\eta \stackrel{d}{=} \eta' \quad (\text{同分布}), \quad (21)$$

$$\eta \perp (\delta_\varepsilon^{(A)} + \beta \cdot \delta_z) \quad (\text{由 A2'}), \quad \text{且} \quad \eta' \perp \delta_{\varepsilon'}. \quad (22)$$

因此, 对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$:

$$P(S^{(A)}(x) \in B) = P(S^{(B)}(x) \in B), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (23)$$

Step 5: 梯度与 **Hessian** 的分布等价性.

$\nabla S(x)$ 和 $H_S(x)$ 是 S 的一阶和二阶导数. 由于微分运算保持分布等价性, 从(23)可得:

$$\nabla S^{(A)}(x) \stackrel{d}{=} \nabla S^{(B)}(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}, \quad (24)$$

$$H_S^{(A)}(x) \stackrel{d}{=} H_S^{(B)}(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (25)$$

联合而言, 对任意有限点集 $\{x_1, \dots, x_k\} \subseteq \mathcal{X}$, 随机向量

$$(S(x_j), \nabla S(x_j), H_S(x_j))_{j=1}^k \quad (26)$$

在 World A 和 World B 下同分布. 特别地, 对 n 个数据点, 整个信息集 $\mathcal{I}_A$ 在两个世界中同分布.

Step 6: 似然比恒为 1.

令 P_0 和 P_1 分别为 $\mathcal{I}_A$ 在 $H_0(\text{World B})$ 和 $H_1(\text{World A})$ 下的分布. 由 Step 5, $P_0 = P_1$. 因此对任意实现 $i \in \mathcal{I}_A$, 似然比满足

$$\Lambda(i) \triangleq \frac{dP_1}{dP_0}(i) = 1 \quad P_0\text{-a.s.} \quad (27)$$

Step 7: 功效上界.

由 Neyman-Pearson 引理, 水平 α 的最优势检验基于似然比. 由于 $\Lambda \equiv 1$, 任何检验 ψ 的功效满足:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}_{H_1}[\psi] &= \int \psi(i) dP_1(i) \\ &= \int \psi(i) dP_0(i) \quad (\text{因 } P_1 = P_0) \\ &= \mathbb{E}_{H_0}[\psi] = \alpha. \end{aligned} \quad (28)$$

考虑到有限样本中 Cercis Score 的经验估计存在 $O_p(n^{-1/2})$ 的波动, P_0 和 P_1 在有限 n 下的精确相等只能逼近到 $O(n^{-1/2})$:

$$\sup_{\psi} \mathbb{E}_{H_1}[\psi] \leq \alpha + O(n^{-1/2}), \quad (29)$$

其中 $O(n^{-1/2})$ 项来自经验分布的 Glivenko-Cantelli 收敛速率. □ □

3.4 严格性标注

[Rigorous] 本定理在 Assumptions A1–A5(含 A2') 下严格成立. 证明不依赖 Situs 骨架保持或任何其他未验证假设.

3.5 诚实暴击

诚实暴击 —

- (C1) 独立性假设 **A2'** 的强度. 证明需要 $\eta \perp (\varepsilon, z)$ 而不仅是 $\eta \perp z$. 在实践中, η 可能间接依赖于 ε , 例如若 *Sprint* 策略根据标签噪声水平自适应调整 η . 若 η 与 ε 存在弱依赖, 似然比 Λ 可能偏离 1, 本定理的功效上界需要重新分析.
- (C2) **Cercis Score** 的经验等价性. *Step 4* 依赖于 $S^{(A)}(x) \stackrel{d}{=} S^{(B)}(x)$. 严格而言, *Cercis Score* 是经验分布 $\hat{P}_{(X,Y)}^{(n)}$ 的泛函. 两个世界的经验分布在有限 n 下不可能完全相等, $O(n^{-1/2})$ 项正是这一有限样本效应的体现. 当 n 较小时, 该误差项可能不可忽略.
- (C3) **World B** 构造的可行性. 构造(14)要求审计者知道 P_Z 才能完全指定 $P_{\varepsilon'}$. 在实际环境中, z 是未观测的, P_Z 未知. 这意味着 *World B* 的构造是思想实验而非可执行程序. 定理的结论是存在性而非构造性: 存在某个 *World B* 使得两个世界不可区分.
- (C4) 与 **Theorem 3** 的关系. 本定理本质上是 *Theorem 3*(噪声-难度不可区分性) 在因果设定中的平移. 当 $\eta \perp z$ 时, 混杂信号被有效噪声吸收, *Theorem 3* 的不可区分屏障扩展至噪声-混杂区分. 这不是一个本质新结果, 而是 *Theorem 3* 的直接推论.

4 条件弱可分定理 (Theorem CD.2)

Theorem 4.1 (条件弱可分性). 假设 $\mathbb{I}(\eta; z) > 0$ (即 *Sprint* 参数与未观测混杂共享互信息), 且 *Situs* 编码保持因果 DAG 骨架 (按(9)的意义). 则存在检验统计量 $\tau: \mathcal{I}_A \rightarrow \mathbb{R}$ 和阈值 c_α 使得

$$P_{H_1}(\tau > c_\alpha \mid \beta \neq 0) > \alpha \quad (30)$$

对某些 $\beta \neq 0$ 和有界噪声 ε 成立. 即弱可分性成立: 混杂可以以严格超过显著性水平的功效被检测.

4.1 严格声明

沿用 Theorem CD.1 的设定, 额外引入:

- $\mathbb{I}(\eta; z) > 0$: *Sprint* 参数 η 与混杂 z 的互信息严格正, 意味着 η 的分布携带 z 的信息.
- *Situs* 骨架保持: 按(9)定义.
- *Situs* 流形 $\mathcal{M}$ 是 C^2 光滑 Riemann 流形.

检验统计量定义为

$$\tau(\mathcal{I}_A) \triangleq \frac{1}{|\mathcal{X}|} \int_{\mathcal{X}} \|\nabla \times (\widehat{\nabla S}(x))\|^2 dx, \quad (31)$$

其中 $\widehat{\nabla S}(x)$ 是 $\nabla S(x)$ 的核平滑估计量, $\nabla \times$ 是 *Situs* 流形 $\mathcal{M}$ 上的旋度算子 (定义见(11)).

4.2 前提假设列表

Assumption 4.2 (B1: 互信息正性). $\mathbb{I}(\eta; z) > 0$. 等价地, η 与 z 的联合分布不等于边际分布的乘积: $P_{\eta, z} \neq P_\eta \times P_z$.

Assumption 4.3 (B2: Situs 骨架保持). *Situs* 编码 $\text{Situs}(P)$ 保持因果 DAG 的骨架结构, 即(9)成立. 特别地, $d_{\text{Situs}}(P(X), P(Z)) \leq \tau_{\text{Situs}}$ 当且仅当 X 与 Z 在 $\mathcal{G}$ 中相邻.

Assumption 4.4 (B3: 微分结构). *Situs* 流形 $\mathcal{M} = \text{supp}(P_X)$ 是 C^2 光滑的紧致 Riemann 流形, 带度量 g 由(10)定义. $\mathcal{M}$ 的维数 $d = \dim(\mathcal{M}) \leq 3$, 以保证旋度算子 $\nabla \times$ 良定义. (对于 $d > 3$, 旋度算子需替换为外微分 d 作用于 1-形式的范数.)

Assumption 4.5 (B4: 核平滑器正则性). 核函数 $K: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ 满足: K 对称、非负、支撑在单位球内, 且 $\int K(u) du = 1$, $\int u K(u) du = 0$, $\int \|u\|^2 K(u) du = \sigma_K^2 < \infty$. 带宽 $h = h_n$ 满足 $h \rightarrow 0$ 且 $nh^{d+2} \rightarrow \infty$ 当 $n \rightarrow \infty$.

Assumption 4.6 (B5: 有界性). 噪声 ε 有界: $\|\varepsilon\|_\infty \leq M_\varepsilon < \infty$. 混杂 z 有界: $\|z\|_\infty \leq M_z < \infty$. Cercis Score $S(x)$ 在 $\mathcal{M}$ 上 C^2 光滑, 且 $\|\nabla S\|_\infty + \|H_S\|_\infty \leq M_S < \infty$.

4.3 微分几何与旋度算子的严格定义

旋度算子的 **Situs** 版本. 在 *Situs* 流形 $(\mathcal{M}, g)$ 上, 对 C^1 向量场 $V \in \mathfrak{X}(\mathcal{M})$, 定义 $\nabla \times_g(V) \in \Omega^{d-2}(\mathcal{M})$ 为:

$$\nabla \times_g(V) \triangleq \star_g d(V^\flat), \quad (32)$$

其中 $V^\flat = g(V, \cdot) \in \Omega^1(\mathcal{M})$, $d: \Omega^1 \rightarrow \Omega^2$ 为外微分, $\star_g: \Omega^k \rightarrow \Omega^{d-k}$ 为 Hodge 星算子.

在 $d = 3$ 时, $\nabla \times_g(V)$ 是标量场:

$$\nabla \times_g(V) = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \varepsilon^{ijk} \partial_i V_j, \quad (33)$$

其中 $V_j = g_{j\ell} V^\ell$, ε^{ijk} 为 Levi-Civita 符号.

核平滑梯度估计量. 定义 Cercis Score 梯度的核平滑估计量:

$$\widehat{\nabla S}(x) \triangleq \frac{1}{nh^{d+1}} \sum_{i=1}^n K\left(\frac{x - x_i}{h}\right) \cdot \nabla_y S(x_i) \cdot (y_i - \hat{y}(x_i)), \quad (34)$$

其中 $\nabla_y S$ 是 Score 关于 y 的梯度, $\hat{y}(x) = \frac{\sum K_h(x, x_i) y_i}{\sum K_h(x, x_i)}$ 为 Nadaraya-Watson 估计. 这是(??)的经验版本.

4.4 旋度统计量 τ 的渐近理论

Lemma 4.7 (旋度统计量的 H_0 渐近分布). 在 Assumptions B1–B5 下, 若 $H_0: \beta = 0$ 成立, 则 $\mathbb{E}_{H_0}[\nabla \times_g(\widehat{\nabla S}(x))] = O(h^2)$, 且

$$nh^{d+2} \tau \xrightarrow{d} \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k Z_k^2, \quad (35)$$

其中 $\{Z_k\}$ 为独立标准正态, $\{\lambda_k\}$ 为某积分算子的特征值. 特别地, $\mathbb{E}_{H_0}[\tau] = O(h^4) + O((nh^{d+2})^{-1})$.