

### 第三节

#### 第十章


### 格林公式及其应用

#### 一、格林公式

#### 二、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

#### 一、格林公式

区域  $D$  分类  $\begin{cases} \text{单连通区域 (无“洞”区域)} \\ \text{多连通区域 (有“洞”区域)} \end{cases}$



域  $D$  边界  $L$  的**正向**: **域的内部靠左**

**定理1.** 设区域  $D$  是由分段光滑正向曲线  $L$  围成, 函数  $P(x, y), Q(x, y)$  在  $D$  上具有连续一阶偏导数, 则有


$$\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (\text{格林公式})$$

或 
$$\iint_D \left( \frac{\partial}{\partial x} \frac{Q}{P} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

**证明:** 1) 若  $D$  既是  $X$ -型区域, 又是  $Y$ -型区域, 且

$$D: \begin{cases} \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x) \\ a \leq x \leq b \end{cases}$$

$$D: \begin{cases} \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y) \\ c \leq y \leq d \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \text{则 } \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy \\ &= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy - \int_{\widehat{CAE}} Q(x, y) dy \\ &= \int_{\widehat{CBE}} Q(x, y) dy + \int_{\widehat{EAC}} Q(x, y) dy \end{aligned}$$

$$\text{即 } \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \int_L Q(x, y) dy \quad ①$$

同理可证


$$-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \int_L P(x, y) dx \quad ②$$

①、②两式相加得:

$$\iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

2) 若  $D$  不满足以上条件, 则可通过加辅助线将其分割为有限个上述形式的区域, 如图

$$\begin{aligned} \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy &= \sum_{k=1}^n \iint_{D_k} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \sum_{k=1}^n \int_{\partial D_k} P dx + Q dy \quad (\partial D_k \text{ 表示 } D_k \text{ 的正向边界}) \\ &= \oint_L P dx + Q dy \quad \text{证毕} \end{aligned}$$



$$\text{格林公式 } \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

**推论:** 正向闭曲线  $L$  所围区域  $D$  的面积

$$A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$$

**例如,** 椭圆  $L: \begin{cases} x = a \cos \theta \\ y = b \sin \theta \end{cases}, 0 \leq \theta \leq 2\pi$  所围面积

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} \int_L x dy - y dx \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (ab \cos^2 \theta + ab \sin^2 \theta) d\theta = \pi ab \end{aligned}$$

**例1.** 设  $L$  是一条分段光滑的闭曲线, 证明

$$\oint_L 2xy \, dx + x^2 \, dy = 0$$

**证:** 令  $P = 2xy$ ,  $Q = x^2$ , 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 2x - 2x = 0$$

利用格林公式, 得

$$\oint_L 2xy \, dx + x^2 \, dy = \iint_D 0 \, dx \, dy = 0$$


**例2.** 计算  $\iint_D e^{-y^2} \, dx \, dy$ , 其中  $D$  是以  $O(0,0)$ ,  $A(1,1)$ ,  $B(0,1)$  为顶点的三角形闭域.

**解:** 令  $P = 0$ ,  $Q = xe^{-y^2}$ , 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2}$$

利用格林公式, 有

$$\begin{aligned} \iint_D e^{-y^2} \, dx \, dy &= \oint_{\partial D} xe^{-y^2} \, dy \\ &= \int_{OA} xe^{-y^2} \, dy = \int_0^1 ye^{-y^2} \, dy \\ &= \frac{1}{2}(1 - e^{-1}) \end{aligned}$$




**例3.** 计算  $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ , 其中  $L$  为一无重点且不过原点的分段光滑正向闭曲线.

**解:** 令  $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ,  $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

则当  $x^2 + y^2 \neq 0$  时,  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$


设  $L$  所围区域为  $D$ , 当  $(0,0) \notin D$  时, 由格林公式知

$$\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$



当  $(0,0) \in D$  时, 在  $D$  内作圆周  $l: x^2 + y^2 = r^2$ , 取逆时针方向, 记  $L$  和  $l$  所围的区域为  $D_1$ , 对区域  $D_1$  应用格林公式, 得

$$\begin{aligned} \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \int_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} &= \oint_{L+l} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \iint_{D_1} 0 \, dx \, dy = 0 \\ \therefore \int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} &= \int_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta = 2\pi \end{aligned}$$



## 二、平面上曲线积分与路径无关的等价条件

**定理2.** 设  $D$  是单连通域, 函数  $P(x,y)$ ,  $Q(x,y)$  在  $D$  内具有一阶连续偏导数, 则以下四个条件等价:

(1) 沿  $D$  中任意光滑闭曲线  $L$ , 有  $\oint_L Pdx + Qdy = 0$ .

(2) 对  $D$  中任一分段光滑曲线  $L$ , 曲线积分  $\int_L Pdx + Qdy$  与路径无关, 只与起止点有关.

(3)  $Pdx + Qdy$  在  $D$  内是某一函数  $u(x,y)$  的全微分,

即  $du(x,y) = Pdx + Qdy$

(4) 在  $D$  内每一点都有  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ .


**证明** (1)  $\Rightarrow$  (2)

设  $L_1, L_2$  为  $D$  内任意两条由  $A$  到  $B$  的有向分段光滑曲线, 则

$$\begin{aligned} \int_{L_1} Pdx + Qdy - \int_{L_2} Pdx + Qdy &= \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2}^{-1} Pdx + Qdy \\ &= \int_{L_1+L_2^{-1}} Pdx + Qdy = 0 \quad (\text{根据条件(1)}) \\ \therefore \int_{L_1} Pdx + Qdy &= \int_{L_2} Pdx + Qdy \end{aligned}$$

**说明:** 积分与路径无关时, 曲线积分可记为

$$\int_{AB} Pdx + Qdy = \int_A^B Pdx + Qdy$$



证明 (2)  $\Rightarrow$  (3)

在  $D$  内取定点  $A(x_0, y_0)$  和任一点  $B(x, y)$ , 因曲线积分与路径无关, 有函数


$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P dx + Q dy$$

则  $\Delta_x u = u(x + \Delta x, y) - u(x, y)$

$$= \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} P dx + Q dy = \int_{(x, y)}^{(x+\Delta x, y)} P dx = P(x + \theta \Delta x, y) \Delta x$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta_x u}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} P(x + \theta \Delta x, y) = P(x, y)$$

同理可证  $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ , 因此有  $du = P dx + Q dy$



证明 (3)  $\Rightarrow$  (4)

设存在函数  $u(x, y)$  使得

$$du = P dx + Q dy$$

$$\text{则 } \frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y), \quad \frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$$

$$\therefore \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

$P, Q$  在  $D$  内具有连续的偏导数, 所以  $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$   
从而在  $D$  内每一点都有

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

证明 (4)  $\Rightarrow$  (1)


设  $L$  为  $D$  中任一段光滑闭曲线, 所围区域为  $D' \subset D$  (如图), 因此在  $D'$  上

$$\frac{\partial P}{\partial y} \equiv \frac{\partial Q}{\partial x}$$

利用格林公式, 得

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_{D'} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$

证毕




说明: 根据定理2, 若在某区域内  $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ , 则

- 1) 计算曲线积分时, 可选择方便的积分路径;
- 2) 求曲线积分时, 可利用格林公式简化计算, 若积分路径不是闭曲线, 可添加辅助线;
- 3) 可用积分法求  $du = P dx + Q dy$  在域  $D$  内的原函数:

取定点  $(x_0, y_0) \in D$  及动点  $(x, y) \in D$ , 则原函数为

$$u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy$$

$$\text{或 } u(x, y) = \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^x P(x, y) dx$$




例4. 计算  $\int_L (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy$ , 其中  $L$  为上半圆周  $y = \sqrt{4x - x^2}$  从  $O(0, 0)$  到  $A(4, 0)$ .

解: 为了使用格林公式, 添加辅助线段  $\overline{AO}$ , 它与  $L$  所围区域为  $D$ , 则

$$\text{原式} = \oint_{L+\overline{AO}} (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy + \int_{\overline{OA}} (x^2 + 3y) dx + (y^2 - x) dy$$

$$= 4 \iint_D dx dy + \int_0^4 x^2 dx$$

$$= 8\pi + \frac{64}{3}$$



例5. 验证  $xy^2 dx + x^2 y dy$  是某个函数的全微分, 并求出这个函数.

证: 设  $P = xy^2$ ,  $Q = x^2 y$ , 则  $\frac{\partial P}{\partial y} = 2xy = \frac{\partial Q}{\partial x}$


由定理2 可知, 存在函数  $u(x, y)$  使

$$du = xy^2 dx + x^2 y dy$$

$$u(x, y) = \int_{(0,0)}^{(x,y)} xy^2 dx + x^2 y dy$$

$$= \int_0^x x \cdot 0 dx + \int_0^y x^2 y dy$$

$$= \int_0^y x^2 y dy = \frac{1}{2} x^2 y^2$$




**例6.** 验证  $\frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$  在右半平面 ( $x > 0$ ) 内存在原函数, 并求出它.

**证:** 令  $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$ ,  $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

$$\text{则 } \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial Q}{\partial y} \quad (x > 0)$$


由 **定理 2** 可知存在原函数

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= -\int_1^x 0 \cdot dx + x \int_0^y \frac{dy}{x^2 + y^2} = \arctan \frac{y}{x} \quad (x > 0) \end{aligned}$$



或

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(1,0)}^{(x,y)} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} \\ &= \int_0^y \frac{dy}{1 + y^2} - y \int_1^x \frac{dx}{x^2 + y^2} \\ &= \arctan y + \arctan \frac{1}{y} - \arctan \frac{x}{y} \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan \frac{x}{y} \\ &= \arctan \frac{y}{x} \quad (x > 0) \end{aligned}$$



**例7.** 设质点在力场  $\vec{F} = \frac{k}{r^2}(y, -x)$  作用下沿曲线  $L$ :  $y = \frac{\pi}{2} \cos x$  由  $A(0, \frac{\pi}{2})$  移动到  $B(\frac{\pi}{2}, 0)$ , 求力场所作的功  $W$


(其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ ).

**解:**  $W = \int_L \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_L \frac{k}{r^2}(y dx - x dy)$

令  $P = \frac{ky}{r^2}$ ,  $Q = -\frac{kx}{r^2}$ , 则有


$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{k(x^2 - y^2)}{r^4} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad (x^2 + y^2 \neq 0)$$

可见, 在不含原点的单连通区域内积分与路径无关.



取圆弧  $\widehat{AB}$ :  $x = \frac{\pi}{2} \cos \theta$ ,  $y = \frac{\pi}{2} \sin \theta$  ( $\theta: \frac{\pi}{2} \rightarrow 0$ )

$$\begin{aligned} W &= \int_{\widehat{AB}} \frac{k}{r^2}(y dx - x dy) \\ &= k \int_{\pi/2}^0 -(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{\pi}{2} k \end{aligned}$$



**思考:** 积分路径是否可以取  $\overline{AO} \cup \overline{OB}$ ? 为什么?

注意, 本题只在不含原点的单连通区域内积分与路径无关!

### 内容小结

1. 格林公式  $\oint_L P dx + Q dy = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$

2. 等价条件

设  $P, Q$  在  $D$  内具有一阶连续偏导数, 则有

$\int_L P dx + Q dy$  在  $D$  内与路径无关.

$\implies$  对  $D$  内任意闭曲线  $L$  有  $\oint_L P dx + Q dy = 0$

$\implies$  在  $D$  内有  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$

$\implies$  在  $D$  内有  $du = P dx + Q dy$

### 思考与练习

1. 设  $L: x^2 + \frac{1}{4}y^2 = 1$ ,  $l: x^2 + y^2 = 4$ , 且都取正向, 问下列计算是否正确?

$$(1) \int_L \frac{x dy - 4y dx}{x^2 + y^2} \neq \int_l \frac{x dy - 4y dx}{x^2 + y^2}$$


$$= \frac{1}{4} \oint_l x dy - 4y dx = \frac{1}{4} \iint_D 5 d\sigma = 5\pi$$

$$(2) \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$$

$$= \frac{1}{4} \oint_l x dy - y dx = \frac{1}{4} \iint_D 2 d\sigma$$

$$= 2\pi \quad \checkmark$$


**提示:**  $x^2 + y^2 \neq 0$  时  
 (1)  $\frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$   
 (2)  $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$



2. 设  $\text{grad} u(x, y) = (x^4 + 4xy^3, 6x^2y^2 - 5y^4)$ , 求  $u(x, y)$ .

**提示:**  $du(x, y) = (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy$

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \int_{(0,0)}^{(x,y)} (x^4 + 4xy^3)dx + (6x^2y^2 - 5y^4)dy + C \\ &= \int_0^x x^4 dx + \int_0^y (6x^2y^2 - 5y^4)dy + C \\ &= \frac{1}{5}x^5 + 2x^2y^3 - y^5 + C \end{aligned}$$



**备用题 1.** 设  $C$  为沿  $x^2 + y^2 = a^2$  从点  $(0, a)$  依逆时针到点  $(0, -a)$  的半圆, 计算

$$\int_C \frac{y^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} dx + [ax + 2y \ln(x + \sqrt{a^2 + x^2})] dy$$


**解:** 添加辅助线如图, 利用格林公式.

$$\text{原式} = \int_{C+C'} - \int_{C'}$$

$$= \iint_D \left[ a + \frac{2y}{\sqrt{a^2 + x^2}} - \frac{2y}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right] dx dy$$

$$- \int_{-a}^a (2y \ln a) dy$$

$$= \frac{1}{2} \pi a^3$$



2. 质点  $M$  沿着以  $AB$  为直径的半圆, 从  $A(1, 2)$  运动到点  $B(3, 4)$ , 在此过程中受力  $\vec{F}$  作用,  $\vec{F}$  的大小等于点  $M$  到原点的距离, 其方向垂直于  $OM$ , 且与  $y$  轴正向夹角为锐角, 求变力  $\vec{F}$  对质点  $M$  所作的功. (90 考研)

**解:** 由图知  $\vec{F} = (-y, x)$ , 故所求功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_{\widehat{AB}} -y dx + x dy$$

$$= \left( \int_{\widehat{AB} + \overline{BA}} + \int_{\overline{AB}} \right) (-y dx + x dy)$$

$$= 2 \iint_D dx dy + \int_1^3 [-(x+1) + x] dx$$

$$= 2\pi - 2$$

