



线性代数 —— 先修课

第三章 矩 阵

§ 3.4 分块矩阵

内容提要

- 分块矩阵的概念
- 常用的矩阵分块方式
- 矩阵分块的主要原则
- 分块矩阵的运算
- 几类特殊的分块矩阵

(一) 分块矩阵的概念

- 在处理有特点的大矩阵时，需要进行分块处理，如：


$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & & & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ & \ddots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ & & -1 & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & 0 \\ -I & B \end{vmatrix}$$

- 超大矩阵的运算，不适合于储存在高速计算机的内存里。



5	36	35	34	33	32	31	4	36	35	34	33	32	31	3	36	35	34	33	32	31	
38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	
44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			
31	1	36	35	34	33	32	31	2	36	35	34	33	32	31	3	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	
44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			
31	8	36	35	34	33	32	31	9	36	35	34	33	32	31	10	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	
44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			

- 运用分块矩阵，允许计算机处理小块的子矩阵，使得我们处理超大矩阵运算成为可行的。



5	36	35	34	33	32	31	4	36	35	34	33	32	31	3	36	35	34	33	32	31
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26
	44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48	
6	36	35	34	33	32	31	1	36	35	34	33	32	31	2	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26
	44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48	
6	36	35	34	33	32	31	9	36	35	34	33	32	31	8	36	35	34	33	32	31
38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30	38	17	16	15	14	13	30
39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29	39	18	5	4	3	12	29
40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28	40	19	6	1	2	11	28
41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27	41	20	7	8	9	10	27
42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26	42	21	22	23	24	25	26
	44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48	
44	45	46	47	48			44	45	46	47	48			44	45	46	47	48		

定义： 对一个 $m \times n$ 的矩阵 A ，用若干横线和竖线把 A 的行分成 p 个部分，把它的列分成 q 个部分，整个矩阵 A 分成 pq 个小矩阵，即

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1q} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2q} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pq} \end{bmatrix}$$

注意和代数余子式的区分.

其中每个小矩阵 A_{ij} ($1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq q$)称为矩阵 A 的**子块**， A 也可视为由子块 A_{ij} 构成的 $p \times q$ 阶矩阵，称为**分块矩阵**.

(二) 常用分块方式

- 分成四块, 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}$$

- 按列分块, 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = (\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3, \vec{\alpha}_4)$$

- 按行分块, 例如:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{\beta}_1 \\ \vec{\beta}_2 \\ \vec{\beta}_3 \end{bmatrix}$$

(三) 矩阵分块的三个原则

- (1) 体现原矩阵特点, 按需划分
- (2) 能够把子块看作元素进行运算
- (3) 保持原有运算性质

例1

$$A = \begin{bmatrix} 2 & \boxed{0} & \boxed{0} \\ 1 & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \hline 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \hline 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ 1 & 2 & \boxed{0} & \boxed{0} & \boxed{0} \\ \hline 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

(四) 分块矩阵的运算

1. 分块矩阵的加法：设分块矩阵 A 与 B 的行列数均相同 (同型矩阵), 且采用同样的分块方法, 即

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & \cdots & A_{pq} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{p1} & \cdots & B_{pq} \end{bmatrix}$$

加法分块
需全同.

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数和列数均相同 (同型矩阵), 则

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & \cdots & A_{1q} + B_{1q} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{p1} + B_{p1} & \cdots & A_{pq} + B_{pq} \end{bmatrix}.$$

2. 分块矩阵的数乘

设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}$, (可任意分块), λ 是数, 则

$$\lambda A = \begin{bmatrix} \lambda A_{11} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{bmatrix}.$$

数乘分块
可任意.

例 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$, $\lambda = 2$, 则 $2A = \begin{bmatrix} 1 \times 2 & 2 \times 2 & 3 \times 2 \\ 3 \times 2 & 2 \times 2 & 1 \times 2 \\ 4 \times 2 & 5 \times 2 & 6 \times 2 \end{bmatrix}$

3. 分块矩阵的转置

例2 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$ 将 A 与 A^T 如下分块, 有

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } A_{11} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}, A_{12} = O_{2 \times 2}, A_{21} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}, A_{22} = I_2.$$

$$A^T = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}, \text{ 其中 } B_{11} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}, B_{12} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}, B_{21} = O_{2 \times 2}, B_{22} = I_2.$$

$$\Rightarrow A_{11} = B_{11}^T, A_{12} = B_{21}^T = O_{2 \times 2}, A_{21} = B_{12}^T, A_{22} = B_{22}^T = I_2 \Rightarrow A_{ij} = B_{ji}^T \quad (1 \leq i, j \leq 2)$$

设 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix}_{m \times n}$ 则分块矩阵 A 的转置为:

$$A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}_{n \times m}.$$

即，每一块子矩阵均做转置，且行列下标互换.

★ 4. 分块矩阵的乘法

设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C_{m \times l}$, 要求

- A 的列数 = B 的行数 = n
- A 的列的分法 = B 的行的分法 (n 的加法有序分拆)

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{r1} & \cdots & C_{rt} \end{bmatrix},$$

$m \times n$ $n \times l$

$(n_1 + \dots + n_s)$ $(n_1 + \dots + n_s)$

设 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C_{m \times l}$ ，则对乘积矩阵 C ，有

- C 的行数及行分块法由 A 的行数及行分块法决定；
 C 的列数及列分块法由 B 的列数及行分块法决定。

左行右列中求和
(注意 A_{ik}, B_{kj} 次序)

- C 的每个子块 $C_{ij} = A_{i1}B_{1j} + A_{i2}B_{2j} + \cdots + A_{is}B_{sj} = \sum_{k=1}^s A_{ik}B_{kj}$, $\begin{pmatrix} 1 \leq i \leq r, \\ 1 \leq j \leq t. \end{pmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1s} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{r1} & \cdots & A_{rs} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1t} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ C_{r1} & \cdots & C_{rt} \end{bmatrix},$$

分块乘法：
左行右列中分同

$$\begin{array}{ccc} \xrightarrow{m \times n} & \xrightarrow{n \times l} & \xrightarrow{m \times l} \\ \underline{(m_1 + \cdots + m_r)} & \underline{(n_1 + \cdots + n_s)} & \underline{(m_1 + \cdots + m_r)} \\ \times \underline{(n_1 + \cdots + n_s)} & \times \underline{(l_1 + \cdots + l_t)} & \times \underline{(l_1 + \cdots + l_t)} \end{array}$$

例1(续)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A: 4 \times 3 \rightarrow$$

$$(2+2) \times (1+2)$$

$$B: 3 \times 5 \rightarrow$$

$$(1+2) \times (2+3)$$

$$AB: 4 \times 5 \rightarrow$$

$$(2+2) \times (2+3)$$

验证: $C_{11} = \sum_{k=1}^2 A_{1k} B_{k1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + O_{2 \times 2}$

$$C_{21} = \sum_{k=1}^2 A_{2k} B_{k1} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 9 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

例1(续)

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A: 4 \times 3 \rightarrow$$

$$(2+2) \times (1+2)$$

$$B: 3 \times 5 \rightarrow$$

$$(1+2) \times (2+3)$$

$$AB: 4 \times 5 \rightarrow$$

$$(2+2) \times (2+3)$$

验证: $C_{12} = \sum_{k=1}^2 A_{1k} B_{k2} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = O_{2 \times 3}$

$$C_{22} = \sum_{k=1}^2 A_{2k} B_{k2} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

例3 $AB = C$ 的不同理解:

$$(1) \quad A_{m \times n} B_{n \times l} = A(B_1, B_2, \dots, B_l) = (AB_1, AB_2, \dots, AB_l)$$

$$AB = C = (C_1, C_2, \dots, C_l) \Rightarrow C_j = AB_j, \quad j = 1, \dots, l.$$

$$(2) \quad AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ \vdots \\ A_m B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C'_1 \\ C'_2 \\ \vdots \\ C'_m \end{bmatrix} = C \Rightarrow C'_i = A_i B, \quad i = 1, \dots, m.$$

$$(3) \quad AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} (B_1, B_2, \dots, B_l) = C \Rightarrow \begin{aligned} c_{ij} &= A_i B_j & i &= 1, \dots, m; \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}, & j &= 1, \dots, l. \end{aligned}$$

例3 (续) 特别地, 当 $\underline{AB = O}$ 时, 有

$$AB = A(B_1, B_2, \dots, B_l) = (AB_1, AB_2, \dots, AB_l) = (\vec{0}, \vec{0}, \dots, \vec{0}) \\ \Rightarrow AB_j = \vec{0}, j = 1, \dots, l.$$

说明 B 的每一列都是齐次线性方程组 $A\vec{x} = \vec{0}$ 的一个解.

类似地, 可以考虑 A 按行分块, 而 B 作为一整块的情形.

$$AB = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} B = \begin{bmatrix} A_1 B \\ A_2 B \\ \vdots \\ A_m B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vec{0}^T \\ \vec{0}^T \\ \vdots \\ \vec{0}^T \end{bmatrix} \Rightarrow A_i B = \vec{0}^T, i = 1, \dots, m.$$

这种观点将来
很有用!

说明 A 的每一行的转置都是齐次线性方程组 $B^T \vec{x} = \vec{0}$ 的一个解.

(四) 特殊的分块矩阵

● 准对角矩阵

设 A 为方阵, 若 $A = \begin{bmatrix} A_{11} & & \\ & \ddots & \\ & & A_{nn} \end{bmatrix} := \text{diag}(A_{11}, \dots, A_{nn})$

其中, A_{11}, \dots, A_{nn} 都是小方阵, 则称 A 为准对角矩阵.

注: 准对角矩阵可作为对角矩阵的推广情形, 是最简单的一类分块矩阵.

例如 $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ O & A_{22} \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & O \\ O & B_{22} \end{bmatrix}.$

- **准上三角矩阵:**

设矩阵 A 的行与列均分为个 n 子块, 且

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \mathbf{O} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

则称 A 为准上三角矩阵.

- **准下三角矩阵:**

设矩阵 A 的行与列均分为个 n 子块, 且

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \mathbf{O} & \cdots & \mathbf{O} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & \mathbf{O} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

则称 A 为准下三角矩阵.

一般地，准三角形矩阵不一定是方阵，例如：例1中的

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 9 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

表示为分块矩阵的乘积为：

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & O \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & O \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & O \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

注意做乘积时的次序

则乘积矩阵也为准下三角形矩阵. 更一般地, 在可乘的情况下, 上式推导对所有分为4块的准下三角形矩阵均成立.

问题：对一般的准三角形矩阵，是否有类似的结论？

● 准三角形矩阵的运算性质

定理 在可运算的条件下, 准上(下)三角形矩阵的**加法, 数乘与乘法**仍是准上(下)三角形角矩阵.

证明: (1) 先来看加法和数乘. 对于两个有相同分块的准三角形矩阵

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ O & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ O & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & B_{nn} \end{bmatrix}$$

容易验证, 以下矩阵仍为准上三角阵,

$$A + B = \begin{bmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1n} + B_{1n} \\ O & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2n} + B_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & A_{nn} + B_{nn} \end{bmatrix}, \quad kA = \begin{bmatrix} kA_{11} & kA_{12} & \cdots & kA_{1n} \\ O & kA_{22} & \cdots & kA_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & kA_{nn} \end{bmatrix}.$$

(2) 再考虑乘法. 若准上三角形矩阵 A 与 B 可乘, 则 A 与 B 的行列均分拆为相同的块数(设分为 n 块), 下证明:

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & * & \cdots & * \\ O & A_{22}B_{22} & \cdots & * \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & A_{nn}B_{nn} \end{bmatrix},$$

对 n 进行归纳. 当 $n=2$ 时, 容易验证

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} \\ O & B_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ O & A_{22}B_{22} \end{bmatrix}$$

假设结论对 $n-1$ 成立, 下考虑 n 的情况.

对 A, B 进行如下的分块

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ O & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & A_{nn} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} A_{11} & A' \\ O & A'' \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1n} \\ O & B_{22} & \cdots & B_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ O & O & \cdots & B_{nn} \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} B_{11} & B' \\ O & B'' \end{bmatrix},$$

则

$$AB = \begin{bmatrix} A_{11}B_{11} & A_{11}B' + A'B'' \\ O & A''B'' \end{bmatrix}$$

其中 A'', B'' 为行列均分拆成 $n-1$ 个子块的准下三角形矩阵, 则由归纳假设知 $A''B''$ 为准下三角形矩阵.

从而 AB 为准下三角形矩阵, 即结论对 n 也成立. ■

由于三角形矩阵是特殊的准三角形矩阵，故由上述定理，即可得如下关于三角形矩阵的结论：

推论 在可运算的条件下，上(下)三角形矩阵的加法，数乘与乘法仍是上(下)三角形角矩阵.

本讲小结

➤ 矩阵分块的原则

(1) 按需划分使方便; (2) 把块看作元素; (3) 保持原有运算

➤ 常用的矩阵分块方式

(1) 分四块; (2) 按行按列; (3) 按特殊分块矩阵(准对角阵, 准三角阵)

➤ 分块矩阵的运算:

- 加法、数乘、转置

- ★乘法: 左行右列中同分 $A_{m \times n} B_{n \times l} = C_{m \times l}$,
左行右列中求和 $C_{ij} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kj}$,
 $\begin{cases} m = m_1 + \cdots + m_r \\ n = n_1 + \cdots + n_s \\ l = l_1 + \cdots + l_t \end{cases}$ (有序拆分)