

第十一章 无穷级数

无穷级数 { 数项级数
幂级数
付氏级数

无穷级数是研究函数的工具 { 表示函数
研究性质
数值计算

第一节

第十一章

常数项级数的概念和性质

- 一、常数项级数的概念
- 二、无穷级数的基本性质
- 三、级数收敛的必要条件
- *四、柯西审敛原理

一、常数项级数的概念

引例1. 用圆内接正多边形面积逼近圆面积.

依次作圆内接正 3×2^n ($n=0, 1, 2, \dots$) 边形, 设 a_0 表示内接正三角形面积, a_k 表示边数增加时增加的面积, 则圆内接正 3×2^n 边形面积为

$$a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$n \rightarrow \infty$ 时, 这个和逼近于圆的面积 A .

即

$$A = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$



引例2. 小球从 1 米高处自由落下, 每次跳起的高度减少一半, 问小球是否会在某时刻停止运动? 说明道理.

由自由落体运动方程 $s = \frac{1}{2}gt^2$ 知 $t = \sqrt{\frac{2s}{g}}$

设 t_k 表示第 k 次小球落地的时间, 则小球运动的时间为

$$\begin{aligned} T &= t_1 + 2t_2 + 2t_3 + \dots \\ &= \sqrt{\frac{2}{g}} \left[1 + 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{(\sqrt{2})^2} + \dots \right) \right] \\ &= \sqrt{\frac{2}{g}} [1 + 2(\sqrt{2} + 1)] \approx 2.63 \text{ (s)} \end{aligned}$$

定义: 给定一个数列 $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$ 将各项依次相加, 简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n + \dots$$

称上式为**无穷级数**, 其中第 n 项 u_n 叫做级数的一般项, 级数的前 n 项和

$$S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \dots + u_n$$

称为级数的**部分和**. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数

收敛, 并称 S 为级数的**和**, 记作

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称无穷级数**发散**.

当级数收敛时, 称差值

$$r_n = S - S_n = u_{n+1} + u_{n+2} + \dots$$

为级数的**余项**. 显然

$$\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$$

例1. 讨论等比级数(又称几何级数)

$$\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^n + \cdots \quad (a \neq 0)$$

(q 称为公比) 的敛散性.

解: 1) 若 $q \neq 1$, 则部分和

$$S_n = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = \frac{a-aq^n}{1-q}$$

当 $|q| < 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{a}{1-q}$,
因此级数收敛, 其和为 $\frac{a}{1-q}$;

当 $|q| > 1$ 时, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \infty$, 从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$,
因此级数发散.

2). 若 $q = 1$, 则

当 $q = 1$ 时, $S_n = na \rightarrow \infty$, 因此级数发散;

当 $q = -1$ 时, 级数成为

$$a - a + a - a + \cdots + (-1)^{n-1}a + \cdots$$

因此
$$S_n = \begin{cases} a, & n \text{ 为奇数} \\ 0, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 因此级数发散.

综合 1)、2) 可知, $|q| < 1$ 时, 等比级数收敛;

$|q| \geq 1$ 时, 等比级数发散.

例2. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n+1}{n}$; (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$.

解: (1)

$$\begin{aligned} S_n &= \ln \frac{2}{1} + \ln \frac{3}{2} + \ln \frac{4}{3} + \cdots + \ln \frac{n+1}{n} \\ &= (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \cdots + (\ln(n+1) - \ln n) \\ &= \ln(n+1) \rightarrow \infty \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以级数 (1) 发散;

技巧:
利用“拆项相消”求和

$$\begin{aligned} (2) \quad S_n &= \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} \\ &= \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

所以级数 (2) 收敛, 其和为 1.

技巧:
利用“拆项相消”求和

例3. 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right)$ 的敛散性.

解:

$$\begin{aligned} \because \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) &= \ln \frac{n^2-1}{n^2} = \ln(n+1) + \ln(n-1) - 2\ln n \\ \therefore S_n &= \sum_{k=2}^n \ln\left(1 - \frac{1}{k^2}\right) \\ &= [\ln 3 + \ln 1 - 2\ln 2] + [\ln 4 + \ln 2 - 2\ln 3] + [\ln 5 + \\ &\quad + \ln 3 - 2\ln 4] + \cdots + [\ln(n+1) + \ln(n-1) - 2\ln n] \\ &= -\ln 2 + \ln(n+1) - \ln n = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) - \ln 2 \\ \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n &= -\ln 2, \text{ 故原级数收敛, 其和为 } -\ln 2. \end{aligned}$$

二、无穷级数的基本性质

性质1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 即 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则各项乘以常数 c 所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n$ 也收敛, 其和为 cS .

证: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 则 $\sigma_n = \sum_{k=1}^n cu_k = cS_n$,

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = cS$$

这说明 $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n$ 收敛, 其和为 cS .

说明: 级数各项乘以非零常数后其敛散性不变.

性质2. 设有两个收敛级数

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \quad \sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

证: 令 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k, \sigma_n = \sum_{k=1}^n v_k$, 则

$$\tau_n = \sum_{k=1}^n (u_k \pm v_k) = S_n \pm \sigma_n \rightarrow S \pm \sigma \quad (n \rightarrow \infty)$$

这说明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$.

说明:

(1) 性质2 表明收敛级数可逐项相加或减.

(2) 若两级数中一个收敛一个发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 必发散. (用反证法可证)

但若二级数都发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 不一定发散.

例如, 取 $u_n = (-1)^{2n}, v_n = (-1)^{2n+1}$,

$$\text{而 } u_n + v_n = 0$$

性质3. 在级数前面加上或去掉有限项, 不会影响级数的敛散性.

证: 将级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的前 k 项去掉, 所得新级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{k+n}$ 的部分和为

$$\sigma_n = \sum_{l=1}^n u_{k+l} = S_{k+n} - S_k$$

由于 $n \rightarrow \infty$ 时, σ_n 与 S_{k+n} 极限状况相同, 故新旧两级数敛散性相同.

当级数收敛时, 其和的关系为 $\sigma = S - S_k$.

类似可证前面加上有限项的情况.

性质4. 收敛级数加括弧后所成的级数仍收敛于原级数的和.

证: 设收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若按某一规律加括弧, 例如

$$(u_1 + u_2) + (u_3 + u_4 + u_5) + \cdots$$

则新级数的部分和序列 $\sigma_m (m=1, 2, \cdots)$ 为原级数部分和序列 $S_n (n=1, 2, \cdots)$ 的一个子序列, 因此必有

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma_m = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

用反证法可证

推论: 若加括弧后的级数发散, 则原级数必发散.

注意: 收敛级数去括弧后所成的级数不一定收敛.

例如, $(1-1) + (1-1) + \cdots = 0$, 但 $1-1+1-1+\cdots$ 发散.

例4. 判断级数的敛散性:

$$\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} + \frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} + \frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} + \cdots$$

解: 考虑加括号后的级数

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}-1} - \frac{1}{\sqrt{2}+1} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{3}-1} - \frac{1}{\sqrt{3}+1} \right) + \left(\frac{1}{\sqrt{4}-1} - \frac{1}{\sqrt{4}+1} \right) + \cdots$$

$$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}-1} - \frac{1}{\sqrt{n}+1} = \frac{2}{n-1}$$

$\therefore \sum_{n=2}^{\infty} a_n = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 从而原级数发散.

三、级数收敛的必要条件

设收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

证: $u_n = S_n - S_{n-1}$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

可见: **若级数的一般项不趋于0, 则级数必发散.**

例如, $\frac{1}{2} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} - \frac{4}{5} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1} + \cdots$, 其一般项为

$$u_n = (-1)^{n-1} \frac{n}{n+1}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 不趋于0, 因此这个级数发散.

注意: $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 并非级数收敛的充分条件.

例如, 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$

虽然 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$, 但此级数发散.

事实上, 假设调和级数收敛于 S , 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} - S_n) = 0$$

$$\text{但 } S_{2n} - S_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+3} + \cdots + \frac{1}{2n} > \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$$

矛盾! 所以假设不真.

例5. 判断下列级数的敛散性, 若收敛求其和:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n}.$$

解: (1) 令 $u_n = \frac{e^n n!}{n^n}$, 则

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{e^{n+1} (n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{e^n n!}{n^n}} = \frac{e}{(1 + \frac{1}{n})^n} > 1 \quad (n=1, 2, \cdots)$$

故 $u_n > u_{n-1} > \cdots > u_1 = e$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$, 这说明级数(1) 发散.

(2) 因

$$\frac{1}{n^3 + 3n^2 + 2n} = \frac{1}{n(n+1)(n+2)} = \frac{1}{2} \frac{(n+2) - n}{n(n+1)(n+2)}$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{n(n+1)} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \quad (n=1, 2, \cdots)$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^3 + 3k^2 + 2k} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k(k+1)} - \frac{1}{(k+1)(k+2)} \right]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{(n+1)(n+2)} \right] \quad \text{进行拆项相消}$$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{4}$, 这说明原级数收敛, 其和为 $\frac{1}{4}$.

$$(3) \quad S_n = \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

$$S_n - \frac{1}{2} S_n = \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n} \right) - \left(\frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{5}{2^4} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n+1}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n-1}}}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}} = \frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^{n+1}}$$

$$\therefore S_n = 3 - \frac{1}{2^{n-2}} - \frac{2n-1}{2^n}, \text{ 故 } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 3,$$

这说明原级数收敛, 其和为 3.

*四、柯西审敛原理

定理. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+,$

当 $n > N$ 时, 对任意 $p \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$$

证: 设所给级数部分和数为 $S_n (n=1, 2, \cdots)$, 因为

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| = |S_{n+p} - S_n|$$

所以, 利用数列 $S_n (n=1, 2, \cdots)$ 的柯西审敛原理(第一章第六节) 即得本定理的结论.

例6. 利用柯西审敛原理判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的敛散性.

解: 对任意 $p \in \mathbb{Z}^+$, 有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}|$$

$$= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \cdots + \frac{1}{(n+p)^2}$$

$$< \frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \cdots + \frac{1}{(n+p-1)(n+p)}$$

$$= \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n+p-1} - \frac{1}{n+p} \right)$$

$$= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$$

$\therefore \forall \varepsilon > 0$, 取 $N \geq \left[\frac{1}{\varepsilon} \right]$, 当 $n > N$ 时, 对任意 $p \in \mathbb{Z}^+$, 都有

$$\left| u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p} \right| < \frac{1}{n} < \varepsilon$$

由柯西审敛原理可知, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛.