

第二节

第三章

洛必达法则

一、 $\frac{0}{0}$ 型未定式

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

三、其他未定式

微分中值定理 $\begin{cases} \text{函数的性态} \\ \updownarrow \\ \text{导数的性态} \end{cases}$

本节研究:

函数之商的极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} \left(\frac{0}{0} \text{ 或 } \frac{\infty}{\infty} \text{ 型} \right)$

转化

洛必达法则

导数之商的极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$



一、 $\frac{0}{0}$ 型未定式

定理 1.

$$1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$$

2) $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 $\dot{U}(a)$ 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \text{ 存在 (或为 } \infty \text{)}$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad (\text{洛必达法则})$$

定理条件: 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$

2) $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 $\dot{U}(a)$ 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$

$$3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \text{ 存在 (或为 } \infty \text{)}$$

证: 不妨假设 $f(a) = F(a) = 0$, 在指出的邻域内任取 $x \neq a$, 则 $f(x), F(x)$ 在以 x, a 为端点的区间上满足柯西定理条件, 故

$$\frac{f(x)}{F(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{F(x) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \quad (\xi \text{ 在 } x, a \text{ 之间})$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \stackrel{3)}{=} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

洛必达法则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

推论 1. 定理 1 中 $x \rightarrow a$ 换为

$x \rightarrow a^+, x \rightarrow a^-, x \rightarrow \infty, x \rightarrow +\infty, x \rightarrow -\infty$

之一, 条件 2) 作相应的修改, 定理 1 仍然成立.

推论 2. 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 仍属 $\frac{0}{0}$ 型, 且 $f'(x), F'(x)$ 满足定理 1 条件, 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f''(x)}{F''(x)}$$

例 1. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^3 - x^2 - x + 1}$.

$\frac{0}{0}$ 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 3}{3x^2 - 2x - 1}$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} = \frac{3}{2}$$

注意: 不是未定式不能用洛必达法则!

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{6x}{6x - 2} \neq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{6}{6} = 1$$

例2. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan x}{\frac{1}{x}}$.

$\frac{0}{0}$ 型

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}}$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1} = 1$$

$\frac{\infty}{\infty}$ 型

思考: 如何求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{\pi}{2} - \arctan n}{\frac{1}{n}}$ (n 为正整数)?

二、 $\frac{\infty}{\infty}$ 型未定式

定理 2.

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a} |F(x)| = \infty$
- 2) $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 $U(a)$ 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 (或为 ∞)

$$\longrightarrow \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)} \quad (\text{洛必达法则})$$

证: 仅就极限 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)}$ 存在的情形加以证明.

1) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \neq 0$ 的情形

$\frac{0}{0}$ 型

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\frac{f(x)}{F(x)}}}{\frac{1}{f(x)}} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-\frac{1}{F^2(x)} F'(x)}{-\frac{1}{f^2(x)} f'(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left[\left(\frac{f(x)}{F(x)} \right)^2 \frac{F'(x)}{f'(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{F(x)} \right)^2 \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{f'(x)} \\ \therefore 1 &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{F'(x)}{f'(x)} \end{aligned}$$

$$\text{从而 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

2) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = 0$ 的情形. 取常数 $k \neq 0$,

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{f(x)}{F(x)} + k \right) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + kF(x)}{F(x)}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + kF(x)}{F(x)} = k \neq 0, \text{ 可用 1) 中结论}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x) + kF'(x)}{F'(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left[\frac{f'(x)}{F'(x)} + k \right]$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$$

3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \infty$ 时, 结论仍然成立. (证明略)

说明: 定理中 $x \rightarrow a$ 换为

$$x \rightarrow a^+, \quad x \rightarrow a^-, \quad x \rightarrow \infty,$$

$$x \rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow -\infty$$

之一, 条件 2) 作相应的修改, 定理仍然成立.

例3. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} \quad (n > 0)$.

$\frac{\infty}{\infty}$ 型

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx^n} = 0$

例4. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\mu}{e^{\lambda x}} \quad (\mu > 0, \lambda > 0)$.

$\frac{\infty}{\infty}$ 型

解: (1) μ 为正整数的情形.

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu x^{\mu-1}}{\lambda e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu(\mu-1)x^{\mu-2}}{\lambda^2 e^{\lambda x}}$$

$$= \cdots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\mu!}{\lambda^\mu e^{\lambda x}} = 0$$

例4. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\mu}{e^{\lambda x}}$ ($\mu > 0, \lambda > 0$).

(2) μ 不为正整数的情形.

存在正整数 k , 使当 $x > 1$ 时,

$$x^k < x^\mu < x^{k+1}$$

从而 $\frac{x^k}{e^{\lambda x}} < \frac{x^\mu}{e^{\lambda x}} < \frac{x^{k+1}}{e^{\lambda x}}$ 用夹逼准则

由(1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^k}{e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{k+1}}{e^{\lambda x}} = 0$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\mu}{e^{\lambda x}} = 0$$

说明:

1) 例3, 例4 表明 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$\ln x, x^n (n > 0), e^{\lambda x} (\lambda > 0)$$

后者比前者趋于 $+\infty$ 更快.

2) 在满足定理条件的某些情况下洛必达法则不能解决计算问题. 例如,

用洛必达法则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x}$$

而

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} = 1$$

3) 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 不存在 ($\neq \infty$) 时,

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{F(x)} \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{F'(x)}.$$

例如, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} \neq \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \cos x}{1}$


\parallel

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sin x}{x}\right) = 1$$

极限不存在

三、其他未定式: $0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, 1^\infty, \infty^0$ 型


解决方法:



例5. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \ln x$ ($n > 0$). $0 \cdot \infty$ 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-n x^{-n-1}}$


$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(-\frac{x^n}{n}\right) = 0$$



例6. 求 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x)$. $\infty - \infty$ 型

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{\cos x}\right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin x}{\cos x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\cos x}{-\sin x} = 0$$



例7. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$. 0^0 型

解: $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{x \ln x}$

利用例5

$$= e^0 = 1$$

例8. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2 \sin x}$.

$\frac{0}{0}$ 型

解: 注意到 $\sin x \sim x$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - 1}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^2 x}{3x^2} \quad \boxed{\sec^2 x = 1 + \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{3} \end{aligned}$$

例9. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n}(\sqrt[n]{n} - 1)$. $\infty \cdot 0$ 型

法1 用洛必达法则

分析: 为用洛必达法则, 必须改求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{2}}(x^{\frac{1}{x}} - 1)$.
但对本题用此法计算很繁!


法2 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{2}}(n^{\frac{1}{n}} - 1)$ $\sqrt[n]{n} = e^{\frac{1}{n} \ln n} \rightarrow 1$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^{\frac{1}{n} \ln n} - 1}{n^{-\frac{1}{2}}} \quad \boxed{e^u - 1 \sim u}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \ln n}{n^{-\frac{1}{2}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{\frac{1}{2}}} = 0$$

内容小结

洛必达法则



思考与练习

1. 设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ 是未定式极限, 如果 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 极限不存在, 是否 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 的极限也不存在? 举例说明.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \frac{3}{2}$

分析: 原式 $= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{x} = \frac{1}{2}(3 + 0)$

$\ln(1+x) \sim x$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \cot x \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \frac{1}{6}$

分析: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x (x - \sin x)}{x \sin^2 x}$ $\boxed{\sin x \sim x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \quad \boxed{1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6}$$

4. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$

解: 令 $t = \frac{1}{x}$, 则

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2t} - 2\sqrt{1+t} + 1}{t^2} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+2t)^{-\frac{1}{2}} - (1+t)^{-\frac{1}{2}}}{2t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-(1+2t)^{-\frac{3}{2}} + \frac{1}{2}(1+t)^{-\frac{3}{2}}}{2} = -\frac{1}{4} \end{aligned}$$

备用题 求下列极限：

$$1) \lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x]; \quad 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}};$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}.$$

解: 1) $\lim_{x \rightarrow \infty} [x^2 \ln(1 + \frac{1}{x}) - x] \quad (\text{令 } t = \frac{1}{x})$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \left[\frac{1}{t^2} \ln(1+t) - \frac{1}{t} \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t) - t}{t^2}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+t} - 1}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-t}{2t(1+t)} = -\frac{1}{2}$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^{100}} e^{-\frac{1}{x^2}}$$

解: 令 $t = \frac{1}{x^2}$, 则

$$\text{原式} = \lim_{t \rightarrow +\infty} t^{50} e^{-t} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{t^{50}}{e^t} \quad (\text{用洛必达法则})$$

$$= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50t^{49}}{e^t} \quad (\text{继续用洛必达法则})$$

$$= \cdots = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{50!}{e^t} = 0$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x+x^2) + \ln(1-x+x^2)}{\sec x - \cos x}$$

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[(1+x^2)^2 - x^2]}{\sec x - \cos x}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2+x^4)}{\sec x - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x^4}{\sec x - \cos x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x + 4x^3}{\sec x \tan x - (-\sin x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{x}{\sin x} \cdot \frac{2 + 4x^2}{\sec^2 x + 1} \right] = 1$$