важно знать:

- правила и усредненные цифры стоит корректировать под себя и свое самочувствие
- чем больше лишнего веса, тем выше динамика в начале
- адаптация. да, будет плато, это нормально (см, кг)
- при адекватном дефиците и нагрузке - плато будет не часто

путь по которому жир уходит из организма:

1. адекватный дефицит калорий + повышение активности = сигнал для ЦНС
2. нарушение гомеостаз (привычного метаболизма и режима) = ЦНС реагирует выбросом гормонов
3. липолиз - разрушение накопленного жира
4. разрушенные жировые клетки выходят в кровь и тратятся и при любой активности

СТАНДАРТНЫЙ ДЕФИЦИТ
10-15% от текущего рациона

Если вы посчитали себе по формуле дефицит на 1800ккал, но прямо сейчас в среднем едите на 2500ккал, достаточно будет снизить для начала до 2200-2100ккал, эффект УЖЕ будет, потому что вы сократили фактическое потребление. Когда адаптируетесь к этой цифре, можно будет при необходимости понизить дальше.

максимальный дефицит 500ккал от вашей нормы
это рекомендованное значение для здорового похудения без откатов, срывов и нарушения метаболизма.

важно:
дефицит НЕ ДОЛЖЕН приближаться к базовому обмену!!
это гарантированные срывы и полетевший метаболизм:

Метаболическая адаптация - процесс, когда организм при экстремально низком потреблении калорий переходит в режим энергосбережения, как следствие - апатия, вялость, заторможенность, запас всех поступающих калорий, нарушаются работа органов и гормонов, цикл и здоровье могут полететь.
Это тяжелый процесс, когда организм привыкает к пониженным калориям и перестает отдавать энергию, запасы жира.

Представляем голод как пружинку, чем сильнее мы давим, тем раньше и жестче она стрельнет обратно. потому снижаем ккалораж плавно и подконтрольно:

- сначала 10%
- через пару недель, если нет динамики - 15%
- потом при необходимости 20%