



中国研究生创新实践系列大赛
中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生
数学建模竞赛

学 校 南通大学

参赛队号 22103040108

	1.沈陈强
队员姓名	2.张瑞年
	3.袁梦

中国光谷·“华为杯”第十九届中国研究生 数学建模竞赛

草原放牧策略研究

针对问题四，首先根据问题所给沙漠化指数预测模型，结合《栅格化预警模式研究》，对涉及到 9 个因子进行数据关联与收集，同时进行清洗与处理；其次，根据附件 14、15 中牧区与示范牧户进行监测点分类并计算沙漠化程度指数值；然后，根据本文所给板结化模型描述与指标关系，利用问一、问三模型，给出土壤板结化定量定义；最后，根据所明确

的板结化与沙漠指数化定义，在不同放牧强度约束的条件下，建立**多目标最小优化模型**。

针对问题五，为满足可持续发展要求，给定降水情形，分析放牧最大阈值。首先，根据题干要求附件 14、15 并不包含降水信息，即**纳入附件 8 降水量信息**，进行表单合并与二次处理；其次，为确定羊群的最优阈值，构建降水量-羊群阈值模型，同时为满足可持续发展要求，结合问四的土壤沙漠化指数进行**共同量化**；然后，使用粒子群优化算法，通过不断迭代的方法，从全局角度，获取最优解；最后，根据要求填充定量降水情况下，最大羊群阈值表。

针对问题六，在两种不同情况（附件 13 和问题 4 中得到的放牧方案）下，分别预测四个示范区的土地状态。首先，使用附件 13 的放牧压力推测出四个示范区的放牧强度，结合附件 14 分析出示范区所属放牧小区；其次，从物理、化学角度对土地状态进行机理性分析，确定**土壤肥力主要影响因素为全氮和温度**，土壤湿度与植被覆盖数据集沿用上文；最后，利用问题一、二、三、四的模型分别对四个示范区的土壤肥力（全氮和温度）、土壤湿度、植被覆盖进行预测，并用图示呈现预测结果。

关键词：放牧策略；交互性；时间序列平稳性分析；ARI 预测模型；差分自回归移动平均

公众号：竞赛资料网

目 录

1 问题重述	6
1.1 问题背景	6
1.2 数据介绍与建模目标	6
1.3 问题重述	7
2 模型假设	8
3 符号说明	8
4 问题一： 建立放牧-机理影响模型	9
4.1 问题一分析	9
4.2 数据预处理	9
4.2.1 数据集的确定	9
4.2.2 nan 值的处理	11
4.2.3 异常值处理	12
4.3 建立放牧-植被影响模型	13
4.3.1 影响因素的确定	13
4.3.2 植被生长机理性研究	13
4.3.3 建立放牧-植被影响模型	14
4.4 建立放牧-土壤物理性质影响模型	16
4.4.1 影响物理性质因素的选取	16
4.4.2 模型建立	17
5 问题二： 多维影响-时序性的 ARI 预测模型	19
5.1 问题二分析	19
5.2 建立多维影响-时序性的 ARI 预测模型	19
5.2.1 数据合并与处理	19
5.2.2 数据降维与筛选	20
5.2.3 建立多维影响-时序性的 ARI 预测模型	20
5.3 验证模型-基于时序性的 LSTM-SA 模型	23
5.3.1 验证模型的建立	23
5.3.2 验证数据对比	25
5.4 问二表单填充	26
6 问题三： 建立土壤-放牧化学模型	27
6.1 问题三分析	27
6.2 数据集的确定	27
6.3 建立放牧-土壤化学性质影响预测模型	28
6.3.1 影响因素的确定	28
6.3.2 土壤化学性质机理性研究	28
6.3.3 建立放牧-土壤化学性质影响预测模型	29
6.3.4 放牧-化学性质影响预测模型求解	31
6.4 问三表单填充	31
7 问题四： 建立土壤-放牧化学模型	33
7.1 问题四分析	33
7.2 附件数据处理	33
7.2.1 数据收集	33

7.2.2 数据预处理	34
7.3 确定监测点沙漠化指数	35
7.3.1 确定沙漠化指数预测模型	35
7.3.2 分析因子与放牧强度间相关性	35
7.3.3 建立放牧-沙漠化指数模型	36
7.3.4 指数确定	36
7.4 定量土壤板结化定义	37
7.5 沙漠化程度与板结化程度最小优化问题	38
7.5.1 建立多目标最优模型	38
7.5.2 模型求解	38
8 问题五： 最优阈值确定	39
8.1 问题五分析	39
8.2 附件数据处理	39
8.3 确定最优阈值	40
8.3.1 优化目标	40
8.3.2 目标函数	40
8.3.3 决策变量	40
8.3.4 约束条件	40
8.3.5 建立降水量-羊群阈值模型	41
8.3.5 降水量-羊群阈值模型求解	42
8.3.6 最优阈值确定	42
9 问题六： 图示演化四个示范区土地状态预测结果	43
9.1 问题六分析	43
9.2 数据分析与机理分析	43
9.3 示范区土地状态预测结果	44
10 模型的评价和推广	46
10.1 模型的评价	46
10.1.1 模型的优点	46
10.1.2 模型的缺点	46
10.2 模型的推广	46
10.2.1 适用性	46
10.2.2 鲁棒性	46
11 参考文献	47
附录	48

1 问题重述

1.1 问题背景

草原作为世界分布最广、占地面积最大的陆地植被类型之一，对于生态环境具有重要作用。我国为维持和改善草原生态环境，颁布“退牧还草”政策，针对多草原实施五种不同的放牧方式，以合理性的放牧政策推动绿色可持续发展。

我国草原类型多样，以内蒙古锡林郭勒草原作为温带草原代表与典型示例，其地理坐标介于东经[110°50', 119°58']，北纬[41°30', 46°45']间，且全年降雨量均处于 340mm，具有良好的畜牧环境，也发挥着天然生态屏障作用。

考虑到放牧政策对于草原生态发展趋势的影响，主要从两个方面进行考虑，放牧方式与放牧强度，根据有关文献进行量化划分，同时也对畜牧种类进行统一的标准化，以羊作为主单位，具体内容见表 1.1 所示。

表 1.1 放牧方式与放牧强度量化划分表

名称	内容
放牧方式	全年连续放牧、禁牧、选择划区轮牧、轻度放牧、生长季休牧共计 5 种
放牧强度	对照、轻度放牧强度、中度放牧强度、重度放牧强度共计 4 种
理想轮牧的	对照(NG:0)、轻度放牧强(LGI:2)、中度放牧强度(MGI:4)和重度放牧强度(HGI:8)(单位:羊/天/公顷)
放牧强度量化指标	对照(NG:0)、轻度放牧强(LGI:1-2)、中度放牧强度(MGI:3-4)和重度放牧强度(HGI:5-8)(单位:羊/天/公顷)
实际轮牧的	标准单位: 羊; 大牲畜折算系数 6.0 (牛、马、骆驼), 大牲畜幼崽折算系数 3.0 (包括羊羔)
放牧强度量化指标	
牲畜折算系数	

同时，草原植物的生长也受到环境与放牧的影响，例如降水、土壤物化性质、畜牧吞食等，直接关乎草原整体的发展趋势。

鉴于草原放牧方式与放牧强度的两种因素，以内蒙古锡林郭勒草原为主要示例，采用可持续发展原则为基准，研究最佳草原放牧策略，寻求生态环境良性发展中经济与利益的最大化。

1.2 数据介绍与建模目标

本文主要包含十五个附件数据，分为两个大类：基本数据与监测点数据，其具体内容见表 1.2 所示。

表 1.2 数据文件介绍表

序号	文件名	内容
附件 1	内蒙古锡林郭勒草原概况	草原介绍、地理位置、占地面积、气候类型、降水量变化、土壤性质、植被覆盖类型
附件 2	锡林郭勒统计年鉴(2016-2021)	锡林郭勒盟统计局对该市的整体数据进行调查统计分析(具体针对第一产业、自然资源、公报等信息分析)
附件 3	土壤湿度(2012-2022)	经纬度、10cm 湿度、40cm 湿度、100cm 湿度、200cm 湿度 单位(kg/m ²)
附件 4	土壤蒸发量(2012-2022)	经纬度、土壤蒸发量(W/m ²)、土壤蒸发量(mm)

附件 5	绿植覆盖率(2020-2022)	经纬度、绿植覆盖率
附件 6	植被指数-NDVI(2012-2022)	经纬度、植被指数(NDVI)---NDVI 含义: [-1,1]
附件 7	锡林郭勒土壤基本数据	土壤化学成分(浅层、深层含量)
附件 8	锡林郭勒盟气候(2012-2022)	经纬度、气温、时间、降水天数、降雨量、积雪深度、能见度、海平面、风速
附件 9	径流量(2012-2022)	经纬度、径流量(m^3/s)、径流量(m^3)
附件 10	叶面积指数(LAI)(2012-2022)	经纬度、高层植被($\text{LAIH}, \text{m}^2/\text{m}^2$)、低层植被($\text{LAIH}, \text{m}^2/\text{m}^2$)
附件 11	一些历史数据	观测场土壤养分
附件 12	不同畜牧业群落样方	生物量种类划分且干重占比
附件 13	不同示范牧户畜牲数量	人口、经济数据、牲畜数据、牲畜重量
附件 14	不同放牧强度土壤化学性质影响	放牧小区、放牧强度、SOC 土壤有机碳、SIC 土壤无机碳、STC 土壤全碳、全氮 N、土壤 C/N 比
附件 15	轮牧放牧样地群落结构监测数据	轮次、处理、植物种类、种群功能、放牧校区、重复率营养苗、生殖苗、株/丛数、从幅 12、 鲜重、干重

本文建模目标需根据所给出的十五个附件选取所需的数据集进行考虑, 注意放牧的方式、土壤成分、植被生物量的生长等问题, 同时注重区域性的因素, 获取最佳草原放牧策略。

1.3 问题重述

基于上述附件数据与草原知识背景, 本文需要解决下列六个问题:

问题一: 建立放牧-机理影响模型

从植被生长机理与土壤物理性质角度入手, 通过所给附件数据, 分析土壤物理性质与植被生物量受放牧策略的影响性, 分别建立放牧-机理影响的数学模型。

问题二: 多维影响-时序性的 AR 预测模型

结合附件 3 土壤湿度数据、附件 4 土壤蒸发数据和附件 8 降水量等数据分析关联性, 在现行的放牧策略下, 建立对 2022、2023 年不同深度土壤湿度的预测模型, 且填充所给表格。

问题三: 建立放牧-土壤化学模型

结合土壤化学性质的机理公式, 充分考虑附件 14 与附件 7 的土壤数据, 深入分析土壤浅层与深层的化学物质, 同时也结合土壤本身含有的有机碳、无机碳等化学值, 建立放牧-土壤化学模型, 并填充预测锡林郭勒草原监测样地中不同放牧状态下的土壤化学值。

问题四: 定量板结化, 给定放牧法

根据所定义的沙漠化程度指数预测方式, 且结合补充数据信息, 以此明确放牧强度与沙漠化指数的关联性, 定量土壤板结化。另外, 在问题三的基础上, 建立全新的放牧方法, 将沙漠化程度指数与板结化程度最小。

问题五: 最佳阈值确定

结合附件 8 锡林郭勒盟气候 2012-2022 年的变化, 在给定四种降水量的情况下, 且满足我国推行的放牧可持续化发展政策, 对于实验草场内(附件 14、15)放牧羊的数量进行求解, 以确定最佳的阈值。

问题六: 图示演化四个示范区土地状态预测结果

基于附件 13 示范放牧策略不变的情况和问题 4 两种放牧方案下, 建立示范区土地状态预测模型, 同时以图示的方式演示 2023 年 9 月土地状态。

2 模型假设

假设一：数据间的关联性不会因为某一或部分的数据异常影响到整体的相关性分析。

假设二：附件 15 在每轮的所有放牧处理均是**时序性**的，一轮内每条放牧处理均是时间连续的，并非单独实验。

假设三：所收集的数据均为真实有效。

假设四：默认地表水埋深即本问所涉及的不同深度土壤湿度。

假设五：允许部分数据存在着较大偏差，是符合实际情况的。

假设六：放牧强度与放牧方式存有重复性定义，仅以放牧强度作为主要参考。

3 符号说明

序号	符号	含义
1	IC_{store}	植被截流量
2	c_p	植被覆盖率
3	k	植被密度校正因子
4	R_{cum}	累积降雨量
5	LAI	时变参数
6	φ_i	干重值
7	Me	放牧强度
8	ΔV_1	植物生长率
9	S	单位面积载畜率
10	P	降水率
11	We_i	i cm 土壤湿度指标
12	ΔV_2	土壤物理性质变化速率
13	δ	误差值
14	Gg	土壤物理性质
15	β_0	影响因子
16	ρ	比例系数
17	SM	沙漠化指数
18	B	土壤板结化
19	C	土壤容重
20	O	土壤有机物
21	Gc	植物群落功能
22	Pl	放牧政策变量

4 问题一： 建立放牧-机理影响模型

4.1 问题一分析

根据问题一的要求与实际采集数据的情况，所给的附件会存有异常情况，其异常情况可能包含人工采集的误差、天气环境影响和设备故障等因素，需要对所给附件数据进行预处理操作。

为明确问题一所需要用到的附件数据，从土壤物理性质与植被生物量机理角度入手，需要将关乎土壤物理性质与植被生物量的所有附件进行相关性分析，结合扩展阅读所给的部分模型，涉及土壤含水量-降水量-地标蒸发模型、放牧与植物生长关系模型与土壤-植被-大气系统的水平衡方程，暂定附件 3、4、5、6、7、8、10、15 作为问题一的主要数据，其具体的数据处理方法如下：

(1) 鉴于部分数据均是以时间序列为基线进行的采集，若部分节点存在着较多的 nan 值，难以补充，即剔除。

(2) 鉴于时间序列基线采集的数据，对于部分的空白点位，结合锡林郭勒草原地域气候的特性，部分土壤湿度、降雨量以及绿植覆盖率的变化趋势，对于 nan 的节点进行拉格朗日插值法处理。

(3) 鉴于采集数据必定包含异常的情况，数据偏离的问题不可避免，根据时间序列的特性进行趋势变化图分析，其波动若在限值范围内，即默认为合理情况，同时也通过拉依达准则对异常数据剔除与修正。

对于附件数据进行预处理后，结合相关性分析的结果，确定最终所需的数据。根据题目机理性要求，首先量化与明确放牧方式与强度之间的关系，然后，从植被生物量角度入手，结合放牧与植物生长关系模型，主以附件 15 的轮牧情况为例分析，以差分自回归移动平均模型作为主数学模型，融入各类植被生物量影响因素的交互因子，建立放牧-植被影响模型；最后，从土壤物理性质角度入手，主以土壤湿度作为关键影响因素，结合附件所给土壤物理因素，以物理性的平衡方程作为主数学模型，建立放牧-土壤物理性质影响模型，具体的解题思路见图 4.1 所示。




图 4.1 问题一思路流程图

4.2 数据预处理

4.2.1 数据集的确定

基于本问所给的已知条件，首先对土壤物理性质进行分析，根据土壤湿度为主要因素的提示，选用附件 3 作为主要数据；其次，根据名词解释内容中土壤含水量的定义，选用附件 8 中的降水量数据；然后，根据扩展知识内容中的第二与第四模型，将附件 4 与 7 纳入考虑；最后，鉴于各类因素指标之间的关联性，其数据量不满足正态分布的特性，因此它们之间具有非线性相关，决定选用斯皮尔曼相关性分析，以此确定最终选用的数据集，具体分析见图 4.2 所示。




图 4.2 土壤物理性质各指标相关性分析

根据图 4.2 所做的相关性分析，结合土壤含水量名词解释内容，查询相关文献，如公式 4.1 所示。

$$\text{土壤湿度} = \frac{\text{含水量}}{\text{烘干土重}} \times 100\% \tag{4.1}$$

不难看出，将降水量等同于土壤含水量 10cm 土壤湿度与土壤蒸发量存在强相关，同时与降水量存在弱相关。原因：表层土壤受到风速、温度等气象条件的影响，蒸发较快，故土壤湿度较低。其他土层的土壤湿度与降水量相关性较弱主要因为降雨只有达到一定量之后才会向深层次地表渗透。结合实际地理因素，内蒙古位于我国中西部，距离海洋较远，属温带季风气候，降雨量较少，深层土壤含量湿度几乎不受到降雨量与蒸发的影响，决定选用附件 3 的 10cm 土壤湿度数据、附件 4 土壤蒸发量数据、附件 8 的降雨量。

基于本文所给的已知条件，首先对植被生物量进行分析，从植被生长机理角度，由 Woodward^[1]建立的放牧与植被生长关系式，确定以附件 15 作为主数据；其次，根据名词解释内容中叶面积指数，将附件 10 纳入考虑；然后，根据“植被”自身特性而言，直接选用附件 5、6，同时，根据植被生长机理，必定收到光照、雨水、海拔等影响，而附件 8 中包含这类数据，也选用这部分的数据；最后，鉴于各类因素指标之间的关联性，其数据量分布的问题，具有非线性相关的特性，决定选用斯皮尔曼相关性分析，确定最终选取的数据集，具体分析见图 4.3 所示。




图 4.3 植被生物量各指标相关性分析

依据本问中拓展知识：绿植覆盖率与植被指数相关。由图 4.3 可以得出，绿植覆盖率与植被指数、底层植被存在强相关关系，绿植覆盖率与不同深度的土壤湿度、平均气温、降水量均呈现强相关，主要因为温度、土壤湿度、降水均是植物生长所必须的物理条件。一般情况下，温度越高，植物生长越快；降水量越大，土壤湿度越大，植物生长越快。


根据上述的相关性分析，确定最终的问题一数据集，具体见如表 4.1 所示。

表 4.1 数据集的确定

分类	数据集选用
土壤物理性质	附件 3：10cm 土壤湿度数据、附件 4：土壤蒸发量数据、附件 8：降水量
植被生物量	附件 5：绿植覆盖率、附件 6：植被指数、附件 8：降水量/气温、附件 10：叶面积指数、附件 15：放牧处理/干重

4.2.2 nan 值的处理

遍历最终所确定的数据集，其中空白值的表现形式均是以 nan 的形式呈现，共 23 条 nan 的数据，将 2020-2022 年绿植覆盖率生成对应的折线图，具体见图 4.4 所示，不难看出，其数据整体的量较少，且前后的绿植覆盖率变化较大，对于这部分的 nan 值直接删除处理。







图 4.4 附件 5 植被覆盖率变化趋势

4.2.3 异常值处理

鉴于数据时间序列的特性而言，分别对附件 3 的土壤湿度、附件 4 的土壤蒸发量、附件 8 的降雨量、附件 15 的干重进行异常值排查。决定使用拉以达准则对异常值进行分析，假设对选取的 4 部分数据含有随机误差，其次对于原始数据进行标准差处理，然后按照概率进行区间的确定，默认超过该区间的数值，满足 $|v_a| = |x_a - \bar{x}| > 3\sigma$ ，即隶属于异常值，具体的处理方式：通过检验后，以时间序列为准则，若超过 20 条，即进行全部剔除处理，少于即进行前后平均加权法处理。

以土壤湿度的趋势分析为例，具体见图 4.5 所示，不难看出其 10cm、40cm、100cm 和 200cm 的深度变化趋势波动性不明显，无明显异常值，即不处理。






图 4.5 土壤湿度变化趋势图

重复上述步骤，对所选的数据均进行趋势分析，且使用拉以达准则进行异常处理，其具体的异常数据处理见表 4.2 所示。

表 4.2 异常值处理表

序号	表名	数据处理说明
附件 3	土壤湿度	数据正常，不做处理
附件 4	土壤蒸发量	蒸发量趋势相同，数据正常，不做处理
附件 8	锡林郭勒盟气候	异常值数据共 1 条 ，2018 年 12 月份数据修正为 17.6182
附件 15	轮牧放牧样地群落结构监测数据	异常值数据共 6 条 ，采用前后加权平均法处理

4.3 建立放牧-植被影响模型

4.3.1 影响因素的确定

鉴于 4.2 的相关性分析，其涉及的指标均为强相关，需要全部纳入考虑，以下是对各类附件指标的处理：

对于附件 5 绿植覆盖率对于植被的生长有较强的相关性，但因分析相关性前并未对数据进行处理，预处理操作结束后，附件 5 的绿植覆盖率数据规模并不能够满足后续的植被生长机理分析，即对该指标进行剔除；

对于附件 6 的植被指数而言，结合本问所给的植被指数 NDVI 含义，已做归一化处理，可直接将其量化成对应的权重指标；

对于附件 8 的降水量、附件 10 的叶面积指数而言，对于植被生长机理的影响十分重要，根据扩展知识第四模型中的植被截流量公式，将二者进行结合量化处理。

对于附件 15 的干重而言，依据所给附件的名词解释，干重即为植物地上生物量，即轮牧方式与干重必然存在着某种关系，以二者关系作为主数学模型进行展开融合。

4.3.2 植被生长机理性研究


根据机理性分析的要求，植被生长满足自身的生长规律，同时受到降水、温度、土壤湿度、土壤 PH、营养等均会影响到植被的生长情况与生长环境^[2~3]。结合 4.2 的相关性分析，融合土壤-植被-大气系统的水平衡基本方程中的 IC 值，且满足草地的植被生长与放牧强度成正相关行，即降水量、植被覆盖率、叶面积指数均满足植被的生长机理问题，具体公式如 4.2 所示。

$$\begin{cases} IC_{store} = c_p \cdot IC_{max} \left[1 - \exp \left(-k \cdot R_{cum} / IC_{max} \right) \right] \\ IC_{max} = 0.935 + 0.498 \cdot LAI - 0.005775 \cdot LAI^2 \end{cases} \quad (4.2)$$

其中， IC_{store} 表示植被截流量（mm）； c_p 表示植被覆盖率； IC_{max} 表示特定植被的最大截流量（mm）； k 表示植被密度校正因子； R_{cum} 表示累积降雨量（mm）； LAI 表示一个分

布式的时变参数。

另外，锡林郭勒草原的地势平坦，水分循环以垂直形式交换，降水量与强度较低，根据植被自身光合作用的机理性，化学方程式如下：



根据阳光、自身化合物等因素，通过附件 15 中对植物进行群落区域的划分进行结合分析，如表 4.3 所示，

表 4.3 不同群落功能植被的不同年份干重和

植物群落功能	年干重和（单位：g）				
	2016	2017	2018	2019	2020
AB	3.93	14.92	91.09	8.23	17.47
PB	5660.42	6247.22	5371.065	6192.32	10777.85
PF	2138.63	2110.78	2090.95	2083.34	2128.77
PR	5837.5	4457.41	3164.97	2992.5	3512.22

根据上表所示，鉴于附件 15 所给轮牧周期缘故，植物群落自身具有的长势特性无法完整的在放牧强度中体现，且在五轮周期性的干重质量分析中，其质量并未出现较大的变化，因此，植被生长受到光照进行光合影响并不会导致枯萎率陡增问题，均符合自然生长规律，对于该条件暂不考虑。

4.3.3 建立放牧-植被影响模型

根据锡林郭勒盟自身的地理特性缘故，结合所给附件 15 的数据，具体定位的草原植被影响为典型草原，如图 4.6 所示。




图 4.6 数据草原类型定位图

根据上述分析的过程，以附件 15 的轮牧方式与干重的因素进行处理，鉴于放牧方式与放牧强度具有重复含义，且所提供数据的放牧方式固定，本问仅考虑放牧强度为 Me ，另外，根据放牧的处理方式，这里明确定义：一轮内每条放牧处理均是时间连续的，并非单独实验，具有一定的时序性。

(1) 差分自回归移动平均模型

根据该时序性的特性，对附件 15 数据仅选用轮牧方式、干重、时间序列这三列值进行差分自回归移动平均模型的处理。

首先进行平稳性的监测，通过时序图与自相关图进行检验，这里分别进行处理，将全部干重进行处理后，具体以无牧方式为例，见图 4.7 所示，其轮牧后的植被生长趋势均类似，并没有出现较大的波动，符合时序性。




图 4.7 时序性分析图

另外，采用自相关系数(ACF)和偏自相关系数(PACF)检验处理后的数据是否具有平稳性，如图 4.8 所示。




图 4.8 ACF 与 PACF 相关性图

根据生成的 ACF 与 PACF 图，ACF 与 PACF 后续的均显示为收敛状态，分别为拖尾与拖尾样式。

另外，根据本问所需的放牧强度与植被生长关系的影响因素，决定融入放牧强度 Me 的交互因子，建立如下数学模型 4.3：

$$W_t = \mu + \sum_{i=1}^p \varphi_i W_{t-1} + \sum_{i=1}^q \rho_i \epsilon_{t-1} + \theta_0 Me + \theta_1 Me * W_{t-1} + \epsilon_t \quad (4.3)$$

其中 C 表示常数项， ϵ_t 表示提前假设平均数为 0 的值， p 表示自回归模型的拖尾度， φ_i 表示干重值， q 表示自回归模型的滑动平均项数， θ_0 表示放牧强度对植被生物量的影响因子， θ_1 表示放牧强度对植被生物量的交互因子； Me 表示放牧强度。

(2) 明确各类影响因素

A.量化放牧植物生长因素

鉴于扩展阅读中的放牧与植物生长之间的关系，定义放牧与植物生长比率为 ΔV_1 ，即 4.3 所示。

$$\Delta V_1 = \frac{dw}{dt} = 0.049w(1 - \frac{w}{4000}) - 0.0047Sw \quad (4.4)$$

其中 w 为植被生物量， S 为单位面积的载畜率（即一定时间内，在一定草地面积上，草地实际放牧的家畜头数），鉴于 Me 的单位为羊/天/公顷，将其量化成对应关系式 4.5 为：

$$Me \Leftrightarrow S \quad (4.5)$$

B.量化 IC 值

鉴于扩展阅读中的第四个模型提示，植被截流量能够很好反映植被的生长能力，且根据 IC 的公式，其 IC 值与 LAI 直接相关，分析其附件 10 所给的叶面积指数趋势图，如图 4.9 所示，其叶面积指数的变化规律符合季节性，与放牧强度的影响因素并不大，没有明显的异常数据，这里暂不考虑 IC 值与 Me 间存有相关性。

（3）建立放牧-植被影响因素模型

根据步骤 1 与 2 所建立的差分自回归平均模型与明确各类影响因素问题，综合建立数学模型如 4.6 所示。

$$\begin{cases} W_t = \mu + \sum_{i=1}^p \varphi_i W_{t-1} + \sum_{i=1}^q \rho_i \epsilon_{t-1} + \theta_0 Me + \theta_1 Me * W_{t-1} + \epsilon_t + \Delta V_1 \\ \Delta V_1 = \frac{dw}{dt} = 0.049w \left(1 - \frac{w}{4000}\right) - 0.0047Me * w \end{cases} \quad (4.6)$$

其中 μ 表示常数项， φ_i 表示植物影响因素， ϵ_t 表示假设平均数为 0 值， ΔV_1 表示放牧强度与牧草生长率， θ_0 表示放牧强度对植被的影响因子； θ_1 表示放牧强度对植被的干扰因子




图 4.9 叶面积指数生长周期图

4.4 建立放牧-土壤物理性质影响模型

4.4.1 影响物理性质因素的选取

鉴于 4.2 的相关性分析，不难看出附件 4 的土壤蒸发量两个指标具有相同的内容，默认以单位为(mm)的指标作为主指标，同时发现 10cm 的土壤湿度、土壤蒸发量和降雨量这三者具有强相关性，将这三个指标进行统一的量化，作为主要的影响因子。另外，鉴于 40cm、100cm 与 200cm 的土壤湿度具有弱相关，虽然对土壤物理性质影响较小，但为了避免深层湿度产生的潜在影响，这里将其进行统一的量化，融合成一个影响指标。

另外，根据本问所提供的扩展知识部分，以土壤含水量-降水量-地表蒸发模型，如公式

4.7 所示。

$$\frac{d\beta}{dt} = P - E(a) \quad (4.7)$$

其中 P 为降水率, E 为蒸发率, β 为土壤含水量, a 为土壤植被覆盖率。

根据所提供的蒸发模型, 不难看出土壤蒸发量与 $E(a)$ 相关, P 与降雨量相关, 需要将这两类指标进行关联。

4.4.2 模型建立

根据选取的影响物理性质指标, 逐个进行分析融合, 以建立放牧-土壤物理性质影响模型^[4]。

(1) 降水量指标

根据扩展公式, P 代表该牧区供水率, 且主要为该地区的降水率, 为了明确 P 值, 结合附件 8 所给的降水量进行拟合, 定义某一时段降水量为 Ra , 即如公式 4.8:

$$P = k_1 * Ra + k_2 * Ra^2 + k_3 * Ra^3 + \varepsilon \quad (4.8)$$

为了明确拟合的方式, 通过枚举实验进行处理, 如图 4.X 所示, 发现经过三次拟合, 降水量的数据拟合形式较好。

(2) 土壤蒸发量指标、10cm 土壤湿度指标

鉴于附件 4 的土壤蒸发量数据, 定义土壤蒸发量为 Ev ; 鉴于附件 3 的土壤湿度数据, 定义 10cm 土壤湿度指标为 We_{10} 。




图 4.8 降雨量拟合曲线

(3) 统一指标

鉴于附件 3 的土壤湿度数据, 加上 4.2 的相关性分析, 这里对 40cm、100cm、200cm 的土地湿度指标进行融合量化, 根据相关性, 将权重进行重新赋值, 具体如公式 4.9 所示。

$$We_{all} = 0.5We_{40} + 0.3We_{100} + 0.2We_{200} \quad (4.9)$$

(4) 放牧-土壤物理性质影响模型

为了明确土壤物理性质影响的因素，结合所给的公式进行整合，给出定性的土壤物理性质影响的整体公式，如公式 4.10 所示。

$$\Delta V_2 = \frac{d\beta}{dt} = P - E(a) + \alpha_1 Ev + \alpha_2 We_{10} + \alpha_3 We_{all} + \delta \quad (4.10)$$

其中 ΔV_2 表示土壤物理性质变化速率， δ 表示实际存在的误差值。

鉴于放牧强度与放牧方式之间存在着重复的问题，且附件中并未涉及到放牧方式的相关数据，这里仅从放牧强度进行入手，从实际问题与理论角度出发，不难发现放牧强度与土壤物理性质的相关性成反比，这里给出具体的放牧-土壤物理性质影响模型，如公式 4.11 所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} Me = \mu * \frac{1}{Gg} + \epsilon \\ Gg = \Delta V_2 * t \\ \Delta V_2 = \frac{d\beta}{dt} = P - E(a) + \alpha_1 Ev + \alpha_2 We_{10} + \alpha_3 We_{all} + \delta \\ P = k_1 * Ra + k_2 * Ra^2 + k_3 * Ra^3 + \epsilon \\ We_{all} = 0.5We_{40} + 0.3We_{100} + 0.2We_{200} \end{array} \right. \quad (4.11)$$

其中 ϵ 、 δ 、 ϵ 代表容错误差， Gg 表示土壤物理性质。

公众号：竞赛资料网

5 问题二： 多维影响-时序性的 ARI 预测模型

5.1 问题二分析

根据问二要求，需对附件 3、4、8 等数据进行整合与挖掘分析，因此对三个附件进行合并与预处理，作为问题二的基础数据。某地的土壤湿度会受到蒸发数据、降水量、降水天数、气温等影响，对各类影响因素进行相关性分析，将其降维排序，以筛选出重要的影响指标，以建立综合性的土壤湿度预测模型。首先，所选附件数据规模存在着部分的差异，在合并处理前需要二次清洗与处理；其次，鉴于三个附件共 14 个影响因素，结合题干所给的“土壤湿度数据”、“蒸发数据”以及“降水”关键词，决定对 14 个影响因素降维并筛选，由于未明确变量间的相关特性，需进行独立性检验，以提出高相关变量；然后，根据附件数据的时序特性，选用 ARI 序列模型作为主模型，建立土壤湿度预测模型；最后，为了验证所建立的土壤湿度预测模型准确性，采用具有较高时序特性的深度学习模型（LSTM+Self-attention）进行二次验证，以多维度证实预测结果的精度，进而填充问二的预测表，具体思路见图 5.1 所示。




图 5.1 问题二思路流程

5.2 建立多维影响-时序性的 ARI 预测模型

5.2.1 数据合并与处理

根据问题二所给要求，需要将附件 3、4、8 三个附件数据合成同一表单，进行整体性的分析。根据附件所给内容，其经纬度位置固定，且三表单包含年份与月份的关键信息，满足数据表单的关联特性，进行整合，具体操作如下：

(1) 对于附件 3 而言，包含年份属性，并没有月份信息，结合问二所给表单月份信息与表名信息，自行添加月份属性栏，以关联其他表格。

(2) 对于附件 4 而言，包含年份、月份属性，可以直接关联，且根据问一 4.2 的相关性分析，其中土壤蒸发量(W/m^2)与土壤蒸发量(mm)的具有相同性质，为了避免后续高相

关性所带来的耦合程度，提出单位为(W/m^2)的数据，保留(mm)数据进行主要指标。

(3) 对于附件 8 而言，包含 24 个指标，其中平均气温 $\geq 18^\circ\text{C}$ 、 35°C 与 $\leq 0^\circ\text{C}$ 的天数其 0 填充的值较多，且从常理角度，对土壤湿度影响不大进行剔除；其中关于气温的共有 5 种指标，而平均最高温、平均最低温、最高气温极值与最低气温极值均不能代表该月的整体性质，故保留平均气温作为指标；其中积雪深度 nan 值较多，例如 14 年全年缺失等，进行剔除；其中风速指标共有 5 中指标，同气温类似，均取平均风速为代表，作为该问指标；其中能见度指标共 3 种，同气温类似，均取平均能见度为代表，作为该问指标。

5.2.2 数据降维与筛选

根据上述整合的表单信息，结合题干所给附件数据关键词，为了进一步探究数据之间的相关性，决定采用信息增益的方法，进行降维与筛选主要因素指标。

信息增益表示得知某种特征 X 的信息在目标信息 Y 的不确定性减少的程度，即目标信息 Y 的熵与属性 X 的条件信息熵的差值，其信息熵的计算公式如下：

$$Ent(Y) = -\sum_{i=1}^N p_i \log_2 p_i \quad (5.1)$$

其中条件信息熵的计算公式如 5.2 所示。

$$Ent(Y|X) = \sum_i p_i Ent(Y|X = X_i), p_i = p(X = X_i), i = 1, 2, 3, \dots, n \quad (5.2)$$

因此，可以根据信息增益性质推论出公式 5.3：

$$Gain(Y, X) = Ent(Y) - Ent(Y|X) \quad (5.3)$$

我们根据自己处理合并的表单数据，通过信息增益计算，得到各类指标的信息增益图，如图 5.2 所示。




图 5.2 各类因素指标的信息增益图

根据因素指标的信息增益，可以明显的看出，土壤蒸发量、降水量、最大单日降水量与降水天数的信息增益最大，说明与不同深度土壤湿度的关系最为密切；其余的因素指标信息增益普遍偏小，说明与不同深度土壤湿度的关系不紧密，为方便后续时序模型的建立，忽略该部分的因素指标所产生的影响。

5.2.3 建立多维影响-时序性的 ARI 预测模型

根据问题二所填表单信息，结合筛选的因素指标，均具有时序特性，根据土壤蒸发量、降水量、最大单日降水量与降水天数的变化趋势，建立对应的时序模型^[5]，其逻辑图 5.3 如下所示，另外，根据附件 4 的经纬度定位与附件 15 的经纬度定位相同规则，其放牧方式为轮牧的形式，即默认放牧的形式为轮牧且强度不变。




图 5.3 预测模型建立逻辑图

(1) 各类因素指标自身预测模型

令不同因素指标在原始状态为 a_{tj} ，其中 t 表示第 t 月份的采集， j 表示第 j 个因素指标，即最初始状态各类因素指标的公式如 5.4 所示。

$$A_j = \frac{1}{n_1} \sum_{t=1, j=1}^{n_1} a_{tj} \quad (5.4)$$

其中， t 的取值为月份， j 的取值为第 j 个因素指标。

令不同因素指标在后续采集状态为 b_{tj} ，其中 t 表示第 t 月份的采集， j 表示第 j 个因素指标，即经过时间变迁后各类因素指标的公式如 5.5 所示。

$$B_j = \frac{1}{n_2} \sum_{t=1, j=1}^{n_2} b_{tj} \quad (5.5)$$

其中， t 的取值为月份， j 的取值为第 j 个因素指标。

构建整体的预测系数公式 5.6 所示。

$$C_j = \frac{(A_j - B_j)}{B_j} \times 100\% (j=1, 2, \dots, m) \quad (5.6)$$

即各类因素指标的整体预测模型如公式 5.7 所示。

$$A_j = B_j(1 + C_j) \quad (5.7)$$

(2) 建立多维影响-时序性的湿度预测模型

A. 平稳性检验

鉴于所给的附件 3 的土壤湿度数据，其采集具有时序特性，采用自相关图进行检验，同问一的自相关系数(ACF)与偏自相关系数(PACF)进行处理，如图 5.4 所示。




图 5.4 ACF 和 PACF 相关性图

根据上述生成的 ACF 与 PACF 图，ACF 为拖尾式，而 PACF 为截尾式，我们选用 AR 作为主要的自回归模型。

B. 白噪声检验

为进一步验证土壤湿度自身具有回归性，本文选用 Ljung-Box 检验方法来进行处理，通过检验 m 阶滞后范围内序列自相关的显著性，来获取 p 值，具体流程如图 5.5 所示。




图 5.5 白噪声检验流程图

通过对四种不同深度的土壤湿度进行白噪声检验，发现 P 值均小于 0.05，均为非白噪声序列，具有一定的自回归性，即可通过自回归模型进行处理。

C. 差分检验

鉴于附件 3 所给数据具有一定的时序性，以 10cm 的土壤湿度进行差分处理，具有很明确的数据波动与对称性，如图 5.6 所示。




图 5.6 10cm 土壤湿度的差分检验图


D. 多维影响-时序性的 ARI 预测模型

根据步骤 1 所创建的各类因素指标自身预测模型，结合降维变量的筛选，我们可看出各类因素指标影响着不同的土壤湿度，因此，建立多维影响-时序性的 AR 模型，其定义如 5.8 所示。

$$Wet_t = C + \sum_{i=1}^p \vartheta_{i,ca} Wet_{t-i} + \beta_0 A_j + \varepsilon_t \quad (5.8)$$

其中 C 为常数项； ε_t 是提前假设平均数为 0 的值；p 为拖尾度； $\vartheta_{i,ca}$ 表示不同深度的土壤自身湿度； β_0 表示各类影响因素对不同深度的土壤湿度的影响因子； A_j 表示各类因素指标。

根据 ACF 与 PACF 图观测，这里将 p 假设为一阶自回归，将合并表单进行预测，获取预测模型如图 5.7 所示，以 10cm 与 40cm 为例：






图 5.7 10cm 与 40cm 不同深度的土壤湿度预测图

5.3 验证模型-基于时序性的 LSTM-SA 模型

5.3.1 验证模型的建立

鉴于合并的表单具有较强的时序性质，且上述建立的模型根据题干对部分的影响因素进行剔除，为了避免剔除部分的影响指标存在的潜在可能性，且各个影响因素间的相关性并不明确，决定选用长短时记忆网络进行数据的二次验证。

(1) LSTM-SA 模型的构建

LSTM 模型是一种递归性的神经网络模型，是 RNN 的一种改进，能够对长期以来的某些信息进行学习。RNN 网络特点是将原始的历史数据作为输入且连接对当前信息的判断中，对于序列性的数据处理具有较好的表现效果，但是存有梯度消失的致命问题，因此 LSTM 的出现能够很好地避免这种问题，捕获序列信息中的长期特性。其机理特性如图 5.8 所示。




图 5.8 LSTM 工作机理

从土壤湿度概念入手，根据问一的机理性分析，土壤湿度是土壤物理性质的重要体现，可定义为一种全局性的特征，为了能够使得时序模型预测的更加准确，融入 Self-attention 机制，从全局的信息进行把握，符合湿度自身的全局特性，其融合后的机制流程如图 5.9 所示。




图 5.9 LSTM-SA 模型

(2) LSTM-SA 模型的预测

鉴于 LSTM-SA 模型其原理仍是神经网络的原型，包含输入层、隐含层与输出层，为了贴合本文时序性的性质，需提前对于 LSTM-SA 模型进行参数设置，在隐含层获取临时输出，汇总到最后的输出模型，其参数设置具体如表 5.1 所示。

表 5.1 参数设置表

参数设置	设置理由
数据集划分	考虑到月份因素，时序性的前后逻辑，将数据集以月份的进行归类预测
激活函数	Relu: $f(x) = \max(0, w^T x + b)$ 作用：避免梯度爆炸问题
隐含节点	100 层: $H = \sqrt{m + n} + \gamma$ 作用：经验公式处理
学习率设置	0.001 （学习率的上限与下限分别设置为 0.01 和 0.001）
训练次数	50 次

(3) 模型求解

通过 LSTM 分别对 10cm、40cm、100cm 和 200cm 的土壤湿度进行预测，具体以七月份的预测为样例进行，如图 5.11 所示。




图 5.10 LSTM 七月预测数据

5.3.2 验证数据对比

由于 LSTM 与多维影响-时序性的 AR 预测模型所采用的预测方式不同，前者是以月的形式进行预测，后者是以年的形式进行预测，需要将两部分数据进行实验效果的对比，具体以 1 月的预测数据进行对比，具体如表 5.2 所示。

表 5.2 22 年与 23 年 7 月数据预测对比

模型	年份月份	10cm 湿度	40cm 湿度	100cm 湿度	200cm 湿度
多维影响-时序性的 ARI 预测模型	2022-7	17.49489938	48.37765523	71.61846008	165.6
	2023-7	17.75938388	49.83688391	85.59494611	165.49
LSTM-SA	2022-7	20.46536647	49.31589562	39.65386331	166.82677
	2023-7	20.42134568	49.65656955	35.02548622	166.51525
误差范围~		15%	2%	82%	1%

不难看出以月预测的 LSTM 与以年预测的多维影响-时序性的 ARI 预测模型对比其 100cm 湿度的数据差距较大，结合附件 3 所给的真实数据，对不同深度的土壤湿度进行趋势分析，如图 5.11 所示。




图 5.11 土壤湿度趋势图

根据 5.11 趋势图分析,主要对 10cm 与 100cm 的土壤湿度变化趋势进行分析,在 10cm 土壤湿度,其以年的增幅波动并不高,且连续月份内均呈现涨势;在 100cm 土壤湿度,其 2020 至 2021 年数据的增幅较快,但后续增势又趋于稳定,更符合本文所建立的多维影响-时序性的 ARI 预测模型。

5.4 问二表单填充

表 5.3 问题三表单

年份	月份	10cm 湿度 (kg/m ²)	40cm 湿度 (kg/m ²)	100cm 湿度(kg/m ²)	200cm 湿度(kg/m ²)
2022	04	15.746325	51.53291	93.61446	164.436
	05	16.790705	49.01263	93.2793	164.6394
	06	18.445235	49.26309	91.8871	164.2728
	07	20.310235	60.29955	95.59675	164.1797
	08	19.676975	56.40006	99.08659	164.3842
	09	18.50171	57.01694	101.0235	164.1487
	10	16.620675	53.20206	103.3331	163.9864
	11	14.908695	52.44073	104.4948	163.7461
	12	14.529775	50.90798	104.6208	163.9484
2023	01	13.43098	50.58822	104.4928	163.7547
	02	12.98925	50.96888	104.4586	163.8993
	03	13.7761	50.58425	105.0062	163.6225
	04	15.27788	50.45489	104.9766	163.5991
	05	16.460795	48.07582	103.4446	163.9104
	06	18.23836	49.22661	102.323	163.5551
	07	20.59874	60.95818	108.1063	163.721
	08	19.33304	57.14289	111.2008	163.2961
	09	18.627465	58.1428	112.4789	163.3703
	10	16.882745	54.59592	116.6836	162.8119
	11	16.18692	52.85633	117.274	162.1374
	12	15.8363	53.27041	117.3573	162.2935

6 问题三： 建立土壤-放牧化学模型

6.1 问题三分析

根据问题三的要求与所给附件，考虑到实际实验过程中存在的测量等误差，需要对所给相关附件数据进行预处理操作。

为明确问题三所需要用到的附件数据，从土壤化学性质角度入手，需要对关乎土壤化学性质的附件数据进行相关性分析，结合附件 14 涉及到的有机碳(SOC)、土壤无机碳(SIC)、全氮(TN)等化学物质，考虑到自然界不同物质间的相互影响，例如：降水会对土壤有机碳和无机碳之间的耦合关系产生影响^[6]，暂定附件 3、4、7、8、14 作为问题三的主要数据，其中附件 3、4、7、8 已经在问题一处理，遍历附件 14，无缺失值、无异常值，不需要处理。

对附件数据进行预处理后，结合相关性分析的结果和对题目的理解，确定最终数据集。根据题目要求，从机理性角度入手分析，首先沿用问题一放牧方式与放牧强度的关系，然后，从土壤化学性质入手^[6]，主以有机碳(SOC)、土壤无机碳(SIC)、全氮(TN)作为关键影响因素，结合附件所给其他化学因素，建立放牧-土壤化学性质影响预测模型，最后，将预测结果填充至问题三的预测表具体的解题思路见图 6.1 所示。




图 6.1 问题三思路流程图

6.2 数据集的确定

基于本问所给的已知条件，首先，遍历预处理后的暂定附件数据，附件 3、4、8 主要涉及土壤湿度、地区气象条件等物理性质，且是在固定位置(经度 115.375° ，纬度 44.125°)连续 10 年的测量值，附件 14 为 12-20 年偶数年 2 实验数据，无法以时间为基准整合。由于本文主要探讨放牧策略(放牧方式和放牧强度)与土壤化学性质的影响，因此选用附件 14 为主要数据；其次，根据名词解释中的土壤 PH 和土壤 PH 值的影响因素，将附件 7 纳入考虑范围；最后，绘制附件 14 中土壤有机碳和无机碳等化学因素数据直方图，结果显示数据量不满足正态分布的特性，故属于非线性相关，决定进行斯皮尔曼相关性分析，以确定最终选用的数据集，具体相关性分析见图 6.2 所示。




图 6.2 土壤化学性质各指标相关性分析

根据图 6.2 所做的相关性分析，不难看出土壤有机碳(SOC)和全氮(TN)^[7]呈现正向强相关，与土壤无机碳(SIC)成中等负相关；土壤 C/N 比与土壤全碳(STC)比成中等正相关，与全氮(TN)成负向强相关。

根据上述分析，确定最终的问题三数据集，具体见表 6.1 所示。

表 6.1 问题三数据集的确定

分类	数据集选用
土壤化学性质	附件 14: SOC 土壤有机碳、SIC 土壤无机碳、全氮 TN 附件 7: 浅层酸碱度 pH、深层酸碱度 pH、 浅层碳酸钙含量(% weight)、深层碳酸钙含量(% weight)

6.3 建立放牧-土壤化学性质影响预测模型

6.3.1 影响因素的确定

考虑到自然界 C 循环时间周期不明显，有机碳与无机碳间的相互转化十分复杂，而本问涉及到依据历史数据对未来 2022 年土壤各化学物质的预测，且历史数据周期较短，时间划分明显，无法将无机碳与有机碳的转化机理融入时间因素，故本问不考虑无机碳与有机碳间的相互转化，即对深、浅层碳酸钙含量指标给予剔除；

附件 7 显示监测点（经度 115.375°，纬度 44.125°）土壤浅层 PH 值为 7.3、深层 PH 值为 7.9。结合问题中给出的名词解释，该地区土壤酸碱度为中性，作物在中性土壤生长最适宜。考虑到土壤 PH 值的稳定性，即就近区域 PH 值相同，因此认为该地区土壤 PH 值为定值，且对土壤有机碳含量起正向作用。

6.3.2 土壤化学性质机理性研究

根据机理性分析要求，观察附件 14 中的数据，结合对土壤化学性质的已有研究，发现土壤有机碳(SOC)、土壤无机碳(SIC)、土壤全碳(STC)以及土壤全碳(STC)、全氮(TN)、土壤 C/N 比间的数学关系，如公式 6.1、6.2 所示。


$$STC = SIC + SOC \quad (6.1)$$

$$C/N = STC/TN \quad (6.2)$$

依据守恒定律，土壤中 C 元素守恒，即 C 元素总量等于无机碳与有机碳的加和，故公式(6.1)一定成立；研究表明，土壤中有有机碳和土壤全氮成正比关系，因此土壤有机碳(SOC)和全氮(TN)呈现正向强相关合理，量化后如公式 6.3 所示。

$$TN = \rho \times SOC \quad (6.3)$$

张力研究表明，在干旱、半干旱地区，土壤中的有机碳借助二氧化碳转化为无机碳，其转移机理如公式 6.4 所示。



其中， CaC^0O_3 中 C^0 是土壤木质的古碳，而 C^n 是来自植物呼吸和植物残体、土壤有机碳的分解。公式 6.4 表示原生碳酸盐向次生碳酸盐的转化，即新碳逐步取代古碳，即有机碳逐步转化为土壤无机碳，简化为 $\text{SOC} - \text{CO}_2 - \text{STC}(\text{CaCO}_3)$ 。


6.3.3 建立放牧-土壤化学性质影响预测模型

本问探索不同放牧策略对土壤化学性质的影响，因此对确定好的数据集按照放牧方式进行划分整理，问题三还要求附件 14 介绍不同放牧强度与各化学物质的含量变化，鉴于放牧方式与放牧强度具有重复含义，且所提供数据的放牧方式固定，本问仅考虑放牧强度为 Me 。


(1) 明确不同放牧强度对化学物质的影响

由上述土壤化学物质的机理分析，对本问提到的土壤全碳(STC)、土壤 C/N 比采用公式 6.1、6.2 进行换算。为了明确不同放牧强度对 SOC、SIC、TN 的大致影响趋势，对附件 14 采取如下处理：


- ① 首先按照不同放牧强度对数据集进行划分；
- ② 计算不同放牧强度下明年 SOC、SIC、TN 平均值；
- ③ 绘制同一种化学物质不同年份、不同放牧强度折线图，如图 6.3 所示。



a:不同放牧强度下不同年份 SOC 平均值折线图



b:不同放牧强度下不同年份 SIC 平均值折线图



c:不同放牧强度下不同年份 TN 平均值折线图

图 6.3: 同一种化学物质不同年份、不同放牧强度折线图

由图 6.3 可以看出,随着时间的变化, SOC 成递增趋势, SIC 成递减趋势, TN 在 2014 年略显下降, 总体成递增趋势。同一种放牧强度下, SOC、SIC、TN 均与时间序列有关, 即

$$\begin{cases} SOC_t = \varphi_{1i} * SOC_{t-1} \\ SIC_t = \varphi_{2i} * SIC_{t-1} \\ TN_t = \varphi_{3i} * TN_{t-1} \end{cases} \quad (6.5)$$

(2) 建立放牧-化学性质影响预测模型

①放牧-SOC 影响预测模型

由于该地土壤 PH 值对植物生长起促进作用, 本文考虑到 PH 值为定值, 其促进效果也为定值, 植物生长主要影响土壤有机碳, 因此,

$$SOC_t = \varphi_{1i} * SOC_{t-1} + A \quad (6.6)$$

其中, A 为土壤 PH 值对 SOC 的促进效果。

观察图 6.3-a, 放牧强度对 SOC 产生一定的阻碍作用, 即成反比关系, 且放牧强度对 SOC 的影响并不强烈, 因此使用指数函数放大并取倒数以保证产生不强烈的阻碍作用, 见公式 6.7 所示。

$$Me = \frac{\eta_1}{e^{SOC_t + \delta_1}} \quad (6.7)$$

②放牧-SIC 影响预测模型

由于不考虑 SOC 与 SIC 间的转化作用, 故土壤 SIC 的含量与放牧方式相关性较弱, 但也会因草原植被与动物的发生变化, 故借助立方根表示, 如式 6.8:

$$Me = \eta_2 \sqrt[3]{SIC_t} \quad (6.8)$$

③放牧-AN 影响预测模型

由图 6.2 相关性分析得, AN 与 SOC 成正向强相关, 对比观察图 6.3-a、c, 放牧强度对 AN 产生的阻碍作用大于 SOC, 因此选用对数函数减缓数值变化并取倒数以保证阻碍作用大于 SOC, 见公式 6.9 所示。

$$Me = \frac{\eta_3}{\lg AN + \delta_2} \quad (6.9)$$

综合①②③模型, 给出具体的放牧-土壤化学性质影响预测模型, 见公式 6.10 所示。

$$\left\{ \begin{array}{l} Me = \frac{\eta_1}{e^{SOC_t + \delta_1}} \\ Me = \eta_2 \sqrt[3]{SIC_t} \\ Me = \frac{\eta_3}{lgAN + \delta_2} \\ SOC_t = \varphi_{1i} * SOC_{t-1} + A \\ SIC_t = \varphi_{2i} * SIC_{t-1} \\ TN_t = \varphi_{3i} * TN_t \\ STC = SIC + SOC \\ \frac{C}{N} = \frac{STC}{TN} \end{array} \right. \quad (6.10)$$

6.3.4 放牧-化学性质影响预测模型求解

利用 Python 对模型进行求解，分别对不同放牧强度下 2022 年 SOC、SIC、TN 进行预测，结合公式 6.1、6.2 计算 STC、土壤 C/N 比，预测结果具体以放牧强度为 MGI 时，G8 小区为样例，如图 6.4 所示。




图 6.4 放牧强度为 MGI 时 G8 小区各指标预测结果

6.4 问三表单填充

表 6.2 问题三表单

放牧强度	Plot 放牧小区	SOC 土壤有机碳	SIC 土壤无机碳	STC 土壤全碳	全 N	土壤 C/N 比
NG	G17	16.8583	6.08675	22.94505	2.1152	10.8477
	G19	17.2985	4.30145	21.59995	2.19805	9.826869
	G21	20.1335	4.0649	24.1984	2.43115	9.953479
LGI	G6	14.78965	3.0012	17.79085	2.0165	8.822638
	G12	16.1858	3.8029	19.9887	1.9448	10.27802

	G18	19.306	7.2073	26.5133	2.25715	11.74636
	G8	14.4421	1.8855	16.3276	1.94105	8.411736
MGI	G11	14.74435	3.3536	18.09795	1.96145	9.226822
	G16	14.777	9.81945	24.59645	1.71225	14.36499
	G9	17.2	3.12215	20.32215	2.23695	9.084758
HGI	G13	16.6919	3.5647	20.2566	2.10285	9.632927
	G20	15.9696	4.65705	20.62665	2.0546	10.03925

公众号：竞赛资料网

7 问题四： 建立土壤-放牧化学模型

7.1 问题四分析

本问核心在于利用沙漠化程度指数预测模型确定附件 15 中不同放牧强度下监测点中的沙漠化程度指数值；同时明确土壤板结化的定义下，给出最优的沙漠化程度指数与板结化程度值。首先，根据问题所给的沙漠化指数预测模型，结合文献《栅格化预警模式研究》^[2]，需要对涉及的 9 个因子进行数据关联与收集，同时进行数据清洗与处理；其次，结合附件 14、15 中的牧区划分与强度确定监测点的沙漠化程度指数值；然后，根据本问所给出的土壤板结化模型描述与涉及指标的关系规律，结合问题一与问题三模型，将模型描述具象化^[8]；最后，根据所明确的板结化与沙漠化指数进行结合，根据不同的放牧策略，建立最优的沙漠化程度指数与板结化程度最小的模型，具体流程如图 7.1 所示。




图 7.1 问题四思路流程图

7.2 附件数据处理

7.2.1 数据收集

根据本问所提供的补充数据来源中“国家冰川冻土沙漠科学数据中心”词条，将沙漠（沙地）分布数据集作为本问的荒漠数据，如图 7.2 所示。




图 7.2 中国 1:10 万沙漠(沙地)分布数据图

同时，根据沙漠化程度指数预测模型所涉及的《基于栅格化预警模式研究》文献内提及的，涉及到九个因子，其中气象因素、地表因素均由对应的数据信息，而人文因素涉及到人口密度、牲畜密度、人均家庭经营纯收入这三个指标，根据所提供的附件 2 锡林郭勒统计年鉴中人文因素数据进行统计与关联，具体数据如表 7.1 所示。

表 7.1 数据补充表

数据名	补充说明
中国 1:10 万沙漠(沙地)分布数据集	荒漠化指数：（来源） http://www.ncdc.ac.cn/portal/metadata/fb82482c-d594-46ea-bd60-92272487cb5e
锡林郭勒统计年鉴（2016-2021）	人口密度： 6 条 、牲畜密度： 6 条 、人均家庭收入： 6 条

另外，题干也给出了沙漠化指数的区间范围，如表 7.2 所示。

表 7.2 沙漠化程度指标划分标准

划分内容	划分类型				
沙漠化程度	非沙漠化	轻度沙漠化	中度沙漠化	重度沙漠化	极重度沙漠化
沙漠化程度指数	[0,0.20]	(0.20,0.40]	(0.40,0.60]	(0.60,0.80]	(0.80,1.00]

7.2.2 数据预处理

根据附件 14、15 的数据，鉴于问题二已经进行处理，这里不在进行处理，经过收集的荒漠化信息与锡林郭勒统计年鉴，均是以年单位进行处理，这里将其量化成普通常量，关联到附件 14、15，具体量化数值如下所示。

表 7.3 量化常量数据

年份	人口密度(人/平方公里)	牲畜密度(羊/平方公里)	人均家庭收入(年/万)
2016	5.08	93	2.8017
2017	5.1	24.5	2.3095
2018	5.2	24.5	3.3138
2019	5.21	24.5	3.8723
2020	5.29	24.5	4.1936
2021	5.55	24.5	4.7277

7.3 确定监测点沙漠化指数

7.3.1 确定沙漠化指数预测模型

首先根据文献所提供的预警指标体系模型，构建本问的沙漠化程度指数预测模型^[9~10]，鉴于提供模型涉及的因子包含：平均风速、降水量、平均气温、植被盖度、地表水量、地下水埋深、人口密度、牲畜密度和人均纯收入，直接化用文献所包含的 7.4 权重系数表，建立本模型。

表 7.4 沙漠化指数权重系数表^[2]

指标体系	权重系数 (W_A)	影响因素 (B_i)	权重系数 (W_{B_i})	指标因子 (C_i)	权重系数 (W_{C_i})
沙漠化预警 指标体系 A	1	气象因素 B_1	0.3275	平均风速 C_1	0.1802
				降水量 C_2	0.0787
				平均气温 C_3	0.0685
		地表因素 B_2	0.4126	植被盖度 C_4	0.2036
				地表水资源量 C_5	0.0808
				地下水埋深 C_6	0.1282
		人文因素 B_3	0.2599	人口密度 C_7	0.0509
				牲畜密度 C_8	0.1282
				人均家庭经营纯收入 C_9	0.0808

即沙漠化指数的模型如公式 7.1 所示。

$$\begin{cases} SM = 0.3275B_1 + 0.4126B_2 + 0.2599B_3 \\ B_1 = 0.1802C_1 + 0.0787C_2 + 0.0685C_3 \\ B_2 = 0.2036C_4 + 0.0808C_5 + 0.1282C_6 \\ B_3 = 0.0509C_7 + 0.1282C_8 + 0.0808C_9 \end{cases} \quad (7.1)$$

7.3.2 分析因子与放牧强度间相关性

(1) 气象因素

查阅相关文献，平均风速 C_1 与平均气温 C_3 隶属温带的锡林郭勒草原，分析其平均风速与平均气温的变化趋势，其限值在 $7^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$ ，符合自然温带的特性，这里暂不考虑与放牧强度间关系的影响。鉴于第一问所分析降雨量对地表湿度的影响因素，会间歇性产生对放牧强度的影响，同问一中放牧-土壤物理性质影响模型相关，在后续进行分析。

(2) 地表因素

在地表因素影响中，地表水资源量 C_5 与植被盖度 C_4 均在问一中已经分析，直接结合问一中的放牧-土壤物理性质影响模型进行关联处理；另外，地下水埋深含义为地下水水面至地表的距离，这里为了简化地下水埋深的含义，默认等同于不同深度的土壤湿度进行处理。如公式 7.2 所示。

$$Me = \mu * \frac{1}{k*f(C_2) - E(C_4) + \alpha_1 E v + \alpha_2 * g(C_5)} + \epsilon \quad (7.2)$$

(3) 人文因素

对于收集的人口密度、牲畜密度以及人均家庭年收入进行趋势化分析，如图 7.3 所示。




图 7.3 趋势分析图

人口密度与人均家庭年收入均呈现稳固上涨，可默认人口密度与人均家庭年收入部分关联放牧强度，即收入增长带动人口增长，通过放牧强度增长，带动整体经济的发展，默认二者与放牧强度呈现正相关性；另外，牲畜密度自 2016 年突然骤减，经查阅相关资料，发现 2016 年实行禁牧策略，但后续实时轮牧后，其牲畜密度恢复平稳状态，因此，也可默认该数据自 2017 年后实现平稳性增长，且根据牲畜密度与强度直接相关，即可发现其 Me 与 C_7 、 C_8 、 C_9 存在的关系式 7.3 为：

$$Me = k_1 e^{C_8} + k_2 C_7 + k_3 \ln C_9 \quad (7.3)$$

其中， k_i 表示不同的影响度。

7.3.3 建立放牧-沙漠化指数模型

根据上述沙漠化指数分析与分析因子与放牧强度相关性的公式，融合成单一的模型^[11]，即公式 7.4：

$$\begin{cases} SM = 0.3275B_1 + 0.4126B_2 + 0.2599B_3 \\ Me = \mu * \frac{1}{k*f(C_2)-E(C_4)+\alpha_1 E v + \alpha_2 * g(C_5)} + \epsilon \\ Me = k_1 e^{C_8} + k_2 C_7 + k_3 \ln C_9 \end{cases} \quad (7.4)$$

7.3.4 指数确定

根据附件 15 的监测点分区图，同时结合附件 12，以四户典型的牧户定位，如图 7.4 和图 7.5 所示。




图 7.4 监测点分区图




图 7.5 四户示范农户地理位置

根据附件 12 所给数据，四户示范农户的经纬度位置较为相近，均在 1km 左右，其土壤性质的差异不会存有较大差异，主要以附件 15 给出的监测点划分为主要依据进行处理

与求解，如上图划分，结合附件 15，监测点示范区共 12 个，从 G6-G21 进行分析，具体如表 7.5 所示。

表 7.5 监测点轮牧方式

放牧小区	放牧强度	放牧小区	放牧强度
G6	轻度	G14	轻度->重度->中度->禁牧
G7	中度->轻度->禁牧->重牧	G15	轻度->重度->中度->禁牧
G8	中度	G16	中度
G9	重度	G17	禁牧
G10	轻度->重度->中度->禁牧	G18	轻度
G11	中度	G19	禁牧
G12	轻度	G20	重度
G13	重度	G21	禁牧

根据分析的监测点数据，填充不同放牧策略下监测点沙漠化程度指数值，如表 7.6 所示。

表 7.6 不同放牧策略下监测点沙漠化程度指数值

放牧小区	沙漠化指数值	放牧小区	沙漠化指数值
G6	0.56723	G14	0.48692
G7	0.61254	G15	0.50125
G8	0.50345	G16	0.47428
G9	0.60513	G17	0.47864
G10	0.53644	G18	0.44536
G11	0.49698	G19	0.50863
G12	0.50261	G20	0.55311
G13	0.55106	G21	0.50127

7.4 定量土壤板结化定义

根据题干所给的土壤板结化模型描述^[12~13]，如公式 7.5 所示。

$$B=f(W,C,O) \tag{7.5}$$

其中，土壤板结化同土壤有机物 O、土壤湿度 W 和土壤的容重 C 相关联，且符合公式规律如下：W 越小，C 越大，有机物含量 O 越低，导致 B 越严重。

即可获取相关关系式如下所示。

$$B\sim \frac{c}{w,o} \tag{7.6}$$

通过问一与问二的分析，已经建立土壤有机物 O 与土壤湿度 W 同放牧强度 Me 的关系式，具体如下所示。

*土壤湿度：

$$Wet_t=C+\sum_{i=1}^p\vartheta_{i,ca}Wet_{t-i}+\beta_0A_j+\varepsilon_t$$

(4.11)

*土壤有机物：

$$\begin{cases}SOC_t=\varphi_{1i}*SOC_{t-1}+A\\SIC_t=\varphi_{2i}*SIC_{t-1}\end{cases}$$

(6.10)

根据名词扩展信息，土壤容重是指一定容积土壤（包含土粒同粒间的空隙）烘干后质量与烘干前体积的比值，具体公式如 7.7 所示。

$$C=\frac{m_{qualityf}}{v_{volume_b}} \tag{7.7}$$

根据所获取的相关关系式与公式规律，需要将 W, O 变化趋势与 C 的变化趋势统一，统一维度，即开方处理，具体定义如 7.8 所示。

$$B = \rho * \frac{C}{\sqrt{W*O}} = \rho * \frac{m_{quality_f}}{v_{volume_b} \sqrt{(C + \sum_{i=1}^p \vartheta_{i,ca} Wet_{t-i} + \beta_0 A_j + \varepsilon_t) * (\varphi_{2i} \times SIC_{t-1} + \varphi_{1i} \times SOC_{t-1} + A)}} \quad (7.8)$$

其中 ρ 作为调节 W, O 同 C 之间趋势关系，且板结化系数均具有时序性的状态。

7.5 沙漠化程度与板结化程度最小优化问题

7.5.1 建立多目标最优模型

优化目标： 1、寻求最小的沙漠化指数；2、寻求最小的板结化程度。

目标函数： 建立最优沙漠化-板结化程度的双目标规划模型，目标函数如下所示。

$$\begin{cases} \min Z_1 = SM \\ \min Z_2 = B \end{cases} \quad (7.9)$$

其中 SM 为沙漠化程度； B 为板结化程度。

决策变量： 本文建立的模型中，根据题干所给提示，且结合上述问题分析，其决策变量共 4 个，记录为：

$$X = \{Wet, Me, O, C\} \quad (7.10)$$

约束条件： 根据问题四要求，在优化 SM 的过程中，需要保证放牧方式 Me 对于 SM 的影响，即约束 1：

$$0 \leq Me \leq 8 \quad (7.11)$$

在本问中，湿度 Wet 、有机物 O 和容重 C 的约束均为等式处理，即略写为公式 7.12 所示约束条件 2 为：

$$B = f(W, C, O) \text{ and } 0 \leq B \leq 1 \quad (7.12)$$

且在本问中， SM 约束为公式 7.14 所示。

$$SM = 0.3275B_1 + 0.4126B_2 + 0.2599B_3 \text{ and } 0 \leq SM \leq 1 \quad (7.13)$$

即该优化模型具体表示为 7.15 所示。

$$\begin{cases} \min Z_1 = SM \\ \min Z_2 = B \end{cases} \quad (7.14)$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} 0 \leq Me \leq 12 \\ 0 \leq B \leq 1 \\ 0 \leq SM \leq 1 \\ B = f(W, C, O) \\ SM = 0.3275B_1 + 0.4126B_2 + 0.2599B_3 \end{cases}$$

7.5.2 模型求解

根据附件 7 所提示的数据，默认该问的容重 C 为 1.37，取 2021 年数据进行整体处理，进行拟合，在给定放牧强度下，以监测点 1.44ha 为例，且默认当前单位土地内土壤状态一致，获取最优化的土地沙漠化与板结化指数，如表 7.7：

表 7.7 土地沙漠化与板结化指数表

放牧强度	沙漠化指数值	板结化程度
禁牧	0.47864	0.37661
轻牧	0.50261	0.38224
中牧	0.51345	0.40121
重牧	0.60513	0.41856

8 问题五： 最优阈值确定

8.1 问题五分析

本问的核心在符合可持续发展情况下，给定降水量情形，分析实验草场内放牧羊的最大阈值。首先，根据题干附件 14、15 所给指标，并未包含降水量信息，为明确降水量与与放牧羊数量的影响关系，纳入附件 8 的降水量信息，进行表单合并与数据二次处理；其次，为了确定羊群的最优阈值，建立降水量-羊群阈值模型，同时需要将放牧政策的可持续发展化进行量化，以设置优化目标、决策变量与约束条件等；然后确定优化的求解模型-粒子群优化算法，通过不断迭代粒子群位置，跳出局部最优视域，从全局最优视域入手，获取最优解；最后，根据求解的最优问题填充问五在不同降雨量下，且满足可持续发展的情况下的羊群阈值最优解。




图 8.1 思路流程图

8.2 附件数据处理

对于选取的附件 8、14、15 的数据均在前问中处理，仅从题干所给的降水量信息入手，且考虑 14、15 中的指标因素不包含降水信息，需结合附件 8 中锡林郭勒盟气候的降水量。为了将该部分数据互相关联，从附件 15 中的轮牧处理方式与日期入手，根据问题假设一，以 2019 年放牧小区 G6 群落 PB 关联降雨量为例，鉴于 2019.5.30 开始采用轻牧强度，以时间序列为例，通过 10 轮处理，历经 31 天，其对应 2019 年 5 月与 6 月平均降水量分别为 30.23 与 64.77 进行关联，如示表 8.1 所示。

表 8.1 附件 15 与附件 8 并表

年份	轮次	处理	日期	植物种名	植物群落能群	放牧小区 Block	干重(g)	降水量 (mm)
2019	牧前	轻牧(3 天)	2019.5.10	大针茅	PB	G6	25.41	30.23
2019	牧前	轻牧(3 天)	2019.5.10	糙隐子草	PB	G6	1.25	30.23

2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	大针茅	PB	G6	6.13	30.23
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	糙隐子草	PB	G6	4.87	30.23
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	大针茅	PB	G6	6.89	30.23
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	糙隐子草	PB	G6	0.09	30.23
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	大针茅	PB	G6	15.71	30.23
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	糙隐子草	PB	G6	1.73	64.77
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	大针茅	PB	G6	8.16	64.77
2019	牧前	轻牧(3天)	2019.5.10	糙隐子草	PB	G6	0.19	64.77

8.3 确定最优阈值

8.3.1 优化目标

根据题目要求需确定实验草场内放牧羊的最大数量，且需要满足给定的不同降雨量与可持续发展政策，即共有两个目标：

- 1、要求不同降雨量（300mm、600mm、900mm 与 1200mm）下，实验草场放牧羊最大值。
- 2、尽可能满足可持续化发展需求。

8.3.2 目标函数

建立降雨量-羊群阈值优化模型，即目标函数如下所示。

$$\max(\text{Sheep}) = f(Ra, \tau_i) \quad (8.1)$$

其中 sheep 为最大羊群阈值， Ra 为降水量， τ_i 表示各类变量。

8.3.3 决策变量

本问所建立的优化模型中影响羊群阈值的主要是降雨量 Ra 和其他各类变量 τ_i ，其具体变量如下所示。

- （1）降雨量 Ra 变量：鉴于降雨量所给固定值，其 $Ra = \{300, 600, 900, 1200\}$
- （2）其他各类变量 τ_i 定义：

表 8.2 变量定义说明与选用说明

其他各类变量 τ_i	变量选取理由与合理性
放牧政策变量 pl	“退牧还林”政策会间歇性影响羊群在单位面积内的阈值
实验放牧场 Sq	实验放牧场地大小直接决定羊群阈值
植物群落功能群 Gc	植被的种类影响到草自身的长势问题
放牧-植被影响模型 W_t	降水量同植被生长有重要影响，直接影响羊群阈值
叶面积指数 LAI	根据扩展知识： LAI 关乎植被生长，直接影响羊群

8.3.4 约束条件

根据问题五的要求，在寻求最优羊群阈值的情况下，拥有下述约束条件：

（1）放牧政策条件

根据百度百科词条《退牧还草政策》中将 30% 重度退化草原建设围栏实时禁牧操作，结合问题 4 所给的土壤板结化与沙漠化定义，即放牧政策间接性的影响羊群活动的区域^[13]，即 pl 表示单位面积内重度退化草场的还草率，具体定义如公式 8.2 所示。

$$pl = 0.3 * \sum SM \quad (8.2)$$

其中 $\sum SM$ 表示该地的沙漠化指数与板结程度。

即约束条件 1 为：

$$0 \leq pl \leq 0.3 \quad (8.3)$$

（2）实验放牧场条件

根据附件 14 所给的实验草场缩略图而言，实验草场共划分为 20 块实验草地，且每块实验场地均为 1.44ha，即在 1.44ha 中寻求羊群的最大阈值，而不是在单位面积内寻求，如

图 8.2 所示。




图 8.2 实验草场 block 划分示意图

即可知 Me 与 $Sheep$ 间的关系式如下 8.4 所示。

$$Me = sheep/1.44 \quad (8.4)$$

为了方便后续的阈值求解，这里假定以试验场地的 block 作为主要的阈值求解区。

(3) 植物群落功能群

鉴于附件 15 所给出的植物群落功能群划分，同问一中所所述的放牧与群落种类影响无法完全看出，但从实际角度入手^[14~16]，植物群落功能群具有一定的生长特性，为了明确这部分的变化，根据这三类群落的描述，重新赋值给出对应的生长率，如公式 8.4 所示。

$$Gc_i = dw_i/dt = \begin{cases} 0.1 & i = 1 \\ 0.2 & i = 2 \\ 0.3 & i = 3 \\ 0.4 & i = 4 \end{cases} \quad (8.5)$$

其中 $i=1$ 表示 PR 是多年生根茎型禾草(PR)、 $i=2$ 表示多年生杂草(PF)、 $i=3$ 表示多年生从草型禾草(PB)、 $i=4$ 表示一二年生草本(AB)。

即约束条件 2 为：

$$0.1 \leq Gc_i \leq 0.4 \quad (8.6)$$

(4) 放牧-植被影响模型

鉴于问题一已对植被影响模型进行机理性分析后，无需在进行处理，直接沿用问一的模型为基础进行展开，即约束条件 3：

$$\begin{cases} 0 \leq Me \leq 8 \\ Wt \sim Me \end{cases} \quad (8.7)$$

(5) 叶面积指数 LAI

根据本问所给名词定义，叶面积指数满足叶片总面积/土地面积，且通过对附件 10 的遍历，获取约束条件 4：

$$0.5 \leq LAI \leq 1 \quad (8.8)$$

8.3.5 建立降水量-羊群阈值模型

根据上述的约束条件与目标函数，建立对应模型 8.9：

$$\text{Max}(Sheep) = f(Ra, \tau_i)$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} 0 \leq pl \leq 0.3 \\ 0.1 \leq Gc_i \leq 0.4 \\ 0 \leq Me \leq 8 \\ 0.5 \leq LAI \leq 1 \end{cases} \quad (8.9)$$

8.3.5 降水量-羊群阈值模型求解

根据问题所给的降水量定义，为年降水量固定，对附件 15 的数据进行划分，明确所选用的数据集，具体如表 8.3 所示。

表 8.3 附件数据划分

降水量	数据选用
300mm	轮牧为 2020 年数据
600mm	轮牧为 2019 年数据
900mm	轮牧为 2016 年数据
1200mm	轮牧为 2017 与 2020 年数据

分别选用四轮实际数据进行处理与迭代，带入具体的羊群优化模型，利用基于粒子群算法进行求解流程：

Step1	初始化粒子群（规模为 50），其中初始位置采用固定降雨量信息，其余种群的初始位置随机选择，所有种群的初始速度随机化
Step2	根据适应度公式，计算每个粒子的适应值
Step3	对每个粒子而言，将当前适应值同个体历史最佳位置所对应的适应值进行比对，若当前适应值更高，则判断粒子当前是否满足所提的约束条件，若满足，即用当前位置更替为最新位置，否则不更新
Step4	对每个例子而言，将其当前适应值与全局最佳位置应对适应值做对比，若当前位置更高，即更新交替
Step5	根据公式更新每个粒子的速度与位置
Step6	判断是否满足约束，若没有满足，即返回 step2。

8.3.6 最优阈值确定

表 8.4 羊群最大阈值表

降水量	羊群最大阈值（以 1.44ha 为例）
300mm	3.0723
600mm	4.5881
900mm	5.8613
1200mm	7.7496

9 问题六： 图示演化四个示范区土地状态预测结果

9.1 问题六分析

根据问题六要求，需要对附件 2、7、13、14、15 的数据进行挖掘分析，因此对这四个附件进行预处理，作为问题六的基础数据。针对问题六提到的两种情况（附件 13 放牧策略和问题 4 中得到的放牧方案）分别处理附件数据预测土地状态。首先，分析附件 13，得出四个示范区的放牧策略；其次，对土地状态（土壤肥力变化、土壤湿度、植被覆盖等）进行化学、物理的机理性分析，确定影响土地状态的因素，给合前面问题已分析的土壤湿度、植被覆盖的影响因素，所以此处主要考虑土壤肥力的影响因素；最后，结合问题一、二、三所建模型，在上述两种情况下分别预测示范区的土地状态，并用图示呈现预测结果，具体思路见图 9.1 所示。




图 9.1 问题六思路流程图

9.2 数据分析与机理分析

根据问题六要求，首先需要对附件 13 示范区的放牧强度进行分析，遍历附件 13 所有数据，探索得出放牧压力与放牧强度间的关系，即**放牧压力等价于放牧强度**，结合附件 14，分析示范牧区所处的放牧小区。

其次，从物理、化学角度对土地状态进行机理分析^[17]，结合问题一、二，在土壤湿度影响因素已处理的基础上，同问题一植被生物量与植被覆盖情况清晰的情况下，本问主要分析土壤肥力。土壤肥力是反映土壤肥沃的重要性指标，其成分主要受到养分、物理、化学因素的影响，具体分析如下：

从养分因素入手，考虑到植物生长所必备的 N、P、K 三大元素，结合本文给出的有机物含量，选用相同元素 N 作为养分的主影响因素；

从物理因素入手，将土壤的质地、水分、温度等状况划分为影响土壤肥力的物理因素；同时结合附件 8 所给气候因素指标和前文分析，认为水分与土壤湿度相关，故按作重复处理，因此仅选用温度作为物理影响因素；

从化学因素入手，因土壤的酸碱度、含盐量、土壤中还原性物质等因素会直接影响植物的生长，是土壤肥力的主要化学因素，同时结合附件 7 提供的锡林郭勒土壤基本数据，

选定土壤深、浅层 PH 平均值作为影响土壤肥力的化学影响因素^[18], 考虑到土壤 PH 值短期内不会发生改变, 因此仅选用全氮 N 和温度分别表示土地肥力的强弱。

9.3 示范区土地状态预测结果





图 9.2 示范区 1 两种放牧策略土地状态预测结果

图 9.3 示范区 2 两种放牧策略土地状态预测结果

图 9.4 示范区 3 两种放牧策略土地状态预测结果



a 策略

b 策略

图 9.5 示范区 4 两种放牧策略土地状态预测结果

公众号：竞赛资料网

10 模型的评价和推广

10.1 模型的评价

10.1.1 模型的优点

1) 对于所给附件与收集数据的处理较为完备,对于附件间表单的合并处理操作,均以时序特性进行关联,防止因数据规模问题影响到回归模型的预测性。

2) 根据数据分布的特性,选用斯皮尔曼相关性分析,从十五个附件中选用对应的数据集进行处理验证,充分考虑变量特性的同时,提高数据选用的精准性。

3) 分别从物理、化学、养分角度对土壤肥力进行机理性分析,充分考虑影响土壤肥力的因素,使得预测结果更科学。

4) 基于变量时序特性,差分自回归平均移动模型与具有较高时序性的 LSTM-SA 深度学习模型分别以年与月的方式分开预测,从多方角度验证预测数据,使得模型具有更高的精度与鲁棒性。

10.1.2 模型的缺点

1) 鉴于附件三土壤湿度数据较少,使用深度学习模型,可能会存在着部分过拟合的情况。

2) 鉴于所给的附件数据较多,仅从机理性角度入手,其附件数据并未完全利用,可能会忽略一些变量所带来的放牧影响。

10.2 模型的推广

10.2.1 适用性

该问从机理性的角度入手,建立放牧策略与各类影响因素的模型,根据这种机理的特性,可以延伸至海洋渔与各类因素的影响模型,具有一定的适用性。

10.2.2 鲁棒性

问题二的 LSTM-SA 模型与多维影响-时序性 ARI 模型,这两个模型具有较高的时序特性,对于时序性数据处理具有较高的预测效果且较为稳定,其模型思想也可运用于环境空气的预测等,具有较为强健的鲁棒性。

11 参考文献

- [1]王悦骅.模拟降水对不同载畜率放牧荒漠草原植物多样性的影响[D].内蒙古农业大学,2019.
- [2]张娜.不同放牧强度对典型草原植被群落特征及土壤理化性状的影响[D].中国农业科学院,2020.
- [3]杨晨晨.不同放牧强度对锡林郭勒草甸草原群落及植物功能性状的影响[D].内蒙古大学,2021.
- [4]侯琼,王英舜,杨泽龙等.基于水分平衡原理的内蒙典型草原土壤水动态模型研究[J].干旱地区农业研究,2011,29(05):197-203.
- [5]Woodward S J R. Wake G C. McCall D G. Optimal grazing of a multi—paddock system using a discrete time model[J]. Agri—cultural Systems,1995,48:119—139.
- [6]张力.土壤有机碳和无机碳耦合关系研究进展[J].安徽农业科学,2017,45(32):121-123.
- [7]敖小蔓.氮、磷添加对呼伦贝尔草甸草原碳循环关键过程的影响[D].内蒙古大学,2021.
- [8]宫海静,王德利.草地放牧系统优化模型的研究进展[J].草业学报,2006(06):1-8.
- [9]马清霞,王星晨,高志国.锡林郭勒草原荒漠化气候因素分析[J].北方环境,2011,23(12):31-34.
- [10]梁晓谦,李建平,张翼等.荒漠草原植被及土壤生态化学计量对降水的响应[J].草业科学,2022,39(05):864-875.
- [11]杨雅楠,杨振奇,郭建英.放牧强度对荒漠草原植被、土壤及其侵蚀特征的影响[J].水土保持通报,2022,42(04):66-73.
- [12]刘敦利.基于栅格尺度的土地沙漠化预警模式研究[D].新疆大学,2010.
- [13]许宏斌,辛晓平,宝音陶格涛等.放牧对呼伦贝尔羊草草甸草原生物量分布的影响[J].草地学报,2020,28(03):768-774.
- [14]李颖,龚吉蕊,刘敏等.不同放牧强度下内蒙古温带典型草原优势种植物防御策略[J].植物生态学报,2020,44(06):642-653.
- [15]赵康.季节性放牧对典型草原群落生产力的影响[D].内蒙古大学,2014.
- [16]李想.锡林郭勒草原群落生物量及物种多样性研究[D].内蒙古师范大学,2022.
- [17]Simon J. R. Woodward, Graeme C. Wake, et al. A Simple Model for Optimizing Rotational Grazing[J]. Agricultural Systems,1993,41:123-155.
- [18]王莉.土地沙漠化原因及林业防沙治沙措施[J].新农业,2022(06):20.

附录

程序模块 1: 对基本数据进行可视化展示, 分析时序数据的变化趋势。

```
1. import time
2. import csv
3. import matplotlib.pyplot as plt
4. import numpy as np
5. import pandas as pd
6. import xlrd
7. import os
8. from statsmodels.tsa.arima_model import ARIMA
9. from pandas.core.frame import DataFrame
10. import statsmodels.api as sm
11.
12. plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 显示中文标签
13. plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 这两行需要手动设置
14.
15. def test01(): # 读取土壤湿度数据
16.     address = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件 3、
        土壤湿度 2022-2012 年.xls"
17.     workbook = xlrd.open_workbook(address)
18.     sheet_name = workbook.sheet_names()[0]
19.     sheet = workbook.sheet_by_index(0)
20.     all_data = []
21.     for i in range(sheet.nrows):
22.         if i == 0:
23.             continue
24.         all_data.append(sheet.row_values(i))
25.     all_data = np.array(all_data)
26.     plt.figure(figsize=(16, 12)) # 设置图布大小
27.     index1 = 0
28.     for index, i in enumerate(list(range(2012, 2022))):
29.         plt.subplot(3, 4, index + 1)
30.         each_year10 = []
31.         each_year40 = []
32.         each_year100 = []
33.         each_year200 = []
34.         for j in all_data:
35.             if int(j[1]) == i:
36.                 each_year10.append(float(j[4]))#10cm
37.                 each_year40.append(float(j[5]))#40cm
38.                 each_year100.append(float(j[6]))#100cm
39.                 each_year200.append(float(j[7]))#200cm
```

```

40.     each_year10 = each_year10[::-1] #数据逆序
41.     each_year40 = each_year40[::-1]
42.     each_year100 = each_year100[::-1]
43.     each_year200 = each_year200[::-1]
44.     x = (np.arange(12) + 1).astype(dtype=np.str)
45.     # x = np.arange(12).astype(dtype=np.str)
46.     plt.plot(x, each_year10, label='10cm 深度')
47.     plt.plot(x, each_year40, label='40cm 深度')
48.     plt.plot(x, each_year100, label='100cm 深度')
49.     plt.plot(x, each_year200, label='200cm 深度')
50.     plt.title(str(i) + "年")
51.     plt.xlabel("month")
52.     plt.ylabel("湿度值(kg/m2)")
53.     plt.legend(loc="center right")
54.     plt.tight_layout()
55.     pic_path = "土壤湿度 2012-2021" + '.png'
56.     if os.path.exists(pic_path):
57.         os.remove(pic_path)
58.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
59.     # plt.show()
60.
61.
62. def test02(): # 读取土壤蒸发量数据
63.     address = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件 4、
        土壤蒸发量 2012-2022 年.xls"
64.     workbook = xlrd.open_workbook(address)
65.     sheet = workbook.sheet_by_index(0)
66.     all_data = []
67.     for i in range(sheet.nrows):
68.         if i == 0:
69.             continue
70.         all_data.append(sheet.row_values(i))
71.     all_data = np.array(all_data)
72.     plt.figure(figsize=(16, 12))
73.     for index, i in enumerate(list(range(2012, 2022))):
74.         plt.subplot(3, 4, index + 1)
75.         each_year10 = []
76.         each_year40 = []
77.         for j in all_data:
78.             if int(j[1]) == i:
79.                 each_year10.append(float(j[4]))
80.                 each_year40.append(float(j[5]))
81.         print("年份:", i)
82.         each_year10 = each_year10[::-1]

```

```

83.     each_year40 = each_year40[::-1]
84.     x = (np.arange(12) + 1).astype(dtype=np.str)
85.     # x = np.arange(12).astype(dtype=np.str)
86.     plt.plot(x, each_year10, label='土壤蒸发量(W/m2)')
87.     plt.plot(x, each_year40, label='土壤蒸发量(mm)')
88.     plt.title(str(i) + "年")
89.     plt.xlabel("month")
90.     plt.ylim(0, 40)
91.     plt.legend(loc="upper right")
92.     plt.tight_layout()
93.     pic_path = "土壤蒸发量 2012-2021" + '.png'
94.     if os.path.exists(pic_path):
95.         os.remove(pic_path)
96.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
97.
98.
99. def get_data(addr):#批量读取 excel 文件
100.     workbook = xlrd.open_workbook(addr)
101.     sheet = workbook.sheet_by_index(0)
102.
103.     all_data = []
104.     for i in range(sheet.nrows):
105.         if i == 0:
106.             continue
107.         all_data.append(sheet.row_values(i))
108.     all_data = np.array(all_data)
109.     sheet_nrow = sheet.nrows
110.     return all_data, sheet_nrow
111.
112.
113. def test05(): # 获取绿植覆盖率数据
114.     address1 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
        5、绿植覆盖率(2020-2022)\2020 绿植覆盖率.xls"
115.     address2 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
        5、绿植覆盖率(2020-2022)\2021 绿植覆盖率.xls"
116.     address3 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
        5、绿植覆盖率(2020-2022)\2022 绿植覆盖率.xls"
117.
118.     all_data1, sheet_nrow1 = get_data(address1) #读取 2020 绿植覆盖率
119.     all_data2, sheet_nrow2 = get_data(address2) #读取 2021 绿植覆盖率
120.     all_data3, sheet_nrow3 = get_data(address3) #读取 2022 绿植覆盖率
121.     plt.figure(figsize=(10, 10))
122.
123.     plt.subplot(3, 1, 1)

```

```

124.     each_year10 = []
125.     for j in all_data1:
126.         if j[2] == 'nan':
127.             each_year10.append(0)
128.             continue
129.             each_year10.append(float(j[2]))
130.     x = (np.arange(sheet_nrow1 - 1) + 1).astype(dtype=np.str)
131.     plt.plot(x, each_year10)
132.     plt.xlabel("记录次序")
133.     plt.ylabel("绿植覆盖率")
134.     plt.title("2020" + "年")
135.
136.     plt.subplot(3, 1, 2)
137.     each_year10 = []
138.     for j in all_data2:
139.         if j[2] == 'nan':
140.             each_year10.append(0)
141.             continue
142.             each_year10.append(float(j[2]))
143.     x = (np.arange(sheet_nrow2 - 1) + 1).astype(dtype=np.str)
144.     plt.plot(x, each_year10)
145.     plt.xlabel("记录次序")
146.     plt.ylabel("绿植覆盖率")
147.     plt.title("2021" + "年")
148.
149.     plt.subplot(3, 1, 3)
150.     each_year10 = []
151.     for j in all_data3:
152.         if j[2] == 'nan':
153.             each_year10.append(0)
154.             continue
155.             each_year10.append(float(j[2]))
156.     x = (np.arange(sheet_nrow3 - 1) + 1).astype(dtype=np.str)
157.     plt.plot(x, each_year10)
158.     plt.ylabel("绿植覆盖率")
159.     plt.xlabel("记录次序")
160.     plt.title("2022" + "年")
161.     plt.tight_layout()
162.     pic_path = "植被覆盖率 2020-2022" + '.png'
163.     if os.path.exists(pic_path):
164.         os.remove(pic_path)
165.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
166.
167.

```

```

168. def test06(): # 获取植被指数数据
169.     address = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件
        6、植被指数-NDVI2012-2022 年.xls"
170.     workbook = xlrd.open_workbook(address)
171.     sheet_name = workbook.sheet_names()[0]
172.     sheet = workbook.sheet_by_index(0)
173.
174.     all_data = []
175.     for i in range(sheet.nrows):
176.         if i == 0:
177.             continue
178.         all_data.append(sheet.row_values(i))
179.     all_data = np.array(all_data)
180.     plt.figure(figsize=(25, 16))
181.     for index, i in enumerate(list(range(2012, 2022))):
182.         print(index)
183.         plt.subplot(3, 4, index + 1)
184.         each_year10 = []
185.         for j in all_data:
186.             if int(j[1]) == i:
187.                 each_year10.append(float(j[4]))
188.         print("年份:", i)
189.         each_year10 = each_year10[::-1]
190.         x = np.arange(12).astype(dtype=np.str)
191.         plt.ylim(0, 0.6)
192.         plt.plot(x, each_year10, label='10')
193.         plt.title(str(i) + "年")
194.         plt.xlabel('月份')
195.         # plt.legend()
196.     plt.tight_layout()
197.     pic_path = "植被指数 2012-2021" + '.png'
198.     if os.path.exists(pic_path):
199.         os.remove(pic_path)
200.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)

```

程序模块 2：根据附件 3 土壤湿度数据、附件 4 土壤蒸发数据以及附件 8 中降水等数据，建立模型对保持目前放牧策略不变情况下对 2022 年、2023 年不同深度土壤湿度进行预测。

```

1. def lstm_test(prediction_data, count):#建立预测模型
2.     device = torch.device("cuda")
3.     """
4.     导入数据
5.     """
6.     # load the dataset
7.     dataset = prediction_data

```

```

8.     dataset = dataset.astype('float32')
9.
10.    #
11.    # ""
12.    # 数据预处理
13.    # ""
14.    all_data = dataset
15.    # 划分测试集和训练集
16.    test_data_size = 3
17.    train_data = all_data[:-test_data_size] # 除了最后 3 个数据, 其他全取
18.    test_data = all_data[-test_data_size:] # 取最后 3 个数据
19.    # # 最大最小缩放器进行归一化, 减小误差
20.    from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
21.
22.    scaler = MinMaxScaler(feature_range=(-1, 1))
23.    train_data_normalized = scaler.fit_transform(train_data.reshape(-1, 1))
24.
25.    train_data_normalized = torch.FloatTensor(train_data_normalized).view(-1)
26.
27.    # view 相当于 numpy 中的 resize, 参数代表数组不同维的维度;
28.    # 参数为-1 表示, 这个维的维度由机器自行推断, 如果没有-1, 那么 view 中的所有参数就要和
    tensor 中的元素总个数一致
29.
30.    # 定义 create_inout_sequences 函数, 接收原始输入数据, 并返回一个元组列表。
31.    def create_inout_sequences(input_data, tw):
32.        inout_seq = []
33.        L = len(input_data)
34.        for i in range(L - tw):
35.            train_seq = input_data[i:i + tw]
36.            train_label = input_data[i + tw:i + tw + 1] # 预测 time_step 之后的第一个数
    值
37.            inout_seq.append((train_seq, train_label)) # inout_seq 内的数据不断更新, 但
    是总量只有 tw+1 个
38.        return inout_seq
39.
40.    train_window = 6 # 设置训练输入的序列长度为 12, 类似于 time_step = 12
41.    train_inout_seq = create_inout_sequences(train_data_normalized, train_window)
42.
43.    class LSTM(nn.Module): # 注意 Module 首字母需要大写
44.        def __init__(self, input_size=1, hidden_layer_size=100, output_size=1):
45.            super().__init__()
46.            self.hidden_layer_size = hidden_layer_size
47.
48.            # 创建 LSTM 层和 linear 层, LSTM 层提取特征, linear 层用作最后的预测

```

```

49.         # LSTM 算法接受三个输入：先前的隐藏状态，先前的单元状态和当前输入。
50.         self.lstm = nn.LSTM(input_size, hidden_layer_size)
51.         self.linear = nn.Linear(hidden_layer_size, output_size)
52.
53.         # 初始化隐含状态及细胞状态 C，hidden_cell 变量包含先前的隐藏状态和单元状态
54.         self.hidden_cell = (torch.zeros(1, 1, self.hidden_layer_size),
55.                             torch.zeros(1, 1, self.hidden_layer_size))
56.
57.         def forward(self, input_seq):
58.             lstm_out, self.hidden_cell = self.lstm(input_seq.view(len(input_seq), 1, -
1), self.hidden_cell)
59.             # lstm 的输出是当前时间步的隐藏状态 ht 和单元状态 ct 以及输出 lstm_out
60.             # 按照 lstm 的格式修改 input_seq 的形状，作为 linear 层的输入
61.             predictions = self.linear(lstm_out.view(len(input_seq), -1))
62.             return predictions[-1] # 返回 predictions 的最后一个元素
63.
64.         # 创建 LSTM()类的对象，定义损失函数和优化器
65.         model = LSTM()
66.         model = model.to(device)
67.         loss_function = nn.MSELoss()
68.         optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001) # 建立优化器实例
69.
70.         epochs = 150
71.         epoch_loss = []
72.         for i in range(epochs):
73.             for seq, labels in train_inout_seq:
74.                 seq = seq.to(device)
75.                 labels = labels.to(device)
76.
77.                 # 初始化隐藏层数据
78.                 model.hidden_cell = (torch.zeros(1, 1, model.hidden_layer_size).to(device),
79.                                     torch.zeros(1, 1, model.hidden_layer_size).to(device))
80.
81.                 # 实例化模型
82.                 y_pred = model(seq)
83.                 # 计算损失，反向传播梯度以及更新模型参数
84.                 single_loss = loss_function(y_pred, labels) # 训练过程中，正向传播生成网络的
输出，计算输出和实际值之间的损失值
85.                 single_loss.backward() # 调用 loss.backward()自动生成梯度，
86.                 optimizer.step() # 使用 optimizer.step()执行优化器，把梯度传播回每个网络
87.                 epoch_loss.append(single_loss)
88.         fut_pred = count

```

```

89.     test_inputs = train_data_normalized[-train_window:].tolist() # 首先打印出数据列表的
      最后6个值
90.
91.     # 更改模型为测试或者验证模式
92.     model.eval() # 把 training 属性设置为 false,使模型处于测试或验证状态
93.     for i in range(fut_pred):
94.         seq = torch.FloatTensor(test_inputs[-train_window:]).to(device)
95.         with torch.no_grad():
96.             model.hidden = (torch.zeros(1, 1, model.hidden_layer_size).to(device),
97.                             torch.zeros(1, 1, model.hidden_layer_size).to(device))
98.             test_inputs.append(model(seq).item())
99.
100.    actual_predictions = scaler.inverse_transform(np.array(test_inputs[train_window:]).
      .reshape(-1, 1))
101.    return test_data, actual_predictions
102.
103.
104. def corr(): # 问题二相关性分析热力图
105.     address1 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
      3、土壤湿度 2022-2012 年.xls"
106.     address2 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
      4、土壤蒸发量 2012-2022 年.xls"
107.     data1 = pd.read_excel(address1, header=0).values[:, -4:]
108.     data2 = pd.read_excel(address2, header=0).values[:, -4:]
109.     data_all = np.concatenate((data1, data2), axis=1)
110.     result_1 = pd.DataFrame(data_all).corr(method='spearman')
111.     ax = sns.heatmap(result_1, annot=True,
112.                      xticklabels=["10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度", "200cm 湿度", "
      土壤蒸发量(mm)", "降水量(mm)",
113.                                   "最大单日降水",
114.                                   "降水天数"],
115.                      yticklabels=["10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度", "200cm 湿度", "
      土壤蒸发量(mm)", "降水量(mm)",
116.                                   "最大单日降水",
117.                                   "降水天数"]
118.                      )
119.     plt.xticks(rotation=30)
120.     plt.tight_layout()
121.     pic_path = "问题二相关性分析" + '.png'
122.     if os.path.exists(pic_path):
123.         os.remove(pic_path)
124.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
125.
126.

```

```

127. address1 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件 3、土壤湿度 2022-2012 年.xls"
128. address2 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件 4、土壤蒸发量 2012-2022 年.xls"
129. data1 = pd.read_excel(address1, header=0).values[:, -4:]
130. data2 = pd.read_excel(address2, header=0).values[:, -5:]
131. data3 = pd.read_excel(address2, header=0).values[:, 0]
132. data3 = data3.flatten().reshape((123, 1))
133.
134. def four_acf(): # 分别对 10cm,60cm,100cm,200cm 进行 acf 分析
135.     acf_data0 = data1[:, 0][::-1] # 10cm
136.     acf_data1 = data1[:, 1][::-1] # 60cm
137.     acf_data2 = data1[:, 2][::-1] # 100cm
138.     acf_data3 = data1[:, 3][::-1] # 200cm
139.     acf("10cm", acf_data0)
140.     acf("60cm", acf_data1)
141.     acf("100cm", acf_data2)
142.     acf("200cm", acf_data3)
143.
144. data_all = np.concatenate((data1, data2, data3), axis=1)
145.
146.
147. true_predict(0, "10cm 预测线")
148. true_predict(1, "40cm 预测线")
149. true_predict(2, "100cm 预测线")
150. true_predict(3, "200cm 预测线")

```

程序模块 3：建立不同放牧策略（放牧方式和放牧强度）对锡林郭勒草原土壤化学性质影响的数学模型。结合附件 14 中数据预测锡林郭勒草原监测样地(12 个放牧小区)在不同放牧强度下 2022 年土壤同期有机碳、无机碳、全 N、土壤 C/N 比等值。

```

1. address1 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\监测点数据\附件 14：内蒙古自治区锡林郭勒盟典型草原不同放牧强度土壤碳氮监测数据集（2012 年 8 月 15 日-2020 年 8 月 15 日）\内蒙古自治区锡林郭勒盟典型草原不同放牧强度土壤碳氮监测数据集（2012 年 8 月 15 日-2020 年 8 月 15 日）.xls"
2. data1 = pd.read_excel(address1, header=0).values[:, :8]
3.
4.
5. def predict(data, location):#使用建立的模型预测数据
6.     NG_data_G17 = data
7.     NG_data_G17_SOC = NG_data_G17[:, 3]
8.     NG_data_G17_SIC = NG_data_G17[:, 4]
9.     NG_data_G17_STC = NG_data_G17[:, 5]
10.    NG_data_G17_N = NG_data_G17[:, 6]

```

```

11.     NG_data_G17_C = NG_data_G17[:, 7]
12.
13.     def read_predict_data():#读取预测得到的数据
14.         address2 = r"D:\桌面\ques3.xls"
15.         data1 = pd.read_excel(address2).values[1:, :]
16.         data = [i for i in data1 if i[1] == location][0]
17.         return data
18.
19.     predict_data = read_predict_data()
20.     predict_1 = predict_data[2]
21.     predict_2 = predict_data[3]
22.     predict_3 = predict_data[4]
23.     predict_4 = predict_data[5]
24.     predict_5 = predict_data[6]
25.     NG_data_G17_SOC_all = list(NG_data_G17_SOC.flatten())
26.     NG_data_G17_SOC_all.extend([predict_1]) #历史数据与预测数据结合
27.     NG_data_G17_SIC_all = list(NG_data_G17_SIC.flatten())
28.     NG_data_G17_SIC_all.extend([predict_2])
29.     NG_data_G17_STC_all = list(NG_data_G17_STC.flatten())
30.     NG_data_G17_STC_all.extend([predict_3])
31.     NG_data_G17_N_all = list(NG_data_G17_N.flatten())
32.     NG_data_G17_N_all.extend([predict_4])
33.     NG_data_G17_C_all = list(NG_data_G17_C.flatten())
34.     NG_data_G17_C_all.extend([predict_5])
35.
36.     plt.figure(figsize=(16,9))
37.     x = np.arange(len(NG_data_G17_SOC_all))
38.
39.     plt.subplot(2, 3, 1)
40.     plt.plot(x, NG_data_G17_SOC_all,label='true')
41.     plt.legend(loc='upper right')
42.     plt.title("SOC")
43.
44.     plt.subplot(2, 3, 2)
45.     plt.plot(x, NG_data_G17_SIC_all,label='true')
46.     plt.legend(loc='upper right')
47.     plt.title("SIC")
48.
49.     plt.subplot(2, 3, 3)
50.     plt.plot(x, NG_data_G17_STC_all,label='true')
51.     plt.legend(loc='upper right')
52.     plt.title("STC")
53.
54.     plt.subplot(2, 3, 4)

```

```

55. plt.plot(x, NG_data_G17_N_all,label='true')
56. plt.legend(loc='upper right')
57. plt.title("N")
58.
59. plt.subplot(2, 3, 5)
60. plt.plot(x, NG_data_G17_C_all,label='true')
61. plt.legend(loc='upper right')
62. plt.title("C/N")
63.
64. plt.tight_layout()
65.
66. pic_path = location + '.png'
67. if os.path.exists(pic_path):
68.     os.remove(pic_path)
69. plt.savefig(pic_path, dpi=500)
70.
71.
72. NG_data = [i for i in data1 if i[2] == "NG"] #筛选 NG 数据
73. NG_data_G17 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G17"])
74. predict(NG_data_G17, "G17")
75. NG_data_G19 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G19"])
76. NG_data_G21 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G21"])
77.
78. NG_data = [i for i in data1 if i[2] == "LGI"] #筛选 LGI 数据
79. NG_data_G17 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G6"])
80. predict(NG_data_G17, "G6")
81. NG_data_G19 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G12"])
82. NG_data_G21 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G18"])
83.
84. NG_data = [i for i in data1 if i[2] == "MGI"] #筛选 MGI 数据
85. NG_data_G17 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G8"])
86. predict(NG_data_G17, "G8")
87. NG_data_G19 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G11"])
88. NG_data_G21 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G16"])
89. NG_data = [i for i in data1 if i[2] == "HGI"] #筛选 HGI 数据
90. NG_data_G17 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G9"])
91. NG_data_G19 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G13"])
92. NG_data_G21 = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G20"])
93. predict(NG_data_G17, "G9")
94. predict(NG_data_G19)
95. predict(NG_data_G21)

```

程序模块 4：根据示范牧户放牧策略不变和问题 4 中得到的放牧方案两种情况,分别在这两

种情况下建立预测模型并对九月的土壤肥力变化、土壤湿度、植被覆盖等指标进行预测。

```
1. plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 显示中文标签
2. plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 这两行需要手动设置
3.
4.
5. address3 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件8、锡
   林郭勒盟气候 2012-2022\\"
6. average_temperature_a = []
7. for i in range(2012, 2023):
8.     address = address3 + str(i) + "年.xls"
9.     data_address = pd.read_excel(address, header=0)
10.    data_value = data_address.values[:, 6].tolist()
11.    average_temperature_a.extend(data_value)
12.
13. address1 = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\监测点数据\附件14:
   内蒙古自治区锡林郭勒盟典型草原不同放牧强度土壤碳氮监测数据集（2012年8月15日-2020年8月15
   日）\内蒙古自治区锡林郭勒盟典型草原不同放牧强度土壤碳氮监测数据集（2012年8月15日-2020年8月
   15日）.xls"
14. data1 = pd.read_excel(address1, header=0).values[:, :8]
15. NG_data = [i for i in data1 if i[2] == "NG"]
16. N = np.array([i for i in NG_data if i[1] == "G17"])
17. N_a = [i[-2] for i in N]
18.
19. address_ground = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
   3、土壤湿度 2022-2012年.xls"
20. data1 = pd.read_excel(address_ground, header=0)
21. data_ground_a = data1.values[3:, 4:][:, 0].tolist() # 土壤湿度
22.
23.
24. def get_data(addr):#对数据按时间排序
25.     workbook = xlrd.open_workbook(addr)
26.     sheet = workbook.sheet_by_index(0)
27.     all_data = []
28.     for i in range(sheet.nrows):
29.         if i == 0:
30.             continue
31.         all_data.append(sheet.row_values(i))
32.     all_data = np.array(all_data)
33.     sheet_nrow = sheet.nrows
34.
35.     new_data = []
36.     for i in range(2012, 2023):
37.         temp = []
```

```

38.         for j in all_data:
39.             if j[1] == str(i):
40.                 temp.append(j[4])
41.             new_data.extend(temp)
42.         return new_data
43.
44.
45. address_ndvi = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件
    6、植被指数-NDVI2012-2022年.xls"
46. ndvi = get_data(address_ndvi)
47. ndvi_a = [float(i) for i in ndvi]
48.
49.
50. x = np.arange(len(average_temperature))
51. plt.plot(x, average_temperature)
52. plt.show()
53. print(len(average_temperature))
54. print(average_temperature)
55.
56. def plot_1():#示范牧户放牧策略不变
57.     plt.figure()
58.     plt.subplot(2, 2, 1)
59.     x = np.arange(len(temperature_predict))
60.     plt.title("平均温度")
61.     plt.plot(x, temperature_predict, color='#8E236B')
62.
63.     plt.subplot(2, 2, 2)
64.     x = np.arange(len(N_predict))
65.     plt.title("全氮 N")
66.     plt.plot(x, N_predict, color='#00FF00')
67.
68.     plt.subplot(2, 2, 3)
69.     x = np.arange(len(data_ground_predict))
70.     plt.title("10cm 湿度")
71.     plt.plot(x, data_ground_predict, color='#E47833')
72.
73.     plt.subplot(2, 2, 4)
74.     x = np.arange(len(ndvi_predict))
75.     plt.plot(x, ndvi_predict)
76.     plt.title("植被覆盖")
77.     plt.tight_layout()
78.     pic_path = str(it) + '策略 a' + '.png'
79.     if os.path.exists(pic_path):
80.         os.remove(pic_path)

```

```

81.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
82.     plt.show()
83.
84. plot_1()
85.
86.
87. def plot_2():#问题 4 中得到的放牧方案
88.     plt.figure()
89.     plt.subplot(2, 2, 1)
90.     x = np.arange(len(temperature_predict_minor))
91.     plt.title("平均温度")
92.     plt.plot(x, temperature_predict_minor, color='#8E236B')
93.
94.     plt.subplot(2, 2, 2)
95.     x = np.arange(len(N_predict_minor))
96.     plt.title("全氮 N")
97.     plt.plot(x, N_predict_minor, color='#00FF00')
98.
99.     plt.subplot(2, 2, 3)
100.    x = np.arange(len(data_ground_predict_minor))
101.    plt.title("10cm 湿度")
102.    plt.plot(x, data_ground_predict_minor, color='#E47833')
103.
104.    plt.subplot(2, 2, 4)
105.    x = np.arange(len(ndvi_predict_minor))
106.    plt.plot(x, ndvi_predict_minor)
107.    plt.title("植被覆盖")
108.    plt.tight_layout()
109.    pic_path = str(it) + '策略 b' + '.png'
110.    if os.path.exists(pic_path):
111.        os.remove(pic_path)
112.    plt.savefig(pic_path, dpi=500)
113.
114.
115. plot_2()

```

程序模块 5：使用时序数据建立季节性 ARIMA 模型，然后使用建立的模型预测数据。

```

1. def true_predict(data_all, name, pred_num):#确定 b,d,q 值
2.     number = 12
3.     if name == "N":
4.         number = 5
5.     dataSet = data_all
6.     # 对时间序列进行去均值化

```

```

7.     mean = sum(dataSet) / len(dataSet) # 计算均值
8.     dataSet_kill_mean = [data - mean for data in dataSet] # 得到去均值后的序列
9.     # 进行一阶差分并绘制趋势图
10.    df_kill_mean = pd.DataFrame(dataSet_kill_mean)
11.    df_kill_mean_1 = df_kill_mean.diff(1).dropna()
12.    import statsmodels.tsa.stattools as ts
13.    adf_summary = ts.adfuller(np.array(df_kill_mean_1).reshape(-1)) # 进行 ADF 检验并打印结果
14.
15.    from statsmodels.graphics.tsaplots import plot_acf, plot_pacf
16.
17.    from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decompose
18.    decomposition = seasonal_decompose(df_kill_mean_1, freq=number)
19.    trend = decomposition.trend # 趋势部分
20.    seasonal = decomposition.seasonal # 季节性部分
21.    residual = decomposition.resid # 残留部分
22.
23.
24.    import itertools
25.    p = q = range(0, 2) # p、q 一般取值不超过 2
26.    d = range(1, 2)
27.    pdq = list(itertools.product(p, d, q))
28.    seasonal_pdq = [(x[0], x[1], x[2], 12) for x in list(itertools.product(p, d, q))]
29.    analysis_data = []
30.    pdq_data = []
31.    seasonal_pdq_data = []
32.    for param in pdq:
33.        for param_seasonal in seasonal_pdq:
34.            try:
35.                mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(dataSet_kill_mean,
36.                                                  order=param,
37.                                                  seasonal_order=param_seasonal,
38.                                                  enforce_stationarity=False,
39.                                                  enforce_invertibility=False)
40.                results = mod.fit()
41.                analysis_data.append(results.aic)
42.                pdq_data.append(param)
43.                seasonal_pdq_data.append(param_seasonal)
44.            except:
45.                continue
46.
47.
48.    analysis_data_index = analysis_data.index(min(analysis_data))
49.    pdq_0 = pdq_data[analysis_data_index][0]

```

```

50.     pdq_1 = pdq_data[analysis_data_index][1]
51.     pdq_2 = pdq_data[analysis_data_index][2]
52.     seasonal_pdq_0 = seasonal_pdq_data[analysis_data_index][0]
53.     seasonal_pdq_1 = seasonal_pdq_data[analysis_data_index][1]
54.     seasonal_pdq_2 = seasonal_pdq_data[analysis_data_index][2]
55.     mod = sm.tsa.statespace.SARIMAX(dataSet, order=(pdq_0, pdq_1, pdq_2),
56.                                     seasonal_order=(seasonal_pdq_0, seasonal_pdq_1, sea
    sonal_pdq_2, 12),
57.                                     enforce_stationarity=False,
58.                                     enforce_invertibility=False)
59.     result = mod.fit() #模型拟合
60.     predict_sunspots = result.forecast(pred_num) #数据预测
61.     forecast = list(np.array(predict_sunspots[:]).reshape(-1))
62.     new_list = dataSet + forecast
63.     return new_list

```

程序模块 6: 对数据序列进行 ACF 检验和 PACF 检验，将数据结果可视化展示。

```

1. def acf(data):#进行 ADF 检验
2.     temp = np.array(data)
3.     t = sm.tsa.stattools.adfuller(temp) # ADF 检验
4.     output = pd.DataFrame(
5.         index=['Test Statistic Value', "p-
    value", "Lags Used", "Number of Observations Used", "Critical Value(1%)",
6.             "Critical Value(5%)", "Critical Value(10%)"], columns=['value'])
7.     output['value']['Test Statistic Value'] = t[0]
8.     output['value']['p-value'] = t[1]
9.     output['value']['Lags Used'] = t[2]
10.    output['value']['Number of Observations Used'] = t[3]
11.    output['value']['Critical Value(1%)'] = t[4]['1%']
12.    output['value']['Critical Value(5%)'] = t[4]['5%']
13.    output['value']['Critical Value(10%)'] = t[4]['10%']
14.    print(output)
15.    fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
16.    fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(data, lags=20) # lags 表示展示的滞后的阶数
17.    pic_path = "acf" + '.png'
18.    if os.path.exists(pic_path):
19.        os.remove(pic_path)
20.    plt.savefig(pic_path, dpi=500)
21.    fig = plt.figure(figsize=(12, 8))
22.    fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(data, lags=20)
23.    pic_path = "pacf" + '.png'
24.    if os.path.exists(pic_path):
25.        os.remove(pic_path)

```

```
26. plt.savefig(pic_path, dpi=500)
```

程序模块 7：绘制降雨量拟合曲线。

```
1. def corr1():
2.     address1 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件
3.     3、土壤湿度 2022-2012 年.xls"
4.
5.     address2 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件
6.     4、土壤蒸发量 2012-2022 年.xls"
7.
8.     address3 = r"D:\桌面\2022 年中国研究生数学建模竞赛试题\2022 年 E 题\数据集\基本数据\附件
9.     8、锡林郭勒盟气候 2012-2022\\"
10.
11.     rain = []
12.
13.     for i in range(2012, 2022):
14.         address = address3 + str(i) + "年.xls"
15.         data_address = pd.read_excel(address, header=0)
16.         data_value = data_address.values[:, 15]
17.         rain.append(data_value)
18.     rain = np.array(rain).flatten().reshape((120, 1))
19.
20.     data1 = pd.read_excel(address1, header=0)
21.     data1_value = data1.values[3:, 4:]
22.     data2 = pd.read_excel(address2, header=0)
23.     data2_value = data2.values[3:, 4:]
24.     data_all = np.concatenate((data1_value, data2_value), axis=1)
25.
26.     data_all = np.concatenate((data_all, rain), axis=1)
27.
28.     result_1 = pd.DataFrame(data_all).corr(method='spearman')
29.     ax = sns.heatmap(result_1, annot=True,
30.                       xticklabels=["10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度", "200cm 湿度", "土
31.     壤蒸发量(W/m2)", "土壤蒸发量(mm)", "降水量(mm)"],
32.                       yticklabels=["10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度", "200cm 湿度", "土
33.     壤蒸发量(W/m2)", "土壤蒸发量(mm)", "降水量(mm)"]
34.
35.     )
36.     plt.xticks(rotation=30)
37.     plt.tight_layout()
38.     plt.show()
39.     # pic_path = "相关性分析" + '.png'
40.     # if os.path.exists(pic_path):
41.     #     os.remove(pic_path)
42.     # plt.savefig(pic_path, dpi=500)
```

```

36. # corr1()
37.
38. def corr2():
39.     address = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据\附件8、
        锡林郭勒盟气候 2012-2022"
40.     rain = [] # 降水量(mm)
41.     average_temperature = [] # 平均气温
42.     for i in range(2012, 2022):
43.         address1 = address + "\\\" + str(i) + "年.xls"
44.         data_address = pd.read_excel(address1, header=0)
45.         data_value = data_address.values[:, 15]
46.         data_value_temperature = data_address.values[:, 6]
47.         rain.append(data_value)
48.         average_temperature.append(data_value_temperature)
49.     rain = np.array(rain).flatten().reshape((120, 1))
50.     average_temperature = np.array(average_temperature).flatten().reshape((120, 1))
51.     address_ground = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数据
        \附件3、土壤湿度 2022-2012年.xls"
52.     data1 = pd.read_excel(address_ground, header=0)
53.     data_ground = data1.values[3:, 4:] # 土壤湿度
54.
55.     address_coverage = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基本数
        据\附件5、绿植覆盖率 (2020-2022) "
56.     coverage_value = [] # 覆盖率
57.     coverage1 = []
58.     coverage2 = []
59.     coverage3 = []
60.     coverage4 = []
61.     coverage5 = []
62.     coverage6 = []
63.     coverage7 = []
64.     coverage8 = []
65.     for i in range(2020, 2021):
66.         address1 = address_coverage + "\\\" + str(i) + "绿植覆盖率.xls"
67.         data_address = pd.read_excel(address1, header=0)
68.         data_value = data_address.values[:, 2]
69.         coverage_value = np.array([i if i > 0 else 0 for i in data_value]).reshape((18,
            1))
70.         coverage1 = np.array(data_address.values[:, 5]).reshape((18, 1))
71.         coverage2 = np.array(data_address.values[:, 6]).reshape((18, 1))
72.         coverage3 = np.array(data_address.values[:, 7]).reshape((18, 1))
73.         coverage4 = np.array(data_address.values[:, 8]).reshape((18, 1))
74.         coverage5 = np.array(data_address.values[:, 9]).reshape((18, 1))
75.         coverage6 = np.array(data_address.values[:, 10]).reshape((18, 1))

```

```

76.         coverage7 = np.array(data_address.values[:, 11]).reshape((18, 1))
77.         coverage8 = np.array(data_address.values[:, 12]).reshape((18, 1))
78.
79.         # address_vegetation = r"D:\桌面\2022年中国研究生数学建模竞赛试题\2022年E题\数据集\基
        本数据\附件6、植被指数-NDVI2012-2022年.xls"
80.         # data_address = pd.read_excel(address_vegetation, header=0)
81.         # vegetation_value = data_address.values[:, 4] # 植被指数
82.         data_all = np.concatenate((coverage_value, coverage1), axis=1)
83.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage2), axis=1)
84.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage3), axis=1)
85.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage4), axis=1)
86.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage5), axis=1)
87.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage6), axis=1)
88.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage7), axis=1)
89.         data_all = np.concatenate((data_all, coverage8), axis=1)
90.         # print(data_all.shape)
91.         # data_all = data_all.apply(lambda x:x.astype(float))
92.         result_1 = pd.DataFrame(data_all).apply(lambda x: x.astype(float)).corr(method='spe
        arman')
93.         ax = sns.heatmap(result_1, annot=True,
94.                             xticklabels=["绿植覆盖率", "10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度",
        "200cm 湿度", "平均气温", "降水量", "植被指数", "低层植被"],
95.                             yticklabels=["绿植覆盖率", "10cm 湿度", "40cm 湿度", "100cm 湿度",
        "200cm 湿度", "平均气温", "降水量", "植被指数", "低层植被"]
96.                             )
97.         plt.xticks(rotation=30)
98.         plt.tight_layout()
99.         pic_path = "植被相关性分析" + '.png'
100.        if os.path.exists(pic_path):
101.            os.remove(pic_path)
102.        plt.savefig(pic_path, dpi=500)
103.
104.
105. corr2()
106.
107.
108. def fit_data(x, y):
109.     y = np.array(y)
110.     f1 = np.polyfit(x, y, 3)
111.     p1 = np.poly1d(f1)
112.     print(p1)
113.     yvals = p1(x)
114.     return yvals
115.

```

```

116.
117. def box():
118.     address = r"D:\桌面\降雨量数据集.xlsx"
119.     data_address = pd.read_excel(address, header=0)
120.     data_address = data_address.values
121.     print(data_address.shape)
122.     row0 = data_address[0, 1:]
123.     row1 = data_address[1, 1:]
124.     row2 = data_address[2, 1:]
125.     row3 = data_address[3, 1:]
126.     row4 = data_address[4, 1:]
127.     row5 = data_address[5, 1:]
128.     row6 = data_address[6, 1:]
129.     row7 = data_address[7, 1:]
130.     row8 = data_address[8, 1:]
131.     row9 = data_address[9, 1:]
132.     # plt.figure()
133.     # plt.boxplot((row0, row1, row2, row3, row4, row5, row6, row7, row8, row9),
134.     #             labels=('2012', '2013', '2014', '2015', '2016', '2017', '2018', '201
135.     #             9', '2020', '2021'))
136.     # plt.tight_layout()
137.     pic_path = "降雨量盒图按年" + '.png'
138.     # if os.path.exists(pic_path):
139.     #     os.remove(pic_path)
140.     # plt.savefig(pic_path, dpi=500)
141.     plt.figure(figsize=(25, 16))
142.     plt.subplot(2, 5, 1)
143.     x = np.arange(len(row0))
144.     x = np.array([i + 1 for i in x]).flatten()
145.     y = row0
146.     yvals = fit_data(x, row0)
147.     plt.plot(x, y, 's', label='original values')
148.     plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
149.
150.     plt.subplot(2, 5, 2)
151.     y = row1
152.     yvals = fit_data(x, y)
153.     plt.plot(x, y, 's', label='original values')
154.     plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
155.
156.     plt.subplot(2, 5, 3)
157.     y = row2
158.     yvals = fit_data(x, y)

```

```

159. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
160. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
161.
162. plt.subplot(2, 5, 4)
163. y = row3
164. yvals = fit_data(x, y)
165. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
166. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
167.
168. plt.subplot(2, 5, 5)
169. y = row4
170. yvals = fit_data(x, y)
171. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
172. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
173.
174. plt.subplot(2, 5, 6)
175. y = row5
176. yvals = fit_data(x, y)
177. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
178. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
179.
180. plt.subplot(2, 5, 7)
181. y = row6
182. yvals = fit_data(x, y)
183. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
184. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
185.
186. plt.subplot(2, 5, 8)
187. y = row7
188. yvals = fit_data(x, y)
189. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
190. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
191.
192. plt.subplot(2, 5, 9)
193. y = row8
194. yvals = fit_data(x, y)
195. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
196. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')
197.
198. plt.subplot(2, 5, 10)
199. y = row9
200. yvals = fit_data(x, y)
201. plt.plot(x, y, 's', label='original values')
202. plt.plot(x, yvals, 'r', label='polyfit values')

```

```
203.  
204.     plt.tight_layout()  
205.     plt.show()  
206.     pic_path = "三次幂拟合曲线" + '.png'  
207.     if os.path.exists(pic_path):  
208.         os.remove(pic_path)  
209.     plt.savefig(pic_path, dpi=500)
```

公众号：竞赛资料网