ЛИЧНАЯ АПТЕЧКА — Фанские горы, кольцо Чимтарги

10 дней · 1700–4740 м · сентябрь 2026 · 39 лет, 182 см, 105 кг · вес ≈ 832 г · ✓есть — уже дома

1. Лекарства

Препарат	Кол-во	г	Когда применять	Дозировка
Ибупрофен 400 мг	10–20 таб.	15	Боль: головная (в т.ч. высотная), мышечная, суставная; воспаление, растяжения. Исследования: 600 мг 3 р/сут снижают риск горной болезни.	400 мг каждые 6–8 ч после еды, макс 1200 мг/сут. НЕ сочетать с кеторолом.
Парацетамол 500 мг	10 таб.	8	Жар, боль если нельзя НПВС; сочетается с любым обезболом.	500–1000 мг каждые 6 ч, макс 3 г/сут.
Кеторол (Кетанов) 10 мг ✓есть	10 таб.	4	Очень сильная боль (травма, зуб), если ибупрофен не справляется.	10 мг до 4 р/сут, макс 3 дня. НЕ с ибупрофеном.
Ацетазоламид (Диакарб) 250 мг ✓есть	1 блистер 10 таб. (из 30)	4	Профилактика/лечение горной болезни (ночёвки 3520–4400 м, перевал 4740 м).	Профилактика: 125 мг (½ таб.) 2 р/сут — утро и перед сном, начать ЗА ДЕНЬ до выхода на 3500+ м (Мутные озёра), отмена после спуска ниже 3000 м. Лечение: 250 мг 2 р/сут. Норма: покалывание пальцев/губ, частое мочеиспускание — пить БОЛЬШЕ воды. Газировка кажется выдохшейся — норма. НЕ с аспирином! С Конкором совместим.
Дексаметазон 0,5 мг (KRKA) ✓есть	20 таб. (2 блистера)	4	ТОЛЬКО экстренно: тяжёлая горная болезнь/отёк мозга (шаткость, спутанность, рвота, одышка в покое), отёк Квинке.	Ударная доза 8 мг = 16 ТАБ. сразу, затем 4 мг (8 таб.) каждые 6 ч. ПРИНЯЛ = ТОЛЬКО ВНИЗ: маскирует симптомы, спуск обязателен. Тест НАСЕ: пройти пятка-в-носок. С Диакарбом можно вместе.
Лоперамид 2 мг ✓есть	10 капс.	4	Диарея БЕЗ температуры/крови. По алгоритму врача: через 15–30 мин ПОСЛЕ стопдиара.	4 мг сразу, затем 2 мг после каждого стула, макс 8 мг/сут.
Нифуроксазид (Стопдиар) 200 мг	8–12 капс.	6	Диарея — из алгоритма врача: убивает микробы в просвете кишки.	200 мг 4 р/сут, первую дозу сразу; лоперамид — через 15–30 мин.
Азитромицин 500 мг	3 таб.	5	Диарея С t°>38°C/кровью или >2 суток; ангина, бронхит. ОДИН антибиотик вместо ципрофлоксацина и доксициклина.	500 мг 1 р/сут 3 дня. РЕЦЕПТ.
Но-шпа 40 мг ✓есть	10 таб.	4	Спазм живота, кишечные/почечные колики.	40–80 мг до 3 р/сут.
Мукофальк (псиллиум)	4 пак.	24	Запор (частая проблема на сухпайках) — из алгоритма врача.	1 пак. на стакан воды 1–2 р/сут + пить ≥3–4 л/сут.
Max Motion (Maxler) — изотоник, шипучие таб. ✓есть	20 таб. (1 туба)	70	Потеря солей с потом на подъёмах (калий/магний — против судорог); база при диарее.	2 таб. на 500 мл, 1–2 порции/сут. ПРИ ДИАРЕЕ: + ½ ч.л. соли + 1 ст.л. сахара на 1 л (в таблетках мало натрия и глюкозы!) — ≥4 л/сут.
Смекта (диосмектит)	6 пак.	24	Диарея: адсорбирует токсины, дополняет стопдиар. Изжога.	1 пак. на ½ стакана воды 3 р/сут. Разносить с лекарствами ≥2 ч!
Панкреатин (Креон) 10 000–25 000 ЕД	10 капс.	10	Тяжесть после жирной непривычной еды (нац. кухня до/после похода).	1–2 капс. во время жирной еды.
Цетиризин 10 мг	10 таб.	3	Аллергия, укусы, сыпь, отёк. Без седации — в отличие от супрастина.	10 мг 1 р/сут.
Милдронат 500 мг	10–20 капс.	12	Поддержка при гипоксии: ночёвка 4400 м, перевал Чимтарга. В РБ БЕЗ рецепта.	500 мг утром, начать за 3–4 дня до высотной части. Не после 15:00. Помогает переносить высоту.
Каптоприл 25 мг	6–10 таб.	3	Резерв: скачок давления >160/100 с симптомами (головная боль, шум, жар лица).	25 мг под язык, сесть/лечь. Через 30 мин без эффекта — ещё 25 мг + спуск.
Конкор (бисопролол) 5 мг — ВАШ ПОСТОЯННЫЙ ✓есть	15 таб.	6	Ежедневная терапия давления. НЕ ПРОПУСКАТЬ и НЕ отменять резко (рикошет пульса/АД на высоте опасен).	5 мг 1 р/сут УТРОМ, в одно время, каждый день похода. 15 таб = 10 дней + резерв.
Пастилки от горла (Стрепсилс/Доктор Мом)	6–10 шт.	20	Першение от холодного сухого воздуха. Ангина с гноем и t° — это азитромицин (уже есть).	1 пастилка каждые 3–4 ч, макс 5–6/сут.
Eugica Fort (эвкалиптол+каепут+имбирь+ментол) ✓есть	1 блистер 10 капс.	8	Простуда: кашель, боль в горле, насморк. Травяной — НЕ поднимает АД (в отличие от Терафлю/фенилэфрина — на Конкоре те нельзя).	2 капс. 2 р/сут во время еды, только в дни болезни. Возможна лёгкая сонливость — не впервые на перевале. Пить больше воды.

2. Ваши витамины и БАДы — порядок приёма

Препарат/БАД	Режим	Как и когда
Конкор (бисопролол) 5 мг	1 таб./день, КАЖДЫЙ день	Сразу после подъёма, ДО завтрака, водой. Не пропускать и не отменять резко!

Chela-Ferr Forte (железо 28 мг + C, B6, B12, фолиевая)	1 капс./день, весь поход	В ОБЕД/полдник (не утром — уступает место Конкору). НЕ с чаем/кофе/молочным (≥1 ч). С азитромицином и смектой — ≥2 ч.
BCAA Pro 2:1:1	~40 капс. в зип-пакете	Только в дни перевалов: 2 капс. перед выходом + 2 после прихода в лагерь.
Милдронат 500 мг	500 мг утром	Начать за 3–4 дня до высотной части (с Мутных озёр), пик — день Чимтарги. Не после 15:00.

3. Перевязка, кожа, гигиена, вода

Средство	Кол-во	г	Когда применять	Как применять
Tigin gel 50 г (салицилат+капсаицин +ментол) ✓есть	1 тюб.	60	Мышцы/суставы вечером после перехода, ушибы, растяжения. Годен до 01.2029.	Тонким слоем 2–3 р/сут, втереть. НЕ на раны, не под повязку, после — вымыть руки.
Бетадин (повидон-йод) 30 мл ✓есть	1 фл.	35	Антисептик ран, ссадин. Заменяет зелёнку и перекись.	Смазать края раны/место укуса клеща.
Лейкопластырь рулонный 5×500 см (Галтеяфарм) ✓есть	1 шт.	50	«Горячая точка» (жжение) + фиксация повязок.	Стоп! Сухая кожа → полоска с запасом 2–3 см, без складок → устранить причину (носок/шнуровка).
Стик от натирания StepUp ✓есть	1 шт. (4,8 г)	18	Профилактика мозолей — каждое утро!	На пятки/пальцы/подъём ДО носков, повтор в обед. НЕ на открытые раны.
Пластырь бактерицидный ✓есть	5 шт.	10	Мелкие порезы, ссадины.	На рану после антисептика.
Гидроколлоид Foot Expert ✓есть	5 шт.	20	Волдырь (целый или проколотый по правилам).	На СУХУЮ кожу, прижать ладонью 20 сек. Не снимать до 48 ч; побелел — заменить. Волдырь под ним НЕ прокалывать.
Бинт эластичный 8 см ✓есть	1 шт.	60	Растяжение голеностопа/колена (вес 105 кг — зона риска на спусках).	Бинтовать от стопы вверх.
Бинт нестерильный + салфетки стерильные ✓есть	2+3	30	Повязки на раны.	Салфетка на рану + бинт.
Пантенол спрей/крем мини	1 шт.	40	Солнечные ожоги, обветривание.	2–3 р/сут.
Вазелин мини (25–30 г)	1 баночка	30	Обветренные губы/нос/щёки, ветровая защита лица на перевале, смазка стоп от натирания, пересохшие крылья носа.	Тонким слоем по потребности. На лицо перед перевалом (ветер+мороз). На стопы — альтернатива стику.
SPF 50+ крем для лица	1 шт.	50	УФ критический на 4000+ м, снег усиливает ожог.	Каждые 2–3 ч на открытую кожу.
Гигиеническая помада SPF 50+ (Holly Polly/Bielita)	1 шт.	5	Губы обгорают на высоте за час; обветривание.	Каждые 2–3 ч и после еды.
Солевой спрей для носа / физраствор 0,9%	1 фл.	40	Сухость и трещины слизистой носа на высоте.	2–3 впрыска 3–4 р/сут профилактически.
Ринол 0,1% (оксиметазолин) — сосудосуживающее	1 фл.	20	ТОЛЬКО при реальной заложенности носа (чтобы заснуть). Поднимает пульс/АД — осторожно на высоте!	1–2 впрыска 2 р/сут, не более 5–7 дней.
Ингалятор Ингакамф (Truong Son) ✓есть	1 шт.	5	Комфорт дыхания днём: сухость, лёгкая заложенность. Ментол НЕ снимает отёк — на ночь при заложенности Ринол.	Вдохнуть через каждую ноздрю по необходимости.
Сульфацил-натрий (Альбуцид), капли глазные ✓есть	1 фл.	15	Конъюнктивит, пыль/песок в глазах. Вскрытый флакон живёт ~1 мес!	1–2 капли 3–4 р/сут.
Искусственная слеза 10 мл	1 фл.	15	Сухость глаз от ветра и УФ на высоте.	1–2 капли по необходимости.
Аквабриз 2,5 (таблетки для воды) ✓есть	20–30 таб.	30	Обеззараживание воды в ходу. В лагере — кипячение. Хлортаб НЕ дублировать.	1 таб. на 1 л, выдержать 60 мин (холодная вода <+10°C — 2 ч!). Мутную — отстоять. Привкус убирает щепотка аскорбинки.
Чай травяной Samahan (Eugica Cold&Flu;) ✓есть	5–6 пак.	30	Первые признаки простуды (озноб, першение); согревающий напиток на холодных ночёвках. Совместим со всем, можно на высоте. Годен до 01.2029.	1 пак. на 120–180 мл горячей воды, 2–3 р/сут. Комфорт-средство: t° и ломота — парацетамол.
Ножницы малые + пинцет + перчатки	набор	35	Резать пластырь, занозы/клещи; перчатки — по алгоритму при запоре.	Клеща — пинцетом близко к коже, выкручивая.

4. Правила и алгоритмы

• Горная болезнь: головная боль + тошнота/слабость — не выше. Ухудшение — спуск. Ибупрофен 600 мг 3 р/сут в дни набора высоты — доказанная профилактика.
• Обезболивание: ибупрофен 400 мг — основное; кеторол 10 мг — резерв (НЕ с ибупрофеном!); парацетамол — голова/жар.
• Диарея: 1) Стопдиар 200 мг → 2) лоперамид 4 мг через 15–30 мин → 3) t°>38°C/кровь — азитромицин 500 мг/сут → 4) Max Motion 2 таб/500 мл + ½ ч.л. соли + 1 ст.л. сахара на литр, ≥4 л/сут → 5) смекта (2 ч от лекарств).
• Запор: Мукофальк + вода. Жирная еда: панкреатин 1–2 капс. Простуда: озноб — чай Samahan; кашель/горло/насморк — Eugica Fort 2 капс. 2 р/сут с едой; першение — пастилки; гнойная ангина — азитромицин. Терафлю/Колдрекс на Конкоре НЕЛЬЗЯ (фенилэфрин ↑АД).
• Паническая атака: вдох 4 с — выдох 6–8 с. Корвалол/Валосердин НЕ брать (фенобарбитал — граница!). Одышка на высоте ≠ паника.
• Режим дня: подъём — Конкор до завтрака; завтрак — милдронат (дни высоты), BCAA перед выходом; обед — Chela-Ferr (железо); вечер — BCAA после прихода; перед сном — 2-я доза Диакарба (дни 3500+ м).
• Диакарб: 125 мг (½ таб.) 2 р/сут — утро и перед сном, старт за день до Мутных озёр, отмена после спуска ниже 3000 м. Симптомы — 250 мг 2 р/сут. Покалывание пальцев/губ и частое мочеиспускание — норма, пить БОЛЬШЕ воды. НЕ с аспирином! Аллергия на сульфаниламиды — нельзя.
• Давление (вы на Конкоре): бисопролол 5 мг каждое утро, НЕ пропускать и НЕ отменять резко! Скачок >160/100 — каптоприл 25 мг под язык. Пульс на высоте ниже обычного — норма. АД поднимают: Ринол, кофеин.
• Дексаметазон (экстренно!): тяжёлая горная болезнь/отёк мозга (шаткость — тест пятка-в-носок, спутанность, рвота) — 8 мг = 16 таб. по 0,5 мг СРАЗУ, затем 8 таб. каждые 6 ч. Принял = только ВНИЗ, подъём под гормоном смертельно опасен. Можно вместе с Диакарбом 250 мг.
• Аллергия: цетиризин (не супрастин — седация на перевале опасна). Тяжёлая реакция: цетиризин 20 мг + дексаметазон + спуск.
• Глаза/уши/нос: очки кат. 3–4 обязательно! Альбуцид при конъюнктивите. Нос: физраствор ежедневно, Ингакамф — комфорт днём, Ринол — только при заложенности ≤5–7 дней.
• Клещи: доксициклин НЕ нужен. ДЭТА в долинах, вечерний осмотр, пинцет + бетадин.
• Вода: в лагере — кипячение; в ходу — Аквабриз 1 таб/л, 60 мин (холодная вода — 2 ч), мутную отстоять.
• Мозоли (травма №1!): утром — стик на пятки/пальцы. Жжение — СТОП сразу: сухая кожа → рулонный пластырь без складок → поправить носок/шнуровку. Волдырь — гидроколлоид на сухую кожу, не снимать до 48 ч, под ним НЕ прокалывать. Большой болезненный: прокол с краю раскалённой иглой → слить → бетадин → гидроколлоид. Лопнул: бетадин, ночью пантенол и открыто, утром заклеить.
• Кожа и ветер: вазелин — губы/нос/щёки от обветривания, на лицо перед перевалом (ветер + мороз), стопы от натирания; пантенол — на уже обожжённое/обветренное; SPF 50+ каждое утро, помада SPF каждые 2 ч.
• Колени: палки, вечером Tigin gel, отёк — бинт. Рецепты (РБ): только Диакарб, дексаметазон, азитромицин.

Чекбокс сборки: ☐ рецепты получены ☐ гермопакет ☐ блистеры подписаны ☐ сроки годности (Альбуцид!) ☐ копия листа вложена ☐ гид знает, где аптечка

5. План приёма по дням маршрута (Диакарб + ваши препараты и БАДы)

Диакарб: старт утром 09.09 (перед пер. Алаудин 3860 м и первой ночёвкой 3500+ м), последняя доза — утро 13.09, отмена на спуске ниже 3000 м. Всего 5 таб. на профилактику; блистер 10 таб. — с двойным резервом. Пейте 3–4 л/сут весь высотный блок 09–13.09!

Дата	День маршрута (ночёвка)	Диакарб 250 мг	Остальное
06.09	Ташкент → Самарканд, отель (~800 м)	—	Конкор утром · Chela-Ferr в обед
07.09	Самарканд → Артуч (2160 м)	—	Конкор утром · Милдронат 500 мг — СТАРТ · Chela-Ferr в обед
08.09	Артуч → Куликалон (2850 м)	—	Конкор · Милдронат утром · Chela-Ferr в обед
09.09	пер. Алаудин 3860 → Алауддинские оз. (2820 м)	СТАРТ: ½ утром + ½ перед сном	Конкор · Милдронат утром · BCAA 2+2 · Chela-Ferr в обед
10.09	Алауддин → Мутные (3520 м)	½ утром + ½ перед сном	Конкор · Милдронат утром · Chela-Ferr в обед
11.09	Мутные → лагерь под Чимтаргой (4400 м)	½ утром + ½ перед сном	Конкор · Милдронат утром · Chela-Ferr в обед
12.09	пер. ЧИМТАРГА 4740 м → Б. Алло (3160 м)	½ в 5:00 перед выходом + ½ вечером	Конкор в 4:30 до выхода · Милдронат утром · BCAA 2+2 · Chela-Ferr с едой на Алло
13.09	Дневка на Б. Алло (3160 м)	½ утром — ПОСЛЕДНЯЯ ДОЗА	Конкор · Милдронат утром (последний) · Chela-Ferr в обед
14.09	Спуск в Зиндон (2400 м)	ОТМЕНА	Конкор · Chela-Ferr в обед
15.09	Арчамайдан → Газза (1700 м)	—	Конкор · Chela-Ferr в обед
16.09	Газза → Самарканд → Ташкент	—	Конкор утром

• Конкор — каждое утро БЕЗ исключений (в день Чимтарги — будильник 4:30, таблетка, потом сборы). • Милдронат 07–13.09, только утром, не после 15:00. • Ибупрофен 400 мг — опционально 09–12.09 при подступающей высотной головной боли (после еды). • Покалывание пальцев/губ с вечера 09.09 — норма, Диакарб работает. • Если симптомы горняшки несмотря на Диакарб: 250 мг 2 р/сут + НЕ выше; ухудшение — дексаметазон и спуск.

6. Дыхание, уши, разминка — краткая памятка

• Уши (заложенность): 1) зевок/жевание → 2) Тойнби: зажать нос + сглотнуть → 3) Вальсальва: зажать нос и МЯГКО выдохнуть «в уши» до щелчка (не дуть сильно!). На спуске повторять каждые 100–200 м. С насморком — сначала Ринол/физраствор, через 10 мин продувка.
• Дыхание на ходу: вдох на 2–3 шага, выдох на 3–4 (выдох длиннее!). Крутой подъём — «паровозик»: вдох носом, выдох через сжатые губы с усилием. Осыпь: rest step — шаг, пауза на прямой ноге, 1–2 вдоха, шаг. Не можете говорить предложениями — идёте слишком быстро.
• Привал: 10 циклов: вдох носом 4 с → выдох ртом 6–8 с; последние 2–3 цикла с паузой 2–3 с после вдоха.
• Перед сном (3500+/4400 м): Диакарб ½ таб. + диафрагмальное дыхание 2 мин (живот, не грудь) + «4–7–8»: вдох 4 — пауза 7 — выдох 8, ×6–8. Спать с приподнятым верхом (рюкзак под коврик).
• Утренняя разминка 5–7 мин (на холоде — без рывков, сначала разогреть): шея полукруги → плечи круги ×10 → локти/кисти (при покалывании пальцев от Диакарба — обязательно) → наклоны корпуса → круги тазом → колени полукруги → стопы круги + подъёмы на носки ×15 → ходьба на месте 1 мин.
• Плечи вечером (рюкзак): «лопатки в карман» 10 с ×5 → растяжка трапеций (рука за спину, голова в сторону) 30 с ×2 → замок за спиной, раскрыть грудь 30 с ×2 → круги плечами ×15.
• Ноги вечером (5 мин, против судорог/отёков): икры у опоры 30 с ×2 → квадрицепс стоя 30 с ×2 → задняя поверхность 30 с ×2 → ягодицы «фигурка 4» 30 с ×2 → стопа по бутылке 1 мин → ноги вверх на рюкзак 3–5 мин.