ШПАРГАЛКА АПТЕЧКИ · Фанские горы 09.2026 · разрезать по линиям и сложить в кармашек

ВЫСОТА	ЭКСТРЕННО	ДАВЛЕНИЕ
Диакарб 250 мг Когда: Профилактика горной болезни (3500+ м) Доза: ½ таб. 2 р/сут (утро+сон), старт за день до Мутных озёр. Отмена ниже 3000 м. Покалывание пальцев — норма. Пейте больше воды! НЕ с аспирином.	**Дексаметазон 0,5 мг** Когда: Тяжёлая горняшка/отёк мозга: шаткость, спутанность, рвота Доза: СРАЗУ 16 таб. (8 мг), дальше 8 таб. каждые 6 ч. ПРИНЯЛ = ТОЛЬКО ВНИЗ! Тест: пятка-в-носок. Можно с Диакарбом 250 мг.	**Конкор 5 мг — КАЖДЫЙ ДЕНЬ!** Когда: Ваше постоянное от давления Доза: 1 таб. УТРОМ до завтрака, не пропускать, не отменять резко!
ДАВЛЕНИЕ	**БОЛЬ**	**БОЛЬ**
Каптоприл 25 мг Когда: Скачок АД >160/100 с головной болью/шумом/жаром Доза: 25 мг под язык, сесть. Через 30 мин без эффекта — ещё 25 мг + спуск.	**Ибупрофен 400 мг** Когда: Головная/мышечная боль, воспаление; профилактика горняшки Доза: 400 мг каждые 6–8 ч после еды, макс 1200 мг/сут. НЕ с кеторолом!	**Парацетамол 500 мг** Когда: Жар, боль (если нельзя НПВС) Доза: 500–1000 мг каждые 6 ч, макс 3 г/сут.
БОЛЬ	**ЖКТ**	**ЖКТ**
Кеторол 10 мг Когда: Очень сильная боль (травма, зуб) Доза: 10 мг до 4 р/сут, макс 3 дня. НЕ с ибупрофеном!	**Стопдиар 200 мг** Когда: Диарея — шаг 1 Доза: 200 мг сразу, далее 4 р/сут. Лоперамид — через 15–30 мин.	**Лоперамид 2 мг** Когда: Диарея БЕЗ температуры и крови — шаг 2 Доза: 4 мг, затем 2 мг после каждого стула, макс 8 мг/сут.
АНТИБИОТИК	**ЖКТ**	**ЖКТ**
Азитромицин 500 мг Когда: Диарея с t°>38/кровью; ангина с гноем Доза: 500 мг 1 р/сут 3 дня. Железо — разнести ≥2 ч.	**Смекта** Когда: Диарея (токсины), изжога Доза: 1 пак. на ½ ст. воды 3 р/сут. От любых лекарств — ≥2 ч!	**Мукофальк** Когда: Запор Доза: 1 пак. на стакан воды 1–2 р/сут + пить ≥3 л/сут.
ЖКТ	**ЖКТ**	**АЛЛЕРГИЯ**
Панкреатин Когда: Тяжесть после жирной еды Доза: 1–2 капс. во время еды.	**Но-шпа 40 мг** Когда: Спазм живота, колики Доза: 40–80 мг до 3 р/сут.	**Цетиризин 10 мг** Когда: Аллергия, укусы, сыпь Доза: 10 мг 1 р/сут. Тяжёлая реакция: 20 мг + дексаметазон + спуск.
ГОРЛО	**ЭЛЕКТРОЛИТЫ**	**БАДЫ**
Пастилки + Samahan + Eugica Fort Когда: Першение; озноб/простуда Доза: Пастилка каждые 3–4 ч; чай 2–3 р/сут; Eugica 2 капс. 2 р/сут с едой. Терафлю на Конкоре НЕЛЬЗЯ!	**Max Motion** Когда: Пот на подъёмах; база при диарее Доза: 2 таб./500 мл. При диарее: +½ ч.л. соли +1 ст.л. сахара на 1 л, ≥4 л/сут.	**Chela-Ferr Forte (железо)** Когда: Каждый день, весь поход Доза: 1 капс. в ОБЕД. Не с чаем/кофе/молочным (1 ч), с азитромицином и смектой — 2 ч.
БАДЫ	**БАДЫ**	
BCAA Pro 2:1:1 Когда: Только дни перевалов Доза: 2 капс. перед выходом + 2 капс. в лагере.	**Милдронат 500 мг** Когда: Высотная часть (с Мутных озёр) Доза: 500 мг УТРОМ, не после 15:00.	

КРАСНЫЕ ПРАВИЛА: ибупрофен ≠ кеторол вместе · Диакарб ≠ аспирин · смекта — 2 ч от любых таблеток · дексаметазон принял → только ВНИЗ · Конкор — каждое утро, не пропускать · пульс на высоте ниже обычного — норма (бисопролол)