

# Erythema

## Sweet 3

Exam <ul style="list-style-type: none"><li>◦ ↑Neut</li></ul>
原因 サイトカインを介した好中球異常活性化が考えられており、それに影響する種々の因子（感染、MDS・白血病などの悪性腫瘍、G-CSF投与など）が関与するとされている。
症状 前駆症状として38度以上の発熱や上気道炎感染症状がみられた1〜4週後に、暗紅色や紫紅色の浸潤を伴う有痛性の滲出性紅斑が多発し、漸次拡大、融合傾向を示す。Behçet病との鑑別が問題となる。
検査所見 <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 白血球増加（好中球＞70%）</li><li>◦ 赤沈亢進</li><li>◦ CRP高値</li></ul> が重要。
病理所見 真皮全層で血管・付属器周囲の好中球を主体とした炎症細胞浸潤（核破片あり）がみられる。
合併症 <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 造血系疾患（白血病やMDS）</li><li>◦ 内臓悪性腫瘍</li><li>◦ 自己免疫疾患（RAなど）</li></ul>
治療 <ul style="list-style-type: none"><li>◦ 安静</li><li>◦ NSAIDs</li><li>◦ コルヒチン</li><li>◦ ヨードカリ</li></ul> などの内服を行う。重症例に対しては <ul style="list-style-type: none"><li>◦ ステロイド内服</li></ul> を行う。



### スイトでアツアツ、チューして 赤くなる

スイトで	Sweet病
アツアツ、	発熱
チューして	好中球増多
赤くなる	有痛性紅斑

## Erythema Nodosum 結節性紅斑 1

感染アレルギー <ul style="list-style-type: none"><li>◦ ウイルス</li><li>◦ 細菌 (溶連菌)</li><li>◦ 結核</li><li>◦ ハンセン病</li></ul>
Behcet
サルコイドーシス
薬剤性アレルギー
UC

## SJS 1

Crohn病
MDS

皮膚掻痒症，痒疹	悪性腫瘍全般
匍行性迂回状紅斑	80%以上に内臓悪性腫瘍（乳房，肺，胃，子宮）合併.
水疱症（腫瘍随伴性天疱瘡，水疱性類天疱瘡）	内臓悪性腫瘍など
後天性魚鱗癬	Hodgkinリンパ腫 白血病 肺癌 乳癌
黒色表皮腫	合併症の90%以上が胃癌（特に早期胃癌）.
Leser-Trélat徴候	内臓悪性腫瘍合併率（特に胃癌）が高い.
皮膚筋炎	内臓悪性腫瘍（胃癌，乳癌，肺癌など）合併.
Sweet病	白血病 MDS 内臓癌 に合併することがある.
紅皮症	菌状息肉症 Sézary症候群 白血病 内臓悪性腫瘍 にみられる.
壊疽性膿皮症	白血病 MDS

## Quiz

5 Qs / 5