Metal

Pb 鉛 鉛仙痛 歯肉の鉛毒線 • 橈骨神経麻痺 貧血 尿ALA (δ-アミノレブリン) ↑ 赤血球中ALA-D活性↓ (最も早く出現する所見) 好塩基斑点赤血球出現 コプロポルフィリン • 胃腸障害 As ヒ素 Mees線(爪の白線) • 末梢神経障害 皮膚症状(色素沈着.皮膚の角 化) TI タリウム 脱毛 • 腎障害(近位尿細管) Au 金 • 末梢神経障害 皮膚症状 • 骨髄抑制 ● Hunter-Russell症候群 Hg 有機水銀 。 求心性視野狭窄 運動失調が有名 • 腎障害(近位尿細管) Cd カドミウ • 骨軟化症 Ь 肺気腫 肺炎 Mn マンガン Parkinson症候群(筋強剛) • 鼻中隔穿孔 Cr クロム • ネフローゼ症候群 肺癌 肺気腫 Ni ニッケル • 肉芽腫性肺病変 Be ベリリウ

• 肺線維症

ム

Pb ₃

<u>なまった 先生、 公園 トコトコ あら 貧血!</u>

なまった	鉛中毒
先生、	疝痛(腹痛)
公園	好塩基性斑点赤血球数
トコトコ	撓骨神経麻痺(<u>神経症状</u>)
あら	ALA(尿中δ-アミノレブリン酸)↑
貧血!	<u> </u>

原因

- ・バッテリー製造
- ・ クリスタルガラス製造
- 。七宝焼き
- ラジエーター修理
- 塩化ビニル加工などの職場にて曝露されや すい

症状

- 。 貧血(小球性低色素性貧血)
- 腹部仙痛(鉛疝痛)
- 神経症状 (橈骨神経麻痺, 鉛脳症)
- その他
 - 腎障害
 - 無月経
 - 不妊症

検査

- 。 赤血球中ALA-D 活性低下
- 赤血球プロトポルフィリン増加
- 尿中デルタアミノレブリン酸(δ-ALA) 増加
- 尿中コプロポルフィリン増加

治療

- 。 キレート剤CaNa2-EDTAの筋注・静注
- 。 D-ペニシラミンの経口投与

Hg 1

As 1

は ひふへ ほ

は	肺癌
ひふへ	皮膚癌
ほ	

Quiz

5 Qs/{#}5(#)