

絞扼性末梢神経障害

上肢
<ul style="list-style-type: none">● 胸郭出口症候群● 肩甲上神経麻痺● 肘部管症候群● 円回内筋症候群● 前骨間神経麻痺● 後骨間神経麻痺● 手根管症候群● 尺骨神経症候群 (Guyon管症候群)
下肢
<ul style="list-style-type: none">● 足根管症候群● Morton病

CTS 4

手根管症候群の診察方法

Tinel徴候 同部の叩打により、末梢への放散痛
Phalen（逆Phalen）テスト 手関節屈曲（伸展位）を1分以上保持させ、症状の増悪の有無をみる。

手根管症候群の治療

S/S	Rx
<ul style="list-style-type: none">● Tinel sign(+)● 正中神経領域の知覚異常	<ul style="list-style-type: none">● 手関節固定装具● 手根管内ステロイド注入
<ul style="list-style-type: none">● 短母指外転筋の筋力低下 / 萎縮● 手根管部を通過して、知覚、運動線維の伝導速度の低下	<ul style="list-style-type: none">● 手根管開放術

Median 4


主な絞扼性ニューロパチー

<p>Median</p> <ul style="list-style-type: none">● 母指対立筋● 短母指外転筋● 短母指屈筋浅頭

手の末梢神経障害




Phalen テスト



Ulnar

- 母指内転筋
- 短母指屈筋深頭
- 骨間筋

Common Peroneal N 1



疾患	神経	運動の異常	感覚の異常
総腓骨神経麻痺	総腓骨神経	<ul style="list-style-type: none"> • 前脛骨筋の麻痺 • 下垂足： 足を背屈させる筋（前脛骨筋など）の萎縮により、足が下垂する。 	<ul style="list-style-type: none"> • 下腿外側～足背の感覚障害



Quiz

8 Qs / 8