

Complication

GDM 11

急にひとはおりこうさん

急に	空腹時血糖(FBS)	≥ 92 mg/dL
ひとは	75gOGTT1時間値	≥ 180 mg/dL
おりこうさん	75gOGTT2時間値	≥ 153 mg/dL

GDM 合併症

初期 <ul style="list-style-type: none">催奇形性
中後期 <ul style="list-style-type: none">巨大児胎児発育不全子宮内胎児死亡
分娩時 <ul style="list-style-type: none">分娩外傷 (腕神経叢麻痺)
新生児 <ul style="list-style-type: none">低血糖低Ca血症高ビリルビン血症呼吸窮迫症候群

妊娠時期別の糖尿病による母体および児の合併症

	妊娠初期	妊娠中期～後期	分娩時	産褥期
胎児・新生児	奇形	巨大児 胎児死亡 成熟の遅れ	分娩時外傷	低血糖, 低Ca血症 黄疸, 将来の糖尿病 RDS (成熟の遅れ)
母	流産	早産 妊娠高血圧症候群 羊水過多	難産 (肩甲難産) 帝王切開の増加	弛緩出血

PIH 2

	HTN	UProt
軽症	<ul style="list-style-type: none">$140 \leq \text{SBP} < 160$$90 \leq \text{DBP} < 110$	$300 \text{ mg/day} \leq \text{UP} < 2 \text{ g/day}$
重症	<ul style="list-style-type: none">$\text{SBP} \geq 160$$\text{DBP} \geq 110$	$\text{UP} \geq 2 \text{ g/day}$

Pyelonephritis 1

Acute Appendicitis 2

Treatment

- 開腹手術

SLE 3

新生児ループス NLE

原因

- SS-A (Ro)
- SS-B (La)

症候

- 心筋症
- 完全房室ブロック

母体から胎児へとIgGが移行する疾患

①Rh型不適合妊娠におけるRh抗体

②甲状腺機能亢進症におけるTSH受容体抗体


③SLEにおけるLE抗体

④ITPにおける抗血小板抗体

⑤重症筋無力症における抗アセチルコリン受容体抗体

APS 3

DVT 2



Quiz

20 Qs / {#} 20 (#)

